

BİDGE Yayınları

Riskli Çocuk ve Ailelerde Pediatri Hemşireliği

Editör: Doç. Dr. Nevin Uslu

ISBN: xxxx

1. Baskı

Sayfa Düzeni: Gözde YÜCEL

Yayınlama Tarihi: 25.12.2024

BİDGE Yayınları

Bu eserin bütün hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının ve editörün yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Sertifika No: 71374

Yayın hakları © BİDGE Yayınları

www.bidgeyayinlari.com.tr - bidgeyayinlari@gmail.com

Krc Bilişim Ticaret ve Organizasyon Ltd. Şti.

Güzeltepe Mahallesi Abidin Daver Sokak Sefer Apartmanı No: 7/9 Çankaya /
Ankara



İçindekiler

Suçta Sürüklenen Ergenlerde Değişimin Anahtarı: Duygu Düzenleme Becerilerinin Geliştirilmesi.....	4
Nevin USLU	4
Gizem BEKTAŞ.....	4
Yenidoğan'da Non-invazif Mekanik Ventilasyon Desteği ve Hemşirelik Bakımı	60
Sultan GÜNER BAŞARA	60
Bircan KAHRAMAN BERBEROĞLU	60
Otizmlı Çocuklara Sahip Olan Ailelerle Yapılan Hemşirelik Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi: Sistematiik Derleme	94
Serap KIRICI.....	94
Bircan KAHRAMAN BERBEROĞLU	101
Sultan GÜNER BAŞARA.....	101
Solunum Sistemi Hastalıkları ve Pediatri Hemşireliğı	117
Meltem PEPE	117
Çocuk İstismarı Farkındalığı ve Koruma Yöntemleri.....	183
Meltem PEPE	183
Bircan KAHRAMAN BERBEROĞLU	228
Sultan GÜNER BAŞARA ²	228

BÖLÜM I

Suça Sürüklenen Ergenlerde Değişimin Anahtarı: Duygu Düzenleme Becerilerinin Geliştirilmesi

Nevin USLU¹
Gizem BEKTAŞ²

1. Suça Sürüklenen Çocuk Kavramı ve Ergenlik

Çocuk suçluluğu, henüz reşit olmamış bireylerin yasalara aykırı eylemler gerçekleştirmeleri veya suçla karşı karşıya kalmaları durumudur (Bülbül & Doğan, 2016). Oto-kontrolün öğrenildiği çocukluk çağında, dürtüsellik ile hareket etmenin sonucunda suç olabilecek davranışlar meydana gelebilmektedir (Güler, 2017). Fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan yeni rollerini keşfetmeye çalışan çocuk, kritik dönem olan ergenlik çağında zorlanmaya ve uyum

¹ Doç. Dr., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aile Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı, Burdur/Türkiye, Orcid: 0000-0002-8142-0749, nuslu@mehmetakif.edu.tr

² Psikolojik Danışman, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aile Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, Burdur/Türkiye, Orcid: 0009-0008-6705-5141, 2130201905@ogr.mehmetakif.edu.tr

sorunları yaşamaya başlar. Bu süreçte ailevi, toplumsal ve ekonomik sorunlara maruz kalan çocuklar, yaşam standartlarının altında kalmaya başlar ve kurallara uyma konusunda zorluk yaşayıp suça karışabilmektedirler (Bülbül & Doğan, 2016).

Çocuk suçluluğu içerisinde önyargı barındıran bir kavramdır. Suç eğer belli bir irade ile gerçekleştirilirse suç olarak kabul edilmektedir. Çocuklar yeterince gelişmemiş bir iradeye sahip oldukları için ebeveynler ya da diğer toplumdaki kişilerce sömürülebilmekte ve suçlu konumuna düşürülebilmektedir. Bu açıdan çocuklar suç işlemiş gibi görünseler de aslında istismar edilmektedirler. Çocuk suçluluğu bir bakıma çocuk istismarı olarak kabul edilmelidir (Eryalçın ve Duyan, 2021). Çocuk suçluluğu, 19. Yüzyılda işsizlik ve ahlaki bozulma nedeniyle ortaya çıkmakla birlikte politik, sosyal ve hukuki müdahalelere bağlı olarak tanımlanmakta ve bu konudaki yaptırımlar sürekli güncellenmektedir (Eryalçın ve Duyan, 2021).

Ülkemizde çocuk suçluluğu veya suçlu çocuk kavramı yerine suça sürüklenen çocuk kavramı kullanılmaktadır. “Suçlu çocuk yoktur suça sürüklenen çocuk vardır” ilkesi ile hareket ederek, Çocuk Koruma Kanunu suça sürüklenen çocuğu, “Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuk” olarak tanımlamıştır (Çocuk Koruma Kanunu, 2005). İlgili kanunda çocuğun suça itilmiş olması vurgulanmakta ve suç eyleminin gerçekleşmesinde en az payın çocukta olduğu sonucuna varılmaktadır (Güler, 2017; Bülbül & Doğan, 2016). Ayrıca çocuk, korunma ihtiyacı olan ve ceza adalet sisteminin öznesi olmayan bir birey olarak da kabul edilmektedir.

Çocukların işlediği suçlar yetişkinlerden farklıdır. Çocuk suçluluğunu klasik ceza hukukunda belirtilen tanımlarla açıklamak mümkün değildir. Çünkü bu kavram sadece hukuksal boyutu olan bir kavram değil beraberinde psiko-pedagojik ve sosyal yönü de olan bir kavramdır. Çünkü çocukluk dönemi belirli gelişim dönemlerinden oluşan bir süreçtir ve bu süreçte bu gelişim dönemlerinin özellikleri dikkate alınmalıdır (Eryalçın ve Duyan, 2021). Bu doğrultuda Türk Ceza Kanunu cezai ehliyeti konusunu, suçun işlendiği tarihten itibaren 0-12, 12-15 ve 15-18 yaş grubu olmak üzere üçe ayırmıştır. Cezai sorumluluk yaşı 12 yaşının tamamlanması ile kazanılmakta, 12-15 yaş grubunda suç fiilinin anlamını ve sonuçlarını anlama, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı halinde indirimlerle birlikte çocuğa özgü ceza uygulanmakta, 15-18 yaş grubunda ise çocukların cezai sorumlulukları kabul edilerek duruma göre indirimli şekilde ceza uygulanmaktadır (Türk Ceza Kanunu, 2004). Çocuk Koruma Kanunu'nda, çocuklara özgü, özgürlüğü kısıtlayıcı cezaların en son çare olarak kullanılması gerektiği vurgulanmakta ve bunun yerine koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirlerinin uygulanması önerilmektedir (Çocuk Koruma Kanunu, 2005). Bu durum çocukların gelişimsel özellikleri gereği ceza sorumluluğu, çocukluk çağının ceza sorumluluğuna etkileri ile açıklanmaya çalışılmakta; hatta bu gelişimsel yaş aralıkları toplumdan topluma değişmesi sebebiyle cezai sorumlulukları da ülkeden ülkeye değişebilmektedir (Güler, 2017).

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2023 yılında güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuklar incelendiğinde; 537.583 çocuk olduğu, bu çocuklardan 242.875'inin mağdur, 178.834'ünün

suça sürüklenen, 11.179'unun kabahat işlediği iddia edilen, 84.751'inin bilgisine başvurulmuş, 15.716'sının kayıp çocuk olduğu tespit edilmiştir. Suça sürüklenen çocuklardan yaklaşık 142.894'ünün erkek, 35.940'ının kadın olduğu, karışılan suçların başında yaralamanın geldiği, sırasıyla hırsızlık, pasaport kanununa muhalefet, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, satmak, satın almak, tehdit ve diğer suçlar olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bu çocuklardan 9.893'ünün 11 yaşından küçük, 51.537'sinin 12-14 yaş aralığında, 117.266'sının ise 15-17 yaş aralığında olduğu saptanmıştır (Türkiye İstatistik Kurumu, 2024).

Özellikle ergenlik dönemi suça sürüklenme açısından riskli bir dönemdir. Çünkü ergenlik dönemindeki çocuklar, özerklik arayışları ve risk alma eğilimleri nedeniyle yetişkinlere kıyasla daha saldırgan davranışlar sergilemekte ve suça yönelme olasılıkları daha yüksektir (Bülbül & Doğan, 2016). Delcea ve arkadaşlarının suça karışan çocuklarla yaptıkları çalışmada; çocukların çoğunun 15-16 yaşları arasında ve erkek olduğu, çocukların en sık işlediği suçun ise sırasıyla hırsızlık, ehliyetsiz araç kullanımı, ciddi bedensel yaralama ve soygun suçlarının olduğu belirlenmiştir (2019). Fındıklı ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise ergen psikiyatri birimine yönlendirilen suça sürüklenen çocukların %87.8'inin erkek olduğu, suç işlemenin 14-17 yaş aralığında arttığı ve en sık 14 yaşında görüldüğü, en çok işlenen suçun ise hırsızlık olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada erkek çocuklarının suça karışmasına yönelik iki nedene vurgu yapılmıştır. Birincisi toplumun kız çocuklarına karşı daha korumacı yaklaşması, ikincisi ise erkek çocuklarının saldırgan davranışlara daha meyilli olmasıdır (Fındıklı ve ark., 2016). Beşer ve arkadaşlarının (2016) çalışmasına göre, erkek cinsiyet, psikiyatrik

tanılar (özellikle davranış bozukluğu), kalabalık aile yapısı, eğitimi bırakma, ebeveyn yasal sorunları, madde kullanımı, göç ve kötü aile ilişkileri gibi bireysel ve çevresel faktörler, çocukların suça yönelimini artırmaktadır.

2. Duygu Düzenleme Becerileri

Duygular, bireylerin çevreleriyle etkileşime girmeleri sonucu oluşmaktadır. Gelişim dönemleri, psikolojik ve çevresel etkenlerin birbirleriyle etkileşimi sonucunda kişinin duyguları ortaya çıkmaktadır. Duygular bilinçli veya bilinçsiz, kültüre göre ya da kişinin kendisine göre şekillenebilmektedir (Weiss ve ark., 2020). Duygu düzenleme, duygusal uyarıcılarla karşılaşıldığında bireyin kendi içinde bulunduğu ortamla uyumlu bir şekilde duygularını düzenleyebilme yetisidir (Gross, 2015a; Gross, 2015b; McRae & Gross, 2020; Springstein & English, 2024). Duygu düzenleme, kişinin hangi duygulara sahip olduğunu, bu duygulara ne zaman sahip olduğunu ve bu duyguları nasıl deneyimlediğini veya ifade ettiğini şekillendirme süreci olarak tanımlanmaktadır (Gross, 2014). Duygu düzenleme becerileri, bireyin sağlıklı sosyal ve duygusal gelişim için kritik olan uyarlanabilir davranışı teşvik etmek amacıyla duyguları yönetmesine olanak tanımaktadır (Morris ve ark., 2017). Bu süreçte birey ya problem çözecek ya da oluşan duruma uyum sağlayacaktır. İnsan ilişkilerinde ve yeni durumlara uyum sağlamada oldukça işe yarayan duygu düzenleme, kişilerin gelişimine de katkı sağlamaktadır. Duygu düzenleme becerisi kazanılmadığı takdirde patolojilerin ortaya çıkmasına sebebiyet verebilmektedir (Güngör, 2019). Duygu düzenleme güçlüklerinin neden olabileceği davranışlar arasında kendisine ve çevresine zarar verebilecek

davranışlar, alkol ve madde kötüye kullanımı yer almaktadır (Güngör, 2019).

Aldao ve arkadaşlarının (2010) yapmış oldukları çalışmaya göre, psikopatolojiye karşı koruyucu olduğu geniş ölçüde teorize edilen üç duygu düzenleme stratejisi; yeniden değerlendirme, problem çözme ve kabul etmedir. Psikopatoloji için risk faktörleri olduğu tutarlı bir şekilde tartışılan üç strateji ise bastırma (hem dışavurumsal baskılama hem de düşünce baskılama dahil), kaçınma (hem deneyimsel kaçınma hem de davranışsal kaçınma dahil) ve ruminasyondur. Problem çözme, yeniden değerlendirme ve bilinçli farkındalık (uyumlu duygu düzenleme stratejileri), bireylerin duygularını sağlıklı bir şekilde yönetmelerine ve olumsuz duygularla başa çıkmalarına yardımcı olan yöntemler olarak öne çıkarken, bastırma ve kaçınma gibi stratejiler (uyumsuz duygu düzenleme stratejileri) duygusal sorunları çözmek yerine daha da kötüleştirebilir. Bununla birlikte, bu stratejilerin psikopatolojiyle ne derece ilişkili olduklarının doğrudan bir karşılaştırmasına ihtiyaç vardır (Aldoa ve ark., 2010).

Gross'un duygu düzenleme süreç modeline göre, bireyin mevcut durumu hedeflerine uygun olarak ele alması ve yorumlaması ile duygusal deneyim ve ifadeler ortaya çıkmaktadır. Duygu üretimi ve duygu düzenlemesi, zaman içinde ortaya çıkan karmaşık dinamik süreçler olarak kabul edilmektedir. Bu süreçler, diğer insanların tepki verme biçiminden ve genel durumundan etkilenmektedir. Genel olarak açıklanan süreçler, zamana, kişilerarası bağlama ve çevresel geri bildirime göre farklılık gösteren çok çeşitli duygu düzenleme dinamiklerini içermektedir. Gross, duygusal düzenlemede beş aşamadan bahsetmektedir. Bunlar; durum seçimi,

durum deęişiklięi, dikkat daęıtımı, bilişsel deęişim ve tepki modülasyonudur. Bu süreçlerin her birinin, uygulanabilecekleri zaman noktasına ve duygu üretme süreci üzerinde sahip oldukları birincil etkiye göre farklılık gösterdiği düşünülmektedir. İlk dört aşama öncül odaklı olarak kabul edilmekte ve duygular tam olarak ifade edilmeden önce duygu üretme döngüsünü etkilemektedir. Tepki modülasyonunun ise durum seçimi ve dikkat daęıtımı gibi daha önceki süreçler devreye girdikten sonra (örneğin, halihazırda oluşturulmuş duyguları örtmek veya gizlemek) meydana gelen davranışsal ifadelere odaklandığı kabul edilmektedir. (Quoidbach ve ark., 2015; Gross, 2015a; Gross, 2015b; McRae & Gross, 2020; Springstein & English, 2024).

Gross ve Feldman Barrett tarafından önerilen teorik bakış açılarına göre, duyguların zamanla ortaya çıkan çeşitli bölümleri vardır (örneğin, temel, değerlendirme, sosyal inşa). Belirli bir duygu düzenleme biçiminin "iyi" veya "kötü" olduğuna dair önsel bir varsayım yoktur. Ancak, herhangi bir duygu düzenleme stratejisine aşırı derecede güvenmek veya durumsal talepleri ve bağlamı göz ardı etmek olumsuz sonuçlara yol açabilir. Örneğin, duygusal olarak zorlayıcı sosyal durumlardan kaçınmak gibi kalıcı veya kronik durum seçimi, sosyal kaygıya neden olabilir. Öte yandan, dikkat daęıtımı bazı durumlarda kişinin önemli durumsal ve sosyal bilgileri kaçırmasına neden olabilir (Gross, 2015a; Gross, 2015b; McRae & Gross, 2020; Springstein & English, 2024). Gross, duygu düzenlemeyi hem içsel hem de dışsal olarak tanımlamıştır. Duygu düzenleme stratejilerini öncül odaklı (tepkiden önce) ve yanıt odaklı (tepkiden sonra) olarak ikiye ayırmıştır. Öncül odaklı düzenleme, tepkiden önce duyguları anlamlandırıp yeniden düzenlemeyi, yanıt

odaklı ise tepkiden sonra duygusal tepkilerin gerçekleşmesini ifade etmektedir (Gross, 2015a; Gross, 2015b; McRae & Gross, 2020; Springstein & English, 2024).

3. Ergenlik Döneminde Duygu Düzenleme Becerileri

Tüm düzenleyici işlevler gibi duygularımızı düzenleme kapasitemiz de erken yaşlardan yetişkinliğe kadar gelişmektedir. Kanıtlar, duygusal kontrolün ergenlik döneminden yetişkinliğe doğru geliştiğini göstermektedir (Schweizer ve ark., 2020; Crowell, 2021). Yapılan çalışmalarda duygu düzenlemenin olumlu yakın ilişkiler, olumlu sosyal davranış, sosyal beceriler, içselleştirme ve dışsallaştırma davranışları, akademik ve mesleki başarıda dahil olmak üzere fiziksel, davranışsal ve zihinsel sağlık sonuçlarıyla ilişkili olduğu bildirilmektedir (Aldoa ve ark., 2010; Fisk&Friesen, 2012; Morris ve ark., 2017; Winiarski ve ark., 2017; English & Eldesouky, 2020, Hoffman ve ark., 2020).

Gelişimsel teorilere göre küçük çocuklar, bu yetenekleri aşamalı olarak içselleştirmeden önce, duyguları düzenlemek için başlangıçta bakıcılarıyla olan etkileşimlerine güvenirlir. Çocuklar okul öncesi döneme geldiklerinde genellikle ruhsal durumlarını yönetmek için geniş bir davranışsal ve bilişsel strateji repertuarı oluşturmaktadırlar ve bu stratejiler ergenliğe ulaştıkça daha da gelişmektedir. Ancak tüm çocuklar sağlıklı bir duygu düzenleme profili geliştirememekte, bazıları adaptif duygu düzenleme strateji geliştirebilirken bazıları maladaptif duygu düzenleme stratejileri geliştirebilmektedirler (Rogosch ve ark., 2013; Braet ve ark., 2014; Cracco ve ark., 2015; Schäfer ve ark., 2017).

Ergenlik, bireyin kimlik gelişimi ve duygusal olgunlaşma süreçlerinin yoğunlaştığı bir dönemdir. Bu dönemde, hormonal değişimlerin etkisiyle duygular daha yoğun yaşanır ve bu duyguların düzenlenmesi zorlaşabilir. Ergenlik sürecinde sorunlarla karşılaşan ergenlerin ailelerinden öğrendikleri başetme mekanizmalarını, bilişsel esneliği ve problem çözmeyi kullanmaları olasıdır. Bir kriz süreci olabilen ergenlikte gençler sağlıklı olmayan başetme mekanizmalarını sıklıkla kullanabilmekte ve başedemedikleri sorunları yok sayabilmekte ve kaçınmayı kullanabilmektedirler (Bedel ve ark., 2015). Çeşitli duygularla başetmek durumunda kalan ve olumsuz duygular yaşayabilen ergenlerin duygusal regülasyonları bozulabilmektedir (Sarıtaş Atalar & Altan Atalay, 2018). Literatürde ergenlerdeki duygusal düzenleme yaşı ile ilgili farklı çalışma bulguları bulunmakta ve bu konuda kesin bir fikir birliği sağlanamamaktadır. Cracco ve arkadaşlarının (2017) 8-18 yaş arasındaki çocuk ve ergenlerle yaptıkları çalışmada, 12-15 yaş arasındaki ergenlerde uyarlanabilir stratejilerin kullanımının azaldığı ve maladaptif stratejilerin kullanımının arttığı bildirilmektedir. Sanchis-Sanchis ve arkadaşlarının çalışmasında 9-12 yaş grubundaki çocukların ve ergenlik öncesi çocukların, duygu düzenleme stratejilerinde 13-16 yaş grubuna göre daha düşük puanlar aldığı belirlenmiştir. Ayrıca çalışmada kızların küçüklüklerinde erkeklerden daha yüksek puanlar almalarına karşın, büyüdüklerinde erkeklerden daha düşük puanlar alma eğiliminde oldukları saptanmıştır (Sanchis-Sanchis ve ark., 2023).

Ergenlerin duygu düzenleme stratejileri incelendiğinde, içsel işlevsel yöntemlerin en çok tercih edilenler arasında olduğu bulunmuştur (Hendekçi, 2019). Yapılan bir çalışmada; içe yönelim

sorunları olan ergenlerin bilişsel düzenleme stilini, dışa yönelim sorunları olan ergenleri davranışsal düzenleme stilini ve eşzamanlı içselleştirme ve dışsallaştırma sorunları olan ergenlerin ise maladaptif düzenleme stilini kullandıklarını bildirilmektedir (Brinke ve ark., 2021). Ayrıca ergenlikte belirli stratejilerin (yani, bastırma, ruminasyon ve kaçınma) alışılmış kullanımının artan depresyon ve kaygı oranlarıyla ilişkili olduğu belirtilmektedir (Aldao ve ark., 2010; Larsen ve ark., 2013; Palmer ve ark., 2018; Akbulut, 2018; De France ve ark., 2019). Ergenlikte duygu düzenleme ile ilgili yapılan bir metaanaliz çalışmasında; kaygı ve depresyonun problem çözme, yeniden değerlendirme ve kabul etme ile olumsuz yönde, kaçınma, ruminasyon ve bastırma ile olumlu yönde ilişkili olduğu bulunmuştur (Schäfer ve ark., 2017). Bu çalışma sonuçları, duygu düzenleme süreçlerinin ruhsal bozuklukların gelişiminde ve sürdürülmesindeki rolünü göstermektedir. Ayrıca ergenlerin duygu düzenlemelerinde öz düzenleme eğilimleri değiştiğinde, ergenlerin öz düzenleme yöntemleri de değişebilmektedir. Ergenler bilişsel öz-düzenleme stratejilerini çocuklara göre daha fazla kullanabilmektedir (Compas ve ark., 2017; Larsen& Luna, 2018).

Ergenlikte ebeveynler ve akranlar, temel gelişimsel görevlerden biri olan duygu sosyalleştirmesi ve özerk işlevsellik yoluyla ergenlerin duygu düzenlemesinin gelişiminde önemli aktörlerdir. Duygu sosyalleşmesi, bakıcıların duyguları yorumlamanın ve ifade etmenin normatif yollarına aracılık ettiği çok çeşitli sosyal, sözel ve somutlaşmış uygulamaları içeren dinamik bir süreçtir (Cekaite & Ekström, 2019). Araştırmalar, duygusal zekanın temel bileşenlerinden biri olan duygu sosyalleşmesinin gelişiminde ebeveyn-çocuk ilişkisi ve aile ortamının etkili olduğunu göstermiştir

(Morris ve ark., 2017a; Morris ve ark., 2017b). Yapılan farklı çalışmalarda, "pozitif" ebeveyn tutumlarının (bakıcı sıcaklığı, duygusal duyarlılık vb), erken-orta çocukluk döneminde yeniden değerlendirmenin daha sık kullanılmasından ergenlik döneminde daha iyi psikososyal uyum sağlamaya kadar uzanan, gençlerde daha iyi duygu düzenleme sonuçlarıyla ilişkili olduğu belirtilmektedir (Gunzenhauser ve ark., 2014; Morris ve ark., 2017a; Morris ve ark., 2017b; Cui ve ark., 2020). Başka bir çalışmada da 5 yaşındaki pozitif ebeveyn tutum ve davranışlarının, 15 yaşında daha iyi sosyo-duygusal uyumu öngördüğü ve özellikle bu ilişkinin 10 yaşında artan duygusal düzenleme ile ilişkili olduğu bildirilmektedir (Perry ve ark., 2020). Pozitif ebeveyn tutumları, hem sağlıklı hem de psikiyatrik tanıları olan gençlerde daha iyi duygu düzenleme ve psikososyal sonuçlar sağlamaktadır (Breaux ve ark., 2018; Boldt ve ark., 2020; Cui ve ark., 2020; Thompson et al., 2020; Zhang ve ark., 2020). Bununla birlikte, ebeveynlerin gençlerin olumlu duygularına verdikleri tepkilerle farklı şekillerde ilişkili olduğu, ebeveynlerin kendi duygu düzenlemeleri ile çocuklarının duygu ifadelerine verdikleri yanıtların da birbiri ile ilişkili olduğu görülmektedir (Nyquist ve ark., 2022). Ayrıca ergenlerin duygu düzenleme nörobiyolojisinde aile ve ebeveynlik davranışlarının rolünün olduğu vurgulanmaktadır (Silvers, 2022; Kerr ve ark., 2022; Lin ve ark., 2024). Ek olarak, düşük sosyoekonomik risk (daha yüksek sosyoekonomik statü ve daha düşük ev kaosu) ve daha olumlu bir aile duygusal bağlamı (ebeveyn duygu düzenlemesi, ebeveyn duygu düzenlemesi, ebeveynlik uygulamaları ve ebeveyn-ergen ilişkisi kalitesi) duygu düzenlemede yıldan yıla artan daha büyük artış ile ilişkilidir (Herd ve ark., 2020). Sosyoekonomik risklerle dolu bir

evde büyümenin getirdiği zorluklar, ergenlik dönemindeki duygu düzenlemeyi olumsuz olarak etkileyebilmektedir.

Ergenlik dönemindeki bir diğer önemli sosyal değişim, akranlarla ilişkilerdir ve romantik ilişkilerin başlamasıdır. Ebeveynlerle ilişkilerden farklı olarak akranlar arasındaki ilişkiler tamamen yataydır ve dışsal duygu düzenlemeyle ilişkilendirilmektedir (Dixon-Gordon ve ark., 2015; Miller-Slough ve Dunsmore, 2016). Cinsiyet farklılıkları açısından, arkadaşlarından cezalandırıcı tepkiler (yani ebeveynlerin ergenlerin duygularına maruziyetini azaltan bir ceza) algılayan ergen kızlar, erkeklere göre daha fazla duygu düzenleme güçlüğü yaşamaktadırlar (Miller-Slough ve Dunsmore, 2016). Azpiazu Izaguirre ve arkadaşlarının çalışmasında (2021); arkadaşlardan gelen desteğin ve duygu düzenlemenin de dayanıklılığı açıkladığı, aile ve öğretmenlerin desteğinin de duygu düzenlemeyi yordadığı belirlenmiştir. Duygu düzenleme ve sosyal desteğin ergenlerde yaşam doyumunu dayanıklılık yoluyla dolaylı olarak etkilediği bulunmuştur.

Ergenlik döneminde duygu düzenleme stratejilerinin ve yeteneklerinin gelişiminin tam olarak tanımlanması gerekmektedir. Rothenberg ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, ergenlerde günlük üzüntü veya öfke artışlarının depresif veya agresif semptomların ortaya çıkma riskini artırabileceği belirtilmektedir. Bununla birlikte çalışmada, günlük üzüntü ve öfkeyi tanımlama ve bunlarla başa çıkma stratejilerinin tüm ergenlere tanıtılması gerektiği vurgulanmaktadır (2019). Özellikle literatürde ergenlik döneminde boylamsal çalışmaların sınırlı olması, duygu düzenleme stratejileri ve yetenekleri kavramları arasındaki ortak bir tanımın olmaması ve

kafa karışıklığının olması literatürdeki konu ile ilgili sınırlılıkların olduğunu göstermektedir.

Duygu düzenleme nörofizyolojik, bilişsel, davranışsal ve sosyal bileşenleri içermektedir. Ergenliğin duygu düzenlemenin gelişimi için özel bir dönem olduğu genel olarak kabul edilse de çoklu duygu düzenleme süreçlerinin gelişimsel yönleri hakkında bilgi eksiktir. Çalışmaların çoğu kesitseldir. Bu durum yaş farklılıklarını grup etkileriyle karıştırabilir ve stratejiler, etkililik ve hedefe ulaşma becerileri gibi spesifik süreçlerin yaşla birlikte nasıl değiştiğinin doğrudan araştırılmasına izin vermemektedir. Duygu düzenlemede yer alan farklı süreçler de nadiren açıkça ayırt edilmekte ve sınırlı sayıda strateji araştırılmış durumdadır. Bu nedenle, ergenlerin yeni ve farklı bağlamları deneyimlerken çeşitli stratejileri nasıl harekete geçirdikleri, bu konuda ne kadar etkili oldukları ve ergenlik döneminde diğer yapılarla ilişkili olarak duygu düzenleme yönlerinin nasıl değiştiği konuları hala belirsizliğini korumaktadır (Fombouchet ve ark., 2023).

4. Suça Sürüklenen Ergenlerde Duygu Düzenleme

Ergen suçluğunda etkili olabilen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler; bireysel (cinsiyet, yaş, psikolojik bozukluklar, kalıtsal etkenler), ailesel (aile yapısı, ilişkileri, eğitim düzeyi ve tutumları), çevresel (akran grupları ve eğitim oranı) ve toplumsal (ekonomi, eğitim sistemi ve kültürel normlar/politikalar) faktörlerdir (Nisar ve ark., 2015; Evans ve ark., 2016; Trinidad ve ar., 2020; Bagheri ve ark., 2022; Abhishek & Balamurugan, 2024). Literatürde ergenlerin tutuklanmasıyla ilişkili bireysel statik (ırk/etnik köken, sosyoekonomik durum ve cinsiyet) ve dinamik faktörler (madde kullanımı, saldırganlık, hiperaktivite ve duygu düzenleme)

belirlenmiştir. Her ne kadar bu faktörler bazı tedavi ihtiyaçlarının belirlenmesinde yardımcı olsa da ergenlik dönemindeki suçluluk riskinin dinamik tablosu hala eksiktir (Kemp ve ark., 2017). Dinamik faktörler, tekrar suç işleme olasılığını artırabilen bireylerin ve çevrelerinin değişebilir yönleridir (Mann ve ark., 2010). Dinamik faktörlerin değerlendirilmesi, tekrar suç işleme riskini azaltmak ve tedavi ilerlemesi hakkında fikir vermesi bakımından müdahaleler için hedefler belirlemeye yardımcı olacaktır (Klepfisz ve ark., 2016). Duygusal düzenleme ile ergen suçluluğu arasındaki ilişkinin aydınlatılması, mevcut tedavi seçeneklerini geliştirme ve risk altındaki ergen suçluluğu oranlarını azaltma potansiyeli taşımaktadır.

Ergenlik döneminde gelişim dönemi ile ilgili yaşanan değişimler ergenlerin bazı sorunlar yaşamasına neden olabilmektedir. Ergenlerin duygusal olarak yaşadıkları problemler yaşlarına, okula ve ailelerine karşı tutumlarına, zekalarına ve aidiyet hissetmelerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bu gelişim kriz sürecinde ehliyetsiz araç kullanmaktan hırsızlık yapmaya kadar değişen yasa dışı davranışlara neden olabilen riskli davranışlar görülebilmektedir (Kahn ve Graham, 2019; Defoe, Rap & Romer, 2022; Skaar, 2024). Ergenlikte hormonların da etkisiyle yaşanan duygusal iniş çıkışlar, başetme ve becerilerdeki yetersizlikler duygu düzenleme becerisinin gelişimini gerektirmektedir. Ancak, ergenlik döneminde bazen yetersiz duygu düzenleme becerileri nedeniyle sorunlar yaşanabilmektedir. Sevgi eksikliği, baskıcı ebeveynlik ve empati eksikliği, ergenlerde toleranssızlık geliştirme riskini artırabilmekte, öfke kontrolünü olumsuz olarak etkileyebilmekte ve saldırganlığa yol açabilmektedir. Ergenler, hatalı öğrenme ve yanlış

rol modellerinden etkilenererek şiddet eğilimi gösterebilmektedirler (Kahn ve Graham, 2019; Defoe, Rap & Romer, 2022; Skaar, 2024; Burrows & Kieselbach, 2024). Özellikle duygusal ifade ve yönetim becerileri zayıf olan ergenlerde şiddet eğilimi daha da belirgin olabilmektedir. Maalesef bu sorunlar, ergenleri şiddet ve suça yönlendirebilmektedir (Topçuoğlu, 2023). Literatürde suça sürüklenen ergenlerin olumsuz duygularla baş etme, kabul ve tolere etme konusunda daha fazla zorluk yaşadıkları, vicdan işleyişlerinin farklı ve empatik kapasitelerinin düşük düzeylerde olduğu, utanç ve suçluluk hissetmeye daha az eğilimli oldukları ve sorunlu içgörü yeteneğine sahip oldukları bildirilmektedir. Ek olarak, suça sürüklenen ergenlerin duygusal olarak duyarsız oldukları, diğer insanların duygularını anlama konusunda yeterince çaba sarfetmedikleri, duygusal karar vermede daha fazla risk alma eğiliminde olmalarına karşın risk yönetiminde daha az dikkatli oldukları, kurban odaklı olmaktan çok ceza odaklı oldukları belirtilmektedir (Kerig ve ark., 2012; Schalkwijk ve ark., 2016; Poon, 2020; İmrek ve ark., 2023; Garritsen ve ark., 2024).

Bunlara ek olarak, suça sürüklenmiş ergenler sadece adalet sistemine dahil olmakla kalmayıp suç ile birlikte görülen bazı ruhsal sorunlar da yaşayabilmektedirler. Ergenlerde davranış bozukluğu hariç tutulduğunda bile en az bir psikiyatrik bozukluğa sahip oldukları görülmektedir. Bu sorunlar; davranım bozukluğu, psikolojik sıkıntı, posttravmatik stres bozukluğu, öfke, saldırganlık, anksiyete, depresyon, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, düşük zeka seviyesi, konuşma bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, karşıt gelme karşıt olma bozukluğu, alkol ve madde bağımlılığıdır (Falk ve ark., 2014; You ve ark., 2015; Lyu ve ark.,

2015; Beşer ve ark., 2016; Eyüboğlu & Eyüboğlu, 2018; Beaudry ve ark., 2021; Guarnaccia ve ark., 2022; Garritsen ve ark., 2024). Yapılan bir sistematik derleme ve metaregresyon çalışmasında; erkeklerde en çok depresyon ve dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğunun, kızlarda ise en çok majör depresyon ve postravmatik stres bozukluğunun görüldüğü bildirilmektedir (Beaudry ve ark., 2021). Ayrıca antisosyal davranışlar ve çoklu mağduriyet arasında da bir ilişki vardır. Çoklu mağduriyet yaşayan ergenlerin suç işleme olasılıklarının ve psikolojik sorunlar yaşama eğilimlerinin yüksek olduğu dikkate alınmalıdır (Pires & Almeida, 2023). Bunların dışında suça sürüklenen ergenler adli süreçte de farklı sorunlar yaşayabilmekte ve ikincil travma yaşayabilmektedirler (Keels, 2024). Türkiye’de cezaevlerinde kalan çocuklarla yapılan çalışmada, bazı çocuklar öfkeyi güçlü olma olarak tanımlamakta, çocuklar öfke kontrolünün yaşadıkları çevrede işe yaramayacağını ve suça karıştıklarında duygusal olarak suçluluk ve üzüntü hissettiklerini belirtmektedir (Çadırcıoğlu, 2023). Başka bir çalışmada ise yargılama sürecindeki belirsizliklerin ve duygusal zorlukların, çocukların yaşadığı stresi arttırdığı, çocukların yaşadıkları kaygı ve korkuyu öfke ile ilişkilendirdikleri ve çocukların adli sicillerinin etkilenmesinden endişe duydukları bildirilmektedir (Sağlam & Aral, 2017). Suça sürüklenen ergenlerde bir veya daha fazla ruhsal bozukluğun varlığı, ceza adalet sistemine dahil olma durumunun yaşam boyu sıklığını öngörmekle kalmamakta, aynı zamanda tekrar suç işleme olasılığının arttığını da göstermektedir (Falk ve ark., 2014; Lyu ve ark., 2015; Beaudry ve ark., 2021; Guarnaccia ve ark., 2022; Garritsen ve ark., 2024). Tüm bunlar suça sürüklenen ergenlerde duygu düzenlemede zorluklar yaşanmasına neden olabilmektedir.

Suçla sürüklenen ergenlerin en travmatize olmuş ve en savunmasız gruplar arasında olduğu iyi bilinmektedir (You ve ark., 2015; Sevecke ve ark., 2016; Keels, 2024; Kerig ve ark., 2024; McKenna ve ark., 2024; Schuster ve ark., 2024; Zelechowski ve ark., 2024). Malvaso ve arkadaşlarının yaptığı sistematik derlemede (2022), ceza hukuku sistemine dahil olan gençlerin, sisteme dahil olmayan gençlere kıyasla en az bir olumsuz veya travmatik olay yaşama olasılığının 12 kat daha fazla olduğu bulunmuştur. Araştırmalar, çocukluk çağı travmasına maruz kalma türü ile sonraki suçlu davranış tipleri ve örüntüleri arasında giderek daha güçlü bir ilişki olduğunu göstermiştir. Yapılan farklı çalışmalarda çocukluk çağı travmalarının hırsızlık, flört şiddeti, zorbalık, kavga, cinsel suç ve çete katılımı gibi belirli suç ve şiddet davranışları üzerindeki önemli etkisinin olduğunu göstermektedir. Özellikle duygusal, fiziksel ve/veya cinsel istismara uğramış ve çocukluklarında hayvanlara zulüm yapmış çocukların yetişkin olduklarında insanlara karşı suç işleme olasılıkları daha yüksek olduğu görülmektedir (Siegel, 2003; Heide ve ark., 2011; Trentham ve ark., 2018; Leban & Delacruz, 2023; Hesselink, 2023). Yapılan bir çalışmada cinayet suçu işleyen erkek çocuklarının evde ve mahallede maruz kaldıkları, ebeveynleriyle zayıf bağlar kurdukları, hayvanlara karşı zalim oldukları, aldatıcı davranışlar sergiledikleri, yangın çıkarma eylemlerinde bulundukları, kurbanlarını boğdıkları veya ateşe verdikleri bulunmuştur. Aynı çalışmada kadın çocuk cinayet suçlularının ise yetersiz ebeveyn denetimine sahip oldukları, zayıf öfke kontrol becerileri sergiledikleri, sağlıksız cinsel deneyimler yaşadıkları, okuldan kaçma davranışı sergiledikleri ve cinayet hakkında kafa yordukları belirlenmiştir (Heide ve ark., 2011).

Çocukluk çağı travmaları, özellikle suça sürüklenen ergenler arasında yaygındır ve duygu düzensizliğine yol açmaktadır (Sevecke ve ark., 2016; Tinajero ve ark. 2020). Bu nedenle, ergenlerde suçluluğu ele almak ve önlemek için çocukluk çağı travmaları yaşayan ergenler yüksek riskli olarak değerlendirilmeli ve duygu düzensizliğine yol açacağı dikkate alınmalıdır. Çünkü çocukluk çağı travmalarının suç işleme sonucu dışında tüm yaşamı üzerinde olumsuz etkileri vardır (Hesselink, 2023; Keels, 2024; Kerig ve ark., 2024). Travmanın birincil etkileri ilk olarak nörobiyolojik düzensizliklere (amigdala, hipokampus, prefrontal korteks ve korpus kollosum hacimlerinde azalma, ventral ve dorsal prefrontal korteksteki daha az gri madde hacimleri ve kalınlığı HPA aksında ve glukokortikoid sekresyonunda değişiklik vb) neden olmaktadır. Nörobiyolojik değişiklikler maalesef çocuklarda nöropsikolojik ve bilişsel sorunların da temelini oluşturabilmektedir. Bilişsel, psikolojik, duygusal ve davranışsal düzensizliklere yol açmaktadır. Özellikle nörobiyolojik yetersizlikler nedeniyle bireylerin öz düzenleme ve bilinçli karar verme kapasiteleri azalmaktadır (Nemeroff, 2016; Reilly& Gunnar, 2019; Tinajero ve ark. 2020; Lim ve ark., 2023; Cai ve ark., 2023). Ayrıca çocukluk çağı travmaları, vücutta çeşitli nöroendokrin değişikliklerle birlikte DNA’da değişikliklere neden olmakta ve bu epigenetik değişiklikler kardiyovasküler hastalıklar, obezite, kanser gibi hastalıklar ile birlikte çeşitli psikiyatrik bozuklukların gelişiminde risk oluşturmaktadır. Ayrıca bunlara ek olarak bu değişiklikler, genoma da taşınarak kalıtım yoluyla gelecek nesillere de aktarılabilmektedir (Nemeroff, 2016; Parade ve ark., 2021). Ek olarak çocukluk çağı travmaları; güvensiz bağlanma, sosyal becerilerin bozulması, yaşam

ve uyku kalitesinde azalma, anksiyete, depresyon, bipolar bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, psikopati, psikoz, flört şiddeti mağduru ya da faili olma, sigara, alkol ve madde kullanımı, kendine zarar verme, intihar girişimi/intihar, evden/okuldan kaçma, cinsel kimlik bozuklukları, erken yaşta cinsel aktiviteye başlama, korunmasız cinsel ilişki, fuhuşa eğilim/fuhuş, anti-sosyal davranışlar, saldırganlık, suça eğilim ve suç işleme ile sonuçlanmaktadır (Sevecke ve ark., 2016; Garofalo ve ark. 2018; Protic ve ark., 2020; Keels, 2024; Kerig ve ark., 2024; McKenna ve ark., 2024; Schuster ve ark., 2024; Zelechowski ve ark., 2024). Genel olarak bu sonuçlar çocukluk çağı travmalarının daha yüksek düzeyde olumsuz duygusallığa yol açtığını göstermektedir. Bununla birlikte, hapsedilen ergenlerin çoğunun daha önce yaşadığı travma ile hapisane ortamı ile birlikte daha fazla yoksunluk yaşaması daha fazla travmatize olmasına neden olabilmektedir (Armour, 2012). Bu nedenle, zaten dayanıklılıktan yoksun olan gençlerin hapsedilmesi, psikolojik gelişimi daha da geciktirebilir, normal ergenlik gelişimini engelleyebilir ve potansiyel olarak yetişkinliğe geçişte zorluklara katkıda bulunabilir. Ergenlerin yaşadıkları bu zorluklar, ergenlerin genellikle saldırgan davranışa dönüşen hayal kırıklığı veya duygularla başa çıkma zorlukları yaşama olasılıklarını arttırmaktadır (Wolff &Baglivio 2017; Hodgkinson ve ark., 2021). Suç işleyen ergenlerin karmaşık psikolojik profilleri göz önüne alındığında, bu popülasyonda suç işlemeyi azaltmayı amaçlayan duygu düzenleme müdahalelerin etkinliğini anlamak çok önemlidir. Araştırmalar genellikle antisosyal bireylerin ergenlik gibi erken gelişim aşamalarında müdahaleye daha iyi yanıt verme eğiliminde olduğunu göstermektedir (Salekin, 2015).

5. Sua Sürüklenen Ergenlere Yönelik Geliştirilen Duygu Düzenleme Müdahaleleri

Ergenlik döneminde duygu düzenleme yeteneklerini geliştirmek, gençlerin bu gelişim döneminde karşılaştıkları zorluklar ve fırsatlarla başa çıkmalarına yardımcı olmaktadır. Duygusal destek eğitim programlarının uygulanmasıyla, çocukların duygusal olarak desteklendikleri ve farkındalıklarının arttığı gözlemlenmiştir. (Sağlam & Aral, 2017). Ergenlik döneminde, riskli davranışlar meydana gelmeden önce duygu düzenleme müdahalelerinin yapılması önemlidir. Bu tür müdahaleler, gençlerin riskle ilgili tutum ve davranışlarını şekillendirmede etkili olabilir. Özellikle doğrudan duygu düzenleme becerilerini hedeflemenin, ruh sağlığı belirtileri olan gençlerde sağlık riski taşıyan davranışları ele almada yararlı bir yaklaşım olduğu görülmektedir.

Ergenlik döneminde duygu düzenleme becerilerinin geliştirilmesi, gençlerin sağlıklı bir şekilde duygularını ifade etmelerine ve olumlu sosyal ilişkiler geliştirmelerine yardımcı olabilir. Ancak, bu becerilerin geliştirilmesinde etkili olan müdahalelerin dikkatli bir şekilde planlanması ve uygulanması gerekmektedir. Sua karışmayan ergenlerde duygu düzenlemeye dayalı müdahalelerin etkililiğini inceleyen çalışmalar, duygusal farkındalığın artmasına ve kaygı ile mutsuzluğun azalmasına katkıda bulunabilecek çeşitli müdahalelerin (bilinçli farkındalık, bilişsel davranışçı yaklaşım, duygulanım düzenleme, müzik terapisi, meditasyon, diyalektik davranış terapisi) etkili olduğunu göstermektedir (Gamsız Tun & Dursun, 2021; Saccaro ve ark., 2024; Bohus ve ark., 2015; Gratz ve ark., 2015; Kahveci, 2022; Farb ve ark., 2014; Weytens ve ark., 2014; Akbulut, 2018; Bone ve ark.,

2022). Ergenlerle yapılan alıřmalarda, hedef belirleme ve kabul etme gibi psikoeđitim ieren mdahalelerin, akran desteđinin duygu dzenleme zerinde gl etkileri olduđu gzlemlenmiřtir (Cui ve ark., 2020; Helland ve ark., 2022, Sahi, Eisenberger & Silvers, 2023). Bir sistematik derleme alıřmasında; olumsuz akran deneyimleriyle karřı karřıya kalan genlerin sonularını iyileřtirmeye hizmet edebilecek mdahale ve nleme alıřmaları (rneđin, okul temelli řiddeti nleme ve sosyo-duygusal đrenme programları, ebeveynlik uygulamaları) yapılması nerilmektedir (Herd, T& Kim-Spoon, 2021).

Sulu ocuklarla yapılan mdahalelerde ise duygu dzenlemeden ziyade ođunlukla sulu davranıřlarda azalmaya odaklanılmıřtır. Ancak literatrde sua srklenen ocuklarda duygu dzenleme becerilerindeki geliřimden sonra sua karıřma ve tekrar su iřleme olasılıđının daha dřk olduđu bilinmektedir (Tangney ve ark., 2017; Docherty ve ark, 2022; Danisworo & Wangid, 2022). Ancak sua srklenen ocuklarda duygu dzenleme becerilerinin geliřtirildiđi ve etkilerinin deđerlendirildiđi sınırlı sayıda alıřma bulunmaktadır. Bu alanda duygu dzenleme becerilerinin etkilerini deđerlendiren kanıt dzeyi yksek alıřmalara ihtiya duyulmaktadır.

Jafari ve arkadaşlarının (2017) Islah ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan gen sulularla yaptıkları alıřmada bařetme becerileri eđitiminin duygusal uyum zerindeki etkileri deđerlendirilmiřtir. alıřmada deney grubunda duygu dzenleme glkleri ortalama puanlarının kontrol grubuna gre istatistiksel olarak nemli farklılık gsterdiđi belirlenmiřtir. alıřma sonrasında,

başa çıkma becerileri eğitimi alan ergenlerin uygun duygu düzenleme tarzında davrandıkları belirlenmiştir.

Suçlu ergenlerde duygu düzenleme ve bağlanma ile ilgili olarak Keiley ve arkadaşları Çoklu Aile Grup Müdahalesi geliştirmişlerdir. Çoklu Aile Grup Müdahalesi'nin geliştirilmesi (Keiley, 2002a), içeriği (Keiley, 2002b) ve uygulanması hakkında daha fazla bilgi önceki yayınlarda (Keiley, 2007) bulunmaktadır. Çoklu Aile Grup Müdahalesi, bireylerin ve aile üyelerinin yüksek uyarılmayı (duygusal veya cinsel) tolere etmelerine ve yönetmelerine, alışılmış tepkilerini değiştirmelerine ve maladaptif veya suç teşkil eden davranışları (örneğin cinsel suç işleme, suç işleme, bağımlılık) içermeyen kararlar alabilmeleri için bilişsel işlevlerine yeniden erişim sağlamalarına yardımcı olmak için geliştirilmiştir. İlk olarak, fizyolojik uyarılmanın tırmanmasının ve tüm aile üyeleri kendi alışılmış tepkilerini gösterdiğinde ortaya çıkan etkileşim döngülerinin çeşitli yönlerine odaklanılmaktadır. İkinci olarak, katılımcıların bilişsel süreçleri geri kazanmalarına ve daha az zararlı tepkiler oluşturmalarına olanak sağlamak için bu döngülerin kesintiye uğramasına odaklanılmaktadır. Çoklu aile grubunda; ergenler, aile üyeleri, kolaylaştırıcılar hepsi aynı odada buluşmakta, içerik fizyolojik değişiklikleri fark etme, durma ve hiçbir şey yapmama, korkuya erişme, empati kurma ve savunmasızlık riskini alma gibi mikro becerileri kullanarak fizyolojik ve/veya cinsel uyarılmayı yönetmeye odaklanarak başlamaktadır. Katılımcılara duygusal olarak uyarılmış hissettiklerinde ortaya çıkan belirli fizyolojik deneyimler hakkında sorular sorulmakta ve yoğun duyguları kapatıp katlanmanın bir yolunu bulmalarına yardımcı olunmaktadır. Daha sonra, özellikle bu güçlü olumsuz tepkiyi

besleyen korku hakkında tekrar düşünmeye başlamak için kendilerini yeterince sakinleştirmenin bir yolunu bulmalarına yardımcı olunmaktadır. Kullandıkları sakinleştirici prosedürler derin nefes alma, gözlerini kapatma, tamamen hareketsiz durma, oturma veya ağızlarını kapatma olabilmektedir. Buradaki ana odak noktası, nasıl durup bir saniyeliğine hiçbir şey yapmayacaklarıdır. Katılımcılar sakinleştikten sonra, son derece duygusal deneyimleriyle ilgili olan daha savunmasız duyguları keşfetmeleri için yardımcı olunmaktadır. Katılımcılar kendilerini daha az uyarılmış ve daha sakin hissettiklerinde, bilişsel becerilerini kullanabilir ve diğer kişinin bakış açısını benimsemeye çalışabilirler, bu da diğer bireylere ve onların bakış açılarına karşı daha fazla empati ve saygı deneyimlemelerini sağlamaktadır. Bu yeni bilgiyle, üzüntü, korku veya utanç gibi kendi daha savunmasız duygularını ifade etme riskini alabilirler. Savunmasız duyguların ifadesi, diğerlerini de benzer şekilde yanıt vermeye davet ederek, dahil olan herkesin fizyolojik uyarılmalarının tırmanmasını azaltır ve uzlaşma için bir alan açar. Katılımcılar daha savunmasız duygularının seviyesinde iletişim kurduklarında, daha fazla bağlantı kurduklarında ve böylece iletişim kurabildiklerinde, aralarında ortaya çıkan güncel veya geçmiş zorlukları tartışabilir ve bazı ortak çözümlere varabilirler.

Çoklu Aile Grup Müdahalesi için kullanılan süreç üç yönlüdür: (a) mikro becerilerin sunumu (fizyolojik değişiklikleri not etmek, durmak ve hiçbir şey yapmamak, korkuya erişmek, empati kurmak ve savunmasızlık riskini almak); (b) katılımcıların uyarıldığı ve alışkanlık kalıplarına katıldığı yakın tarihli bir olayı tartışırken etkileşimli grup terapisi; (c) ve bu olayların gerçekleştiği şekliyle rol

yapma ve mikro becerileri kullandıktan sonra farklı şekilde nasıl gerçekleşebileceğini anlatma (Keiley, 2002a, Keiley, 2002b, Keiley, 2007). Bu müdahale yazarın kendisi tarafından daha sonra farklı zamanlarda uygulanmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. İlki, 2007 yılında uygulanmıştır (Keiley, 2007). Bu müdahale, hapse girmiş ergenlerde tekrar suç işlemeyi azaltmak ve ailelerin zorlayıcı etkileşim kalıplarını duygu düzenleme ve bağlanma perspektifinden değiştirmek için etkili ve uygun fiyatlı bir tedaviye olan ihtiyacı karşılamak üzere geliştirilmiştir. Sekiz haftalık program, Indiana'daki iki gençlik ıslah evinde yürütülmüştür. Çalışmaya 73 ergen ve 67 bakıcı katılmış, çalışma sonuçları öntest-sontest ve 6 aylık izlem ile değerlendirilmiştir. Ergenler ve bakıcılar, ergenlerin dışsallaştırıcı davranışlarının, içselleştirme semptomlarının, alkol ve uyuşturucu kullanımının zamanla önemli ölçüde azaldığını bildirmişlerdir. Ergenlerin ebeveynlerine, özellikle de diğerlerine bağlanmalarının, önemli ölçüde arttığı belirlenmiştir (Keiley, 2007). Keiley'in uyguladığı bir diğer çalışması (2015) da Alabama'daki bir çocuk ıslah evinde cinsel suç işleyen ergenler ve aileleriyle yürütülen sekiz haftalık bir tedavidir. 115 tutuklu erkek ergen ve bakıcılarının katıldığı çalışmada, problem davranışların (içselleştirme, dışsallaştırma) test öncesi ve sonrası dönemde azaldığı, maladaptif duygu düzenlemesindeki önemli azalmaların bu değişiklikleri öngördüğü belirlenmiştir. Ergenlerin terk edilme ve ebeveynlere bağlanma bağımlılığı konusunda bildirdiği kaygının önemli ölçüde arttığı saptanmıştır.

Bir diğer geliştirilen müdahalede Ford ve arkadaşlarının çalışmasıdır (2012). Tam veya kısmi Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) kriterlerini karşılayan 59 suça sürüklenen kız

(yaşları 13-17 yıl) ile bir duygu düzenleme terapisi (Travma Etki Düzenlemesi: Eğitim ve Terapi Rehberi, TARGET) ile ilişkisel destekleyici terapinin (Her Zamanki Gibi Gelişmiş Tedavi) sonuçlarını karşılaştıran randomize klinik bir çalışmadır. TARGET, 12 haftalık bireysel seans içermektedir. Her zamanki gibi geliştirilmiş tedavi prosedürüne kıyasla TARGET grubunda duygu düzenlemede çalışma sonrasında öncesine göre bir iyileşme olduğu saptanmıştır (Ford ve ark., 2012).

Houck ve arkadaşlarının çalışması (2016) ise ergenlerin duygu düzenleme becerisi kullanımını artırmak ve riskli davranışları azaltmak amacıyla tasarlanmış bir müdahalenin değerlendirilmesidir. Ruh sağlığı semptomları olan 12-14 yaş arası ergenlere (n = 420; %53 erkek) yönelik 12 oturumdan oluşan Duygu Düzenleme veya Sağlığın Geliştirilmesi Programı uygulanmıştır. Ergenlerin programın sonunda cinsel olarak aktif olma ve kavga gibi diğer riskli davranışlarda bulunma olasılıklarının daha düşük olduğu, duygu düzenleme müdahalesine katılanların duygu düzenleme stratejilerini daha fazla kullandığı ve yoksunluğa karşı daha olumlu tutumlar geliştirdikleri belirlenmiştir.

Abdullahi ve Nouri (2024)'nin çalışmasında Tahran Gençlik Islah ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki 12-18 yaş arasındaki Diyalektik Davranış Terapisi uygulanmıştır. Yarı deneysel çalışmada suçlu ergenlerde Diyalektik Davranış Terapisinin kendine zarar verme davranışlarını ve zorbalığı azalttığı, bilişsel duygu düzenlemesini arttırdığı tespit edilmiştir.

Damavandian ve arkadaşlarının (2022), Tahran Ceza İnfaz ve Rehabilitasyon Merkezi'nde suça sürüklenen çocuklarla yaptıkları

çalışmada; Şefkat Odaklı Terapi'ye dayalı 12 haftalık bir program yürütülmüştür. Çalışma sonrasında saldırganlık ve kendine zarar verme davranışlarında önemli bir şekilde azalma, duygusal öz düzenlemede (özellikle uyum ve hoşgörü) iyileşme olduğu ve etkilerin bir aylık takipte de devam ettiği belirlenmiştir (Damavandian ve ark., 2022).

Bu konuda yapılan bir diğer çalışma ise PSYCHOPATHY.COMP çalışmasıdır. Bu çalışma, Şefkat Odaklı Terapi'ye dayalı 20 seanslık bireysel bir müdahale programıdır. Şefkatli bir motivasyonun geliştirilmesi yoluyla, özellikle genç suçlularda psikopatik özellikleri ve antisosyal davranışları azaltmak için tasarlanmıştır. Portekiz Gençlik Gözaltı Merkezleri'ndeki genç suçlularda programın duygu düzenlemesini iyileştirip iyileştiremeyeceği değerlendirilmektedir. Program, kademeli bir değişim stratejisini izleyen dört ardışık modülden oluşmaktadır: (1) zihnimizin temelleri, (2) Şefkat Odaklı Terapi'ye göre zihnimiz, (3) şefkatli zihin eğitimi ve (4) iyileşme, nüksetme önleme ve sonlandırma. Çalışmada duygu düzenlemeye ilişkin sadece gençlerin bildirdikleri veriler değerlendirilmemiş gençlerin kalp atım hızındaki değişiklikler de ele alınmıştır. Çalışma sonrasında gençlerde duygu düzenleme güçlüklerinde azalma ve maladaptif duygu düzenleme stratejilerini kullanmadan iyileşmenin olduğu belirlenmiştir (Sousa ve ark., 2023).

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) yaklaşımları, davranışsal ve duygusal zorlukları ele almada ve tedavi etmede kanıta dayalı ve etkili tedaviler arasındadır. Hapis geçmişi olan erkek gençler ve hapis, şiddet, duygu düzensizliği ve travma riski taşıyan gençler bu hizmetlere erişimde önemli engellerle karşılaşmaktadır. Uluslararası

alandan tanınan bir kuruluş olan Roca, Inc. (Roca), Massachusetts ve Maryland'de şiddetin merkezindeki gençlerle çalışarak kentsel şiddet konusunda ilerleme kaydeden bir kuruluştur. Roca, müdahale modelinde travma bilgili bir BDT temelli beceri eğitimi ve yaklaşımı kullanarak gençlerin eğitim, istihdam, ebeveynlik ve yaşam becerileri fırsatlarını iyileştirmeye çalışmaktadır. Bu şekilde tekrar suç işleme riskini azaltmayı, travmayı ele almayı ve duygu düzenleme becerilerini artırmayı hedeflemektedir. Roca, 2016 yılında gençlere yönelik bilişsel davranışçı program geliştirme konusunda uzman olan Massachusetts Genel Hastanesi/Harvard Tıp Fakültesi ile ortaklık kurarak, bilişsel davranışçı müdahalelerinin oluşturulmasına rehberlik etmek için kanıta dayalı bir uygulama olarak yürütmüştür. 17-24 yaş aralığındaki yetişkin erkeklerden oluşan çalışmada, duygu düzenlemesinde iyileşme gösteren katılımcıların, duygu düzenlemesinde daha az iyileşme gösteren katılımcılara kıyasla ilişki, aile işleyişi ve öz bakım ile ilgili sıkıntılarda ve madde kullanımında azalma olduğu bulunmuştur. Ayrıca, duygu düzenlemenin farklı yönlerindeki iyileşmenin, iyileşen ilişkiler, iyileşen yaşam stresi, azalan madde kullanımı ve iyileşen sosyal düşünce ile ilişkili olduğu saptanmıştır (Dumornay ve ark., 2022).

BDT'nin kullanıldığı bir diğer çalışma ise GOAL çalışmasıdır. GOAL, ebeveyn eğitimi de içeren, 12-17 yaş arasındaki ergen kızlara yönelik 20 seanslık, 10 haftalık bir programdır. Bu çalışmada, cinsiyete duyarlı bir BDT müdahalesi kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları programın suç oranlarını ve madde kullanımını azalttığını gösterse de duygu düzenleme berilerinde etkili olmadığını göstermiştir (Walker ve ark., 2019).

Ülkemizde Ceza İnfaz Kurumlarında kalmakta olan ergenlerin öfke duygularını kontrol edebilme becerilerini artırmak, kendilerine ve çevrelerine yönelik şiddet eğilimini azaltmak amacıyla yapılan BDT odaklı bir çalışmada, ARDIÇ-Öfke Kontrol modülü kullanılmıştır. Öfke Kontrol modülü; model alma, alternatif çözüm yolları üretebilme, ABC modeli hakkında psiko-eğitim sağlama, motivasyon kazandırma, psikodrama oyunları ile eğitim verme gibi bilişsel davranışçı teknikleri benimseyen ve 10 oturumdan oluşan bir grup çalışması programıdır. Çalışma, 15-18 yaş aralığındaki 8 erkek ergenle gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonrasında ergenler, arkadaşları arasındaki iletişimin ve aileleri ile ilişkilerinin pozitif yönde değiştiğini ve iletişim becerilerinin geliştiğini ifade etmiştir. Ergenler, çalışma sonrasında öfke duygusunu daha kolay tanımlayabildiklerini ve saldırgan davranışları sergilemekten kaçındıklarını belirtmişlerdir (Çadırcıoğlu, 2023).

BDT dışında kullanılan bir diğer yöntem sanat terapisi'dir. U-Seman ve Chethiyar'ın çalışmasında (2021), 13-18 yaş arasındaki suçlu ergenler arasındaki saldırgan davranışları azaltmak için 10 haftalık bir sanat terapisi müdahale olarak kullanılmıştır. Deney grubunda kontrol grubuna göre öfkede önemli bir azalma olduğu tespit edilmiştir (U-Seman& Chethiyar, 2021).

Suçta sürüklenen çocuklarda kullanılan bir diğer müdahale yöntemi ise kum oyunu terapisi'dir. Çalışma, 15-19 yaş arasındaki on suçlu kız çocuğunda kum oyunu terapisinin duygusal netlik ve beyin dalgası indeksleri üzerindeki etkilerini değerlendirmek için yapılmıştır. Kum oyunu terapısından sonra deney grubunun duygusal netliğinin ve öz düzenlemeyle ilgili beyin dalgası indekslerinin önemli ölçüde arttığı belirlenmiştir. Çalışmanın

bulguları kum oyunu terapisinin, suçlu kız çocuklarının duygusal netliklerini geliştirerek ve beyin dalgası indekslerini değiştirerek, kişisel gelişim yoluyla gerçekliğe uyum sağlama yeteneklerini geliştirdiğini göstermektedir (Lee & Jang, 2013).

Suçla sürüklenen ergenlere yönelik geliştirilen bir diğer müdahale Gestalt teorisine dayalı danışmanlık programıdır. Gestalt teorisine dayalı danışmanlık uygulamasının ortaokul öğrencilerinde suç işleme davranışı üzerine etkisinin değerlendirildiği yarı deneysel çalışmada, müdahale grubundaki öğrencilerde, suç işleme davranışlarında önemli bir azalma, duygusal düzenleme, çatışma çözme becerileri ve öz farkındalıkta artma olduğu belirlenmiştir (Tanjung & Koto, 2023).

Tas ve Arabacının yaptığı çalışmada (2020) da bir psikoeğitim programının suçla sürüklenen çocuklar üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Çalışma, bir psikiyatri hastanesinin çocuk ergen psikiyatrisi kliniklerinde tedavi gören, 12-15 yaş arasındaki suçla sürüklenen ergenlerle yürütülmüştür. Çalışma sonrasında psikoeğitim programının, ergenlerin sosyal duygusal öğrenme beceri puanlarını arttırdığı ancak duyguları yönetme becerilerinde önemli bir değişiklik olmadığı bulunmuştur (Tas& Baysan Arabacı, 2020).

Suçlu çocuklarda kullanılan bir diğer müdahale yöntemi ise genç suçluların ahlaki gelişimine odaklanan müdahalelerdir. Gençlik suçluluğunun ahlaki gelişimde gecikmelerle ilişkilendirildiği ve bu kapsamda ahlaki yargı, empati ve öz farkındalık (suçluluk ve utanç) gibi alanlarda gecikmeler olduğu gösterilmektedir (Heynen ve ark., 2020). O'Neill yaptığı çalışmada, kızların ergenlik döneminde erkeklere göre daha yüksek düzeyde empati gösterdiği ve bu

farklılıkların ergenlik öncesi dönemde ortaya çıktığı bildirilmektedir. Empati, suçla ters orantılıdır, dolandırıcılık ve hırsızlığın habercisidir, ancak şiddet içeren suçları öngörmemektedir. Empatinin suç üzerindeki etkisine kısmen aracılık ettiği ve bu nedenle cinsiyet farkının, empatik ifadeyi yöneten cinsiyet normlarına bağlılıkla açıklanabileceği savunulmaktadır (2020). Empati müdahaleleri, duygu düzenleme becerilerine önemli katkılar sağlamak ve antisosyal davranışı ve suç oranlarını potansiyel olarak azaltmaktadır (Hein ve ark., 2018; Trivedi-Bateman ve Crook, 2020). Ahlaki yargıyı hedefleyen müdahalelerin ahlaki yargı üzerinde anlamlı ve orta büyüklükte bir etki gösterdiği ancak suçluluk tekrarı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı bulunmuştur. (Heynen ve ark., 2023).

Son olarak, çocuk suçluluğunda mindfulness temelli müdahaleler ele alınmıştır. Farkındalık (Mindfulness) müdahalesinin, duyuları, duyguları ve düşünceleri içeren zihinsel süreçleri teşvik ettiği ve inhibisyon kontrolü ile yakından ilişkili beyin devrelerini etkilediği belirtilmektedir. Mindfulness eğitime katılan genç suçluların inhibisyon kontrolünün iyileştiği ve dolayısıyla şiddetli davranışları azaltmada olumlu bir etkisi olduğu saptanmıştır (Ron-Grajales ve ark., 2021). Tao ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada ise mindfulness temelli bir müdahalenin agresifliği azaltmada orta düzeyde, klinik örneklerde daha yüksek düzeyde bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır (2021).

KAYNAKLAR

Abdullahi, R., & Nouri, T. (2024). Dialectical behavior therapy: impact on self-harming behaviors, bullying, and cognitive emotion regulation in delinquent teenagers. *Journal of Adolescent and Youth Psychological Studies*, 5(5),14-20.

Abhishek, R., & Balamurugan, J. (2024). Impact of social factors responsible for Juvenile delinquency–A literature review. *Journal of Education and Health Promotion*, 13(1), 102.

Akbulut, C. A. (2018). Depresyonun duygu düzenleme süreçlerinin. *Klinik Psikiyatri*, 21,184-192.

Akçalı, N. (2020). *Çocuk gelişimi birimine getirilen adli vakalardaki ergenlerin umutsuzluk ve duygu düzenleme durumlarının incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi)*. İnönü Üniversitesi Saplık Bilimleri Enstitüsü.

Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. *Clinical Psychology Review*, 30(2), 217-237.

Armour, C. (2012). Mental Health in prison: a trauma perspective on importation and deprivation. *International Journal of Criminology and Sociological Theory*, 5(2), 886-894.

Azpiazu Izaguirre, L., Fernández, A. R., & Palacios, E. G. (2021). Adolescent life satisfaction explained by social support, emotion regulation, and resilience. *Frontiers in Psychology*, 12, 694183.

Bagheri, M., Moazami, S., Nejad, A. A., & Mansouri, S. M. (2022). Examining social and psychological factors that affect

juvenile delinquency. *Journal of Positive School Psychology*, 6(7), 292-300.

Baglivio, M. T., Wolff, K. T., DeLisi, M., Vaughn, M. G., & Piquero, A. R. (2016). Effortful control, negative emotionality, and juvenile recidivism: An empirical test of DeLisi and Vaughn's temperament-based theory of antisocial behavior. *The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology*, 27(3), 376-403.

Barnett, A. P., Houck, C. D., Barker, D., & Rizzo, C. J. (2022). Sexual minority status, bullying exposure, emotion regulation difficulties, and delinquency among court-involved adolescent girls. *Journal of Youth and Adolescence*, 51(3), 471-485. <https://doi.org/10.1007/s10964-021-01542-9>

Bedel, A. Ulubey, E. (2015). Ergenlerde Başa çıkma stratejilerini açıklamada bilişsel esnekliğin rolü, *Elektronik Sosyal BilimlerDergisi*, 14(55), 291-300

Beaudry, G., Yu, R., Långström, N., & Fazel, S. (2021). An updated systematic review and meta-regression analysis: Mental disorders among adolescents in juvenile detention and correctional facilities. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 60(1), 46-60.

Beşer Gördeles, N., Baysan Arabacı, L., & Uzunoğlu, G. (2016). Türkiye'de bir bölge psikiyatri hastanesinde tedavi olan suçla itilmiş çocuk profilleri. *Anadolu Psikiyatri Dergisi*, 17(4), 317-324.

Bohus, M., Linehan, M., & Neacsiu, A. (2015). Dialectical behavior therapy skills: an intervention for emotion dysregulation. *Handbook of Emotion Regulation*, 2, 491-507.

Boldt, L. J., Goffin, K. C., & Kochanska, G. (2020). The significance of early parent-child attachment for emerging regulation: A longitudinal investigation of processes and mechanisms from toddler age to preadolescence. *Developmental Psychology*, 56(3), 431.

Braet, C., Theuwis, L., Van Durme, K., Vandewalle, J., Vandevivere, E., Wante, L., ... & Goossens, L. (2014). Emotion regulation in children with emotional problems. *Cognitive Therapy and Research*, 38, 493-504.

Brazão, N., Rijo, D., Salvador, M. D. C., & Pinto-Gouveia, J. (2018). Promoting emotion and behavior regulation in male prison inmates: A secondary data analysis from a randomized controlled trial testing the efficacy of the growing pro-social program. *Law and Human Behavior*, 42(1), 57.

Breaux, R. P., McQuade, J. D., Harvey, E. A., & Zakarian, R. J. (2018). Longitudinal associations of parental emotion socialization and children's emotion regulation: The moderating role of ADHD symptomatology. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 46, 671-683.

Brinke, L. W., Menting, A. T., Schuiringa, H. D., Zeman, J., & Deković, M. (2021). The structure of emotion regulation strategies in adolescence: Differential links to internalizing and externalizing problems. *Social Development*, 30(2), 536-553.

Burrows, S., & Kieselbach, B. (2024). Adolescent health indicators: violence measures are critical to include. *Journal of Adolescent Health*, 74(6), S29-S30.

Bülbül, S., & Doğan, S. (2016). Suça sürüklenen çocukların durumu ve çözüm önerileri. *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi*, s. 59: 31-6.

Cekaite, A., & Ekström, A. (2019). Emotion socialization in teacher-child interaction: Teachers' responses to children's negative emotions. *Frontiers in Psychology*, 10, 452248.

Cai, J., Li, J., Liu, D., Gao, S., Zhao, Y., Zhang, J., & Liu, Q. (2023). Long-term effects of childhood trauma subtypes on adult brain function. *Brain and Behavior*, 13(5), e2981.

Compas, B. E., Jaser, S. S., Bettis, A. H., Watson, K. H., Gruhn, M. A., Dunbar, J. P., ... & Thigpen, J. C. (2017). Coping, emotion regulation, and psychopathology in childhood and adolescence: A meta-analysis and narrative review. *Psychological Bulletin*, 143(9), 939.

Cooley, J., & Fite, P. (2016). Peer victimization and forms of aggression during middle childhood: the role of emotion regulation. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 44, 535-546.

Cracco, E., Van Durme, K., & Braet, C. (2015). Validation of the FEEL-KJ: an instrument to measure emotion regulation strategies in children and adolescents. *PloS one*, 10(9), e0137080.

Cracco, E., Goossens, L., & Braet, C. (2017). Emotion regulation across childhood and adolescence: evidence for a maladaptive shift in adolescence. *European Child & Adolescent Psychiatry*. 26, 909-921.

Crowell J. A. (2021). Development of Emotion Regulation in Typically Developing Children. *Child and Adolescent Psychiatric*

Clinics of North America. 30(3), 467–474.
<https://doi.org/10.1016/j.chc.2021.04.001>

Cui, L., Criss, M. M., Ratliff, E., Wu, Z., Houlberg, B. J., Silk, J. S., & Morris, A. S. (2020). Longitudinal links between maternal and peer emotion socialization and adolescent girls' socioemotional adjustment. *Developmental Psychology*, 56(3), 595.

Çadırcıoğlu, D. Ç. (2023). Suça sürüklenen çocuklarla bilişsel davranışçı öfke kontrolü: bir grup çalışması. *Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi*, s. 6(11), 7-18.

Çoban, S. (2015). Türkiye'de risk altındaki çocuklar ve çocuk suçluluğu üzerine bir değerlendirme. *Sosyoloji Konferansları*, 52(2), 791-810.

Çocuk Koruma Kanunu. (2005, Temmuz 15). *Çocuk Koruma Kanunu*. Ankara: Resmi Gazete.

Damavandian, A., Golshani, F., Saffarinia, M., & Baghdasarians, A. (2022). Effectiveness of compassion-focused therapy on aggression, self-harm behaviors, and emotional self-regulation in delinquent adolescents. *Monthly Journal of Psychological Science*, s. 21(112), 797-817.

Danisworo, D. L., & Wangid, M. N. (2022). The influence of family harmony and emotional regulation ability on juvenile delinquency. *European Journal of Education Studies*, 9(6).

Defoe, I. N., Rap, S. E., & Romer, D. (2022). Adolescents' own views on their risk behaviors, and the potential effects of being labeled as risk-takers: A commentary and review. *Frontiers in Psychology*, 13, 945775. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.945775>

De France, K., Lennarz, H., Kindt, K., & Hollenstein, T. (2019). Emotion regulation during adolescence: Antecedent or outcome of depressive symptomology?. *International Journal of Behavioral Development*, 43(2), 107-117.

Delcea, C., Muller-Fabian, A., Radu, C.-C., & Perju-Dumbrava, D. (2019). Juvenile delinquency within the forensic context. *Romanian Journal of Legal Medicine*, 27(4), 366-372.

DeLisi M., Vaughn M. G. (2014). Foundation for a temperament-based theory of antisocial behavior and criminal justice system involvement. *Journal of Criminal Justice*, 42(1), 10–25. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2013.11.001>

Desatnik, A., Bel-Bahar, T., Nolte, T., Crowley, M., Fonagy, P., & Fearon, P. (2017). Emotion regulation in adolescents: An ERP study. *Biological Psychology*, s. 129, 52-61.

Dixon-Gordon, K. L., Aldao, A., & De Los Reyes, A. (2015). Emotion regulation in context: Examining the spontaneous use of strategies across emotional intensity and type of emotion. *Personality and Individual Differences*, 86, 271-276.

Docherty, M., Lieman, A., & Gordon, B. L. (2022). Improvement in emotion regulation while detained predicts lower juvenile recidivism. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 20(2), 164-183.

Dumornay, N. M., Finegold, K. E., Chablani, A., Elkins, L., Krouch, S., Baldwin, M., Youn, S. J., Marques, L., Ressler, K. J., & Moreland-Capuia, A. (2022). Improved emotion regulation following a trauma-informed CBT-based intervention associates

with reduced risk for recidivism in justice-involved emerging adults. *Frontiers in Psychiatry*, 13, 951429. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.951429>

English T., Eldesouky L. (2020). We're not alone: Understanding the social consequences of intrinsic emotion regulation. *Emotion*, 20(1), 43–47.

Eryalçın, M., & Duyan, V. (2021). Suça sürüklenen çocuk ve gençler (Vol. 120). Yeni İnsan Yayınevi.

Evans, S. Z., Simons, L. G., & Simons, R. L. (2016). Factors that influence trajectories of delinquency throughout adolescence. *Journal of Youth and Adolescence*, 45, 156-171.

Eyüboğlu, M., & Eyüboğlu, D. (2018). Suça sürüklenen çocuklarda psikiyatrik bozukluklar, sosyodemografik özellikler ve risk faktörleri. *Klinik Psikiyatri*, 21, 7-14.

Falk, D., Thompson, S. J., & Sanford, J. (2014). Posttraumatic stress among youths in juvenile detention. *Journal of Evidence-Based Social Work*, 11(4), 383–391. <https://doi.org/10.1080/10911359.2014.897111>

Farb, N., Irving, J., Anderson, A., & Segal, Z. (2014). Mindfulness interventions and emotion regulation. J. J. Gross içinde, *Handbook of Emotion Regulation* (s. 2, 548-567). The Guilford Press.

Fındıklı, E., Altun, H., Sınır, H., & Şahin, N. (2016). Suça sürüklenen çocukların suç türleri, sosyodemografik ve klinik özellikleri. *Adli Tıp Dergisi*, 30(2), 12-16.

Fisk G. M., Friesen J. P. (2012). Perceptions of leader emotion regulation and LMX as predictors of followers' job satisfaction and organizational citizenship behaviors. *The Leadership Quarterly*, 23(1), 1–12.

Fombouchet, Y., Pineau, S., Perchee, C., Lucenet, J., & Lannegrand, L. (2023). The development of emotion regulation in adolescence: What do we know and where to go next?. *Social Development*, 32(4), 1227-1242.

Ford, J. D., Steinberg, K. L., Hawke, J., Levine, J., & Zhang, W. (2012). Randomized trial comparison of emotion regulation and relational psychotherapies for PTSD with girls involved in delinquency. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 41(1), 27-37.

Ford, J. D., & Blaustein, M. E. (2013). Systemic self-regulation: A framework for trauma-informed services in residential juvenile justice programs. *Journal of Family Violence*, 28, 665-677.

Ford, JD (2023). Çocuklar için gelişimsel olarak uygun bir travma tanısına neden ihtiyacımız var: Gelişimsel travma bozukluğuna ilişkin 10 yıllık bir güncelleme. *Çocuk ve Ergen Travması Dergisi* , 16 (2), 403-418.

Gamsız Tunç, Ö., & Dursun, A. (2021). Genç yetişkinlere yönelik duygu düzenleme müdahaleleri:sistematik gözden geçirme. *İhlara Eğitim Araştırmaları Dergisi*, s. 6(2), 191-212.

Garofalo, C., Neumann, C. S., & Velotti, P. (2018). Difficulties in emotion regulation and psychopathic traits in violent offenders. *Journal of Criminal Justice*, 57, 116-125.

Garritsen, K., Janković, M., Masthoff, E., Caluwé, E., & Bogaerts, S. (2024). The Role of dynamic risk and protective factors in predicting violent recidivism: intellectual ability as a possible moderator?. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 68(2-3), 207–234. <https://doi.org/10.1177/0306624X221079695>

Gratz, K., Weis, N., & Tull, M. (2015). Examining emotion regulation as an outcome, mechanism, or target of psychological treatments. *Current Opinion in Psychology*, 3, 85-90.

Gross J. J. (2014). Emotion regulation: Conceptual and empirical foundations. In Gross J. J. (Ed.), *Handbook of emotion regulation* (2nd ed., pp. 3-20). New York, NY: Guilford Press.

Gross, J. J. (2015a). Emotion regulation: Current status and future prospects. *Psychological Inquiry*, 26(1), 1-26.

Gross, J. J. (2015b). The extended process model of emotion regulation: Elaborations, applications, and future directions. *Psychological Inquiry*, 26(1), 130-137.

Guarnaccia, C., De Vita, E., Sortino, L., & Giannone, F. (2022). Links between adverse childhood experiences, psychopathological symptoms and recidivism risk in juvenile delinquents. *European Journal of Criminology*, 19(5), 1040-1059.

Gunzenhauser, C., Fäsche, A., Friedlmeier, W., & von Suchodoletz, A. (2014). Face it or hide it: Parental socialization of reappraisal and response suppression. *Frontiers in Psychology*, 4, 72529.

Güçlü, S. (2016). Çocukluk ve çocukluğun sosyolojisi bağlamında çocuk hakları. *Sosyoloji Dergisi*, s. 1-22.

Güler, G. (2017). Suça sürüklenen çocukların biyopsikososyal değerlendirilmesi. *Türkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics*, s. 3(3), 220-224.

Güngör, N. (2019). *Suça sürüklenen çocuk/ergenlerde duygu düzenleme ile iletişim biçimleri arasındaki ilişki ve etkileyen faktörler (Yüksek Lisans Tezi)*. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Tanjung, H., & Koto, B. Y. (2023). Effectiveness of Gestalt Theory-Based Counseling in Reducing Delinquency Among Junior High School Students. *Acta Psychologia*, 2(2), 40-48.

Hay C., Widdowson A., Young B. C. (2018). Self-control stability and change for incarcerated juvenile offenders. *Journal of Criminal Justice*, 56, 50–59.
<https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2017.08.008>

Heide, K. M., Solomon, E. P., Sellers, B. G., & Chan, H. C. (2011). Male and female juvenile homicide offenders: An empirical analysis of US arrests by offender age. *Feminist Criminology*, 6(1), 3-31.

Hein, S., Roder, M., & Fingerle, M. (2018). The role of emotion regulation in situational empathy-related responding and prosocial behaviour in the presence of negative affect. *International Journal of Psychology*, 53(6), 477–485.

Helland, S., Mellblom, A., Kjobli, J., Wentzel-Larsen, T., Espenes, K., Engell, T., & Kirkoen, B. (2022). Elements in mental

health interventions associated with effects on emotion regulation in adolescents: a meta-analysis. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, s. 49,1004-1018.

Hendekçi, A. (2019). Sosyodemografik açıdan farklı özellikteki adolesanların duygu düzenleme durumlarının belirlenmesi. *Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi*, s. 22(4), 259-266.

Herd, T., King-Casas, B., & Kim-Spoon, J. (2020). Developmental Changes in Emotion Regulation during Adolescence: Associations with Socioeconomic Risk and Family Emotional Context. *Journal of Youth and Adolescence*, 49(7), 1545–1557.

Herd, T., & Kim-Spoon, J. (2021). A Systematic Review of Associations Between Adverse Peer Experiences and Emotion Regulation in Adolescence. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 24(1), 141–163.

Hesselink, A. (2023). Adverse childhood experiences (ACEs) and the link to antisocial, delinquent, and criminal behaviors. In *Criminal Behavior-The Underlyings, and Contemporary Applications*. IntechOpen.

Heynen, E., Hoogsteder, L., Van Vugt, E., Schalkwijk, F., Stams, G. J., & Assink, M. (2023). Effectiveness of moral developmental interventions for youth engaged in delinquent behavior: a meta-analysis. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 0306624X231172648.

Hodgdon, H. B. (2009). Child maltreatment and aggression: the mediating role of moral disengagement, emotion regulation, and emotional callousness among juvenile offenders. Temple University.

Hodgkinson, R., Beattie, S., Roberts, R., & Hardy, L. (2021). Psychological resilience interventions to reduce recidivism in young people: A systematic review. *Adolescent Research Review*, 6(4), 333-357.

Hoffmann J. D., Brackett M. A., Bailey C. S., Willner C. J. (2020). Teaching emotion regulation in schools: Translating research into practice with the RULER approach to social and emotional learning. *Emotion*, 20(1), 105–109.

Houck, C., Hadley, W., Barker, D., Brown, L., Hancock, E., & Almy, B. (2016). An emotion regulation intervention to reduce risk behaviors among at-risk early adolescents. *Prevention Science*, s. 17(1), 71-82.

Huffman, L. G., Oshri, A., & Caughy, M. (2020). An autonomic nervous system context of harsh parenting and youth aggression versus delinquency. *Biological Psychology*, 156, 107966. <https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2020.107966>

İmrek, Y., Öztürk, Y., Balta, B., Taşkan, M., Göl, G., & Tufan, A. (2023). Emotion regulation, theory of mind, and attachment to parents and peers among Turkish adolescent offenders and victims: a single-center, cross-sectional, case–control study. *Psychiatry and Clinical Psychopharmacology*, s. 33(4).

Jafari, E., Ghazanfarian, F., Aliakbari, M., & Kamarzarin, H. (2017). The effectiveness of coping skills' Training on emotional regulation in delinquent adolescents. *Psychological Achievements*, 24(1), 97-110.

Kahveci, S. Ö. (2022). Duygu düzenlemede farkındalık temelli stres azaltma programının kullanımı. E. Akbaş içinde, *Sağlık & Bilim 2022 Hemşirelik 3* (s. 99). İstanbul: Efe Akademi Yayınları.

Keels, M. (2024). Responding to the Trauma That Is Endemic to the Criminal Legal System: Many Opportunities for Juvenile Prevention, Intervention, and Rehabilitation. *Annual Review of Criminology*, 7(1), 329-355

Keiley, M. K. (2002a). Attachment and affect regulation: A framework for family treatment of conduct disorder. *Family Process*, 41(3), 477-493.

Keiley, M. K. (2002b). The development and implementation of an affect regulation and attachment intervention for incarcerated adolescents and their parents. *The Family Journal*, 10(2), 177-189.

Keiley, M. K. (2007). Multiple-family group intervention for incarcerated adolescents and their families: A pilot project. *Journal of Marital and Family Therapy*, 33(1), 106-124

Keiley, M. K., Zaremba-Morgan, A., Datubo-Brown, C., Pyle, R., & Cox, M. (2015). Multiple-family group intervention for incarcerated male adolescents who sexually offend and their families: Change in maladaptive emotion regulation predicts adaptive change in adolescent behaviors. *Journal of Marital and Family Therapy*, 41(3), 324-339.

Kemp, K., Thamotharan, S., Poindexter, B., Barker, D., Tolou-Shams, M., & Houck, C. D. (2017). Emotion regulation as a predictor of juvenile arrest. *Criminal Justice and Behavior*, 44(7), 912–926. <https://doi.org/10.1177/0093854817695842>

Kerig, P. K., Bennett, D. C., Thompson, M., & Becker, S. P. (2012). “Nothing really matters”: Emotional numbing as a link between trauma exposure and callousness in delinquent youth. *Journal of Traumatic Stress*, 25(3), 272-279.

Kerig, P. K., Ford, J. D., Alexander, A. R., & Modrowski, C. A. (2024). Interventions for trauma-affected youth in the juvenile justice system: An overview of diagnostic, ethical, and clinical challenges and evidence-based treatments. *Psychological Injury and Law*, 1-22.

Kerr, K. L., Ratliff, E. L., Cosgrove, K. T., Bodurka, J., Morris, A. S., & Kyle Simmons, W. (2019). Parental influences on neural mechanisms underlying emotion regulation. *Trends in Neuroscience and Education*, 16, 100118.

Klepfisz, G., Daffern, M., & Day, A. (2018). Understanding dynamic risk factors for violence. In *Dynamic Risk Factors* (pp. 123-136). Routledge.

Larsen, J. K., Vermulst, A. A., Geenen, R., van Middendorp, H., English, T., Gross, J. J., ... & Engels, R. C. (2013). Emotion regulation in adolescence: A prospective study of expressive suppression and depressive symptoms. *The Journal of Early Adolescence*, 33(2), 184-200.

Larsen, B., & Luna, B. (2018). Adolescence as a neurobiological critical period for the development of higher-order cognition. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 94, 179-195.

Leban, L., & Delacruz, D. J. (2023). Adverse childhood experiences and delinquency: Does age of assessment matter?. *Journal of Criminal Justice*, 86, 102033.

Lee, S. M., & Jang, M. (2013). Effects of sandplay therapy on the emotional clarity and brain indexes related to self-regulation of female delinquent juveniles. *Journal of Symbols & Sandplay Therapy*, 4(1), 1-8.

Lim, L., Hart, H., Howells, H., Mehta, M. A., Simmons, A., Mirza, K., & Rubia, K. (2019). Altered white matter connectivity in young people exposed to childhood abuse: a tract-based spatial statistics (TBSS) and tractography study. *Journal of Psychiatry & Neuroscience*, 44(4), E11–E20.

Lin, S. C., Pozzi, E., Kehoe, C. E., Havighurst, S., Schwartz, O. S., Yap, M. B. H., Zhao, J., Telzer, E. H., & Whittle, S. (2024). Family and parenting factors are associated with emotion regulation neural function in early adolescent girls with elevated internalizing symptoms. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 10.1007/s00787-024-02481-z.

Lyu, S. Y., Chi, Y. C., Farabee, D., Tsai, L. T., Lee, M. B., Lo, F. E., & Morisky, D. E. (2015). Psychological distress in an incarcerated juvenile population. *Journal of the Formosan Medical Association = Taiwan yi zhi*, 114(11), 1076–1081. <https://doi.org/10.1016/j.jfma.2014.03.011>

Malvaso, C. G., Cale, J., Whitten, T., Day, A., Singh, S., Hackett, L., ... & Ross, S. (2022). Associations between adverse childhood experiences and trauma among young people who offend: A systematic literature review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 23(5), 1677-1694.

Mann, R. E., Hanson, R. K., & Thornton, D. (2010). Assessing risk for sexual recidivism: Some proposals on the nature of psychologically meaningful risk factors. *Sexual Abuse*, 22(2), 191-217.

McKenna, N. C., & Anderson, V. R. (2024). Pathways to—But Not Through? Revisiting the Trauma and Recidivism Relationship Among System-Involved Youth. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 15412040241232896.

McRae, K., & Gross, J. J. (2020). Emotion regulation. *Emotion* (Washington, D.C.), 20(1), 1–9. <https://doi.org/10.1037/emo0000703>

Miller-Slough, R. L., & Dunsmore, J. C. (2016). Parent and friend emotion socialization in adolescence: Associations with psychological adjustment. *Adolescent Research Review*, 1, 287-305.

Morris, A. S., Criss, M. M., Silk, J. S., & Houlberg, B. J. (2017a). The impact of parenting on emotion regulation during childhood and adolescence. *Child Development Perspectives*, 11(4), 233-238.

Morris, A. S., Houlberg, B. J., Criss, M. M., & Bosler, C. D. (2017b). Family context and psychopathology: The mediating role

of children's emotion regulation. *The Wiley Handbook of Developmental Psychopathology*, 365-389.

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Health and Medicine Division; Division of Behavioral and Social Sciences and Education; Board on Children, Youth, and Families; Committee on Applying Lessons of Optimal Adolescent Health to Improve Behavioral Outcomes for Youth, Kahn, N. F., & Graham, R. (Eds.). (2019). *Promoting Positive Adolescent Health Behaviors and Outcomes: Thriving in the 21st Century*. National Academies Press (US).

Nemeroff, C. B. (2016). Paradise lost: The neurobiological and clinical consequences of child abuse and neglect. *Neuron*, 89(5), 892–909.

Nisar, M., Ullah, S., Ali, M., & Alam, S. (2015). Juvenile delinquency: The Influence of family, peer and economic factors on juvenile delinquents. *Applied Science Reports*, 9(1), 37-48.

Nyquist, A. C., & Luebke, A. M. (2022). Parents' Beliefs, Depressive Symptoms, and Emotion Regulation Uniquely Relate to Parental Responses to Adolescent Positive Affect. *Family Process*, 61(1), 407–421. <https://doi.org/10.1111/famp.12657>

O’Neill, K. K. (2020). Adolescence, Empathy, and the Gender Gap in Delinquency. *Feminist Criminology*, 15(4), 410-437. <https://doi.org/10.1177/1557085120908332>

Palmer, C., Oosterhoff, B., Bower, J., Kaplow, J., & Alfano, C. (2018). Associations among adolescent sleep problems, emotion

regulation, and affective disorders: Findings from a nationally representative sample. *Journal of Psychiatric Research*, s. 96, 1-8.

Parade, S. H., Huffhines, L., Daniels, T. E., Stroud, L. R., Nugent, N. R., & Tyrka, A. R. (2021). A systematic review of childhood maltreatment and DNA methylation: candidate gene and epigenome-wide approaches. *Translational Psychiatry*, 11(1), 134.

Perry, N. B., Dollar, J. M., Calkins, S. D., Keane, S. P., & Shanahan, L. (2020). Maternal socialization of child emotion and adolescent adjustment: Indirect effects through emotion regulation. *Developmental Psychology*, 56(3), 541.

Piquero, A. R., Jennings, W. G., & Farrington, D. P. (2010). On the malleability of self-control: Theoretical and policy implications regarding a general theory of crime. *Justice Quarterly*, 27(6), 803-834.

Pires, A. R., & Almeida, T. C. (2023). Risk factors of poly-victimization and the impact on delinquency in youth: A systematic review. *Crime & Delinquency*, 00111287221148656.

Poon, K. (2020). Evaluating dual-process theory of decision-making in Chinese delinquent adolescents. *Australian Psychologist*, 55(3), 257-268.

Protic, S., Wittmann, L., Taubner, S., & Dimitrijevic, A. (2020). Differences in attachment dimensions and reflective functioning between traumatized juvenile offenders and maltreated non-delinquent adolescents from care services. *Child Abuse & Neglect*, 103, 104420.

Quoidbach, J., Mikolajczak, M., & J. Gross, J. (2015). Positive interventions: an emotion regulation. *Psychological Bulletin*, s. 1-40.

Reilly, E. B., & Gunnar, M. R. (2019). Neglect, HPA axis reactivity, and development. *International Journal of Developmental Neuroscience: The Official Journal of The International Society for Developmental Neuroscience*, 78, 100–108.

Rezaei, S., PourHadi, S., & Shabahang, R. (2019). Relationship of Perceived Parenting Styles with Self-Control Capacity and Affective Self-Regulation Among Delinquent Adolescents. *Caspian Journal of Neurological Sciences*, 5(2), 56-65.

Rodriguez, C., Tucker, M., & Palmer, K. (2016). Emotion regulation in relation to emerging adults' mental health and delinquency: a multi-informant approach. *Journal of Child and Family Studies*, s. 25, 1916-1925.

Rogosch, K. S. J. C. D. FA (2013). A longitudinal study of emotion regulation, emotion lability-negativity, and internalizing symptomatology in maltreated and nonmaltreated children. *Child Development*, 84, 512-527.

Ron-Grajales, A., Sanz-Martin, A., Castañeda-Torres, R. D., Esparza-López, M., Ramos-Loyo, J., & Inozemtseva, O. (2021). Effect of mindfulness training on inhibitory control in young offenders. *Mindfulness*. 12(7), 1822-1838.

Rothenberg, W., Di Guinta, L., Lansford, J., Lunetti, C., Fiaconaro, I., Basili, E., . . . Cirimele, F. (2019). Daily associations between emotions and aggressive and depressive symptoms in adolescence: The mediating and moderating role of emotion

dysregulation. *Journal of Youth and Adolescence*, s. 48(11), 2207-2221.

Saccaro, L., Giff, A., De Rossi, M., & Piguet, C. (2024). Interventions targeting emotion regulation: A systematic umbrella review. *Journal of Psychiatric Research*, s. 174, 263-274.

Sağlam, M., & Aral, N. (2017). Yargılama süreci devam eden suça sürüklenen çocuklara yönelik hazırlanan destek eğitim programının çocukların duygu ve düşüncelerine etkisinin incelenmesi. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, s. 10(50), 572-588.

Sahi, R. S., Eisenberger, N. I., & Silvers, J. A. (2023). Peer facilitation of emotion regulation in adolescence. *Developmental Cognitive Neuroscience*, 101262.

Salekin, R. T. (2015). Forensic evaluation and treatment of juveniles: Innovation and best practice. *American Psychological Association*. <https://doi.org/10.1037/14595-000>

Sanchis-Sanchis, A., Grau, M. D., Moliner, A. R., & Morales-Murillo, C. P. (2020). Effects of age and gender in emotion regulation of children and adolescents. *Frontiers in Psychology*, 11, 497592.

Sarıtaş Atalar, D., & Altan Atalay, A. (2018). Ergenlik Döneminde Duygu Düzenleme ve Ruh Sağlığı: Ana-Babanın ve Mizacın Rolü. B. T. içinde, *Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar* (s. 84-90). Ankara: Türkiye Klinikleri.

Schalkwijk, F., Stams, G. J., Stegge, H., Dekker, J., & Peen, J. (2016). The Conscience as a Regulatory Function: Empathy, Shame,

Pride, Guilt, and Moral Orientation in Delinquent Adolescents. *International Journal of offender Therapy And Comparative Criminology*, 60(6), 675–693. <https://doi.org/10.1177/0306624X14561830>

Schweizer, S., Gotlib, I. H., & Blakemore, S. J. (2020). The role of affective control in emotion regulation during adolescence. *Emotion* (Washington, D.C.), 20(1), 80–86. <https://doi.org/10.1037/emo0000695>

Schäfer, J. Ö., Naumann, E., Holmes, E. A., Tuschen-Caffier, B., & Samson, A. C. (2017). Emotion regulation strategies in depressive and anxiety symptoms in youth: A meta-analytic review. *Journal of Youth And Adolescence*, 46, 261-276.

Schuster, I., Larran, J., Zhai, J., Ye, L., Lu, J., Liu, Y., & Hein, S. (2024). Trajectories of positive and negative affect and state hope and their relationship with mental health among male adolescents in a juvenile correctional institution in China. *Current Psychology*, 1-14.

Sevecke, K., Franke, S., Kosson, D., & Krischer, M. (2016). Emotional dysregulation and trauma predicting psychopathy dimensions in female and male juvenile offenders. *Child and Adolescent Psychiatry And Mental Health*, 10, 1-13.

Siegel L.J. *Criminology*. 8th ed. Canada: Thomson Wadsworth; 2003

Silvers J. A. (2022). Adolescence as a pivotal period for emotion regulation development. *Current Opinion In Psychology*, 44, 258–263. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2021.09.023>

Skaar, N. R. (2024). Confirmation of a Reconceptualized Definition and Measure of Adolescent Risk Behavior: Adolescent Viewpoints. *Journal of Adolescent Research*, 39(3), 746-769. <https://doi.org/10.1177/07435584211064566>

Sousa, R., Ribeiro da Silva, D., Petrocchi, N., Gilbert, P., & Rijo, D. (2023). At the heart of change: Differences in young offenders' HRV patterns after the delivery of the PSYCHOPATHY. COMP program. *Frontiers in Psychiatry*, 13, 1032011.

Springstein, T., & English, T. (2024). Distinguishing emotion regulation success in daily life from maladaptive regulation and dysregulation. *Personality And Social Psychology Review*, 28(2), 209-224.

Steinberg, L. (2010). A dual systems model of adolescent risk-taking. *Developmental Psychobiology: The Journal of the International Society for Developmental Psychobiology*, 52(3), 216-224.

Tas, G., & Baysan Arabacı, L. (2020). Suça sürüklenmiş ergenlere verilen psikoeğitimin sosyal duygusal öğrenme ve duygu yönetimi becerilerine etkisi. *Klinik Psikiyatri Dergisi*, s. 23, 476-485.

Tangney J. P., Dobbins A. E., Stuewig J. B., Schrader S. W. (2017). Is there a dark side to mindfulness? Relation of mindfulness to criminogenic cognitions. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 43(1), 1415–1426

Tao, S., Li, J., Zhang, M., Zheng, P., Lau, E. Y. H., Sun, J., & Zhu, Y. (2021). The effects of mindfulness-based interventions on

child and adolescent aggression: A systematic review and meta-analysis. *Mindfulness*, 12, 1301-1315.

Thompson, S. F., Zalewski, M., Kiff, C. J., Moran, L., Cortes, R., & Lengua, L. J. (2020). An empirical test of the model of socialization of emotion: Maternal and child contributors to preschoolers' emotion knowledge and adjustment. *Developmental Psychology*, 56(3), 418.

Tinajero, R., Williams, P. G., Cribbet, M. R., Rau, H. K., Silver, M. A., Bride, D. L., & Suchy, Y. (2020). Reported history of childhood trauma and stress-related vulnerability: Associations with emotion regulation, executive functioning, daily hassles and pre-sleep arousal. *Stress and Health: Journal of the International Society for the Investigation of Stress*, 36(4), 405–418.

Topçuoğlu, S. (2023). Ergenlerde duygu regülasyonu. *İnteraktif Bilim: Disiplinlerarası Araştırma ve İncelemeler Dergisi*, s. 2, 10-49.

Trentham, C. E., Hensley, C., & Policastro, C. (2018). Recurrent childhood animal cruelty and its link to recurrent adult interpersonal violence. *International Journal of Offender Therapy And Comparative Criminology*, 62(8), 2345-2356.

Trinidad, A., Vozmediano, L., & San-Juan, C. (2020). Environmental factors in juvenile delinquency: A systematic review of the situational perspectives' literature. *Reviewing Crime Psychology*, 240-266.

Trivedi-Bateman, N., & Crook, E. L. (2022). The optimal application of empathy interventions to reduce antisocial

behaviour and crime: a review of the literature. *Psychology, Crime & Law*, 28(8), 796-819.

Türk Ceza Kanunu. (2004, 10 12). *Türk Ceza Kanunu*. Ankara: Resmi Gazete.

Türkiye İstatistik Kurumu. (2024). *Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri*. TÜİK: <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Güvenlik-Birimine-Gelen-veya-Getirilen-Cocuk-Istatistikleri-2023-53674>

U-Seman, N.A.B.C., & Chethiyar, S.D.M. (2021). Effectiveness of Intervention Based Art Therapy (AT) Module on Aggressive Behaviour Among Delinquent Adolescents . *South Asian Journal of Social Sciences and Humanities*, 2(6), 60–71. <https://doi.org/10.48165/sajssh.2021.2605>

Vazsonyi A. T., Mikuška J., Kelley E. L. (2017). It's time: A meta-analysis on the self-control-deviance link. *Journal of Criminal Justice*, 48, 48–63. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2016.10.001>

Walker, S. C., Duong, M., Hayes, C., Berliner, L., Leve, L. D., Atkins, D. C., Herting, J. R., Bishop, A. S., & Valencia, E. (2019). A tailored cognitive behavioral program for juvenile justice-referred females at risk of substance use and delinquency: A pilot quasi-experimental trial. *PloS one*, 14(11), e0224363. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224363>

Weytens, F., Luminet, O., Verhoshadt, L., & Mikolajczak, M. (2014). An Integrative Theory-Driven Positive Emotion Regulation Intervention. *PLoS One*, s. 9(4): e95677.

Weiss, N. H., Thomas, E. D., Schick, M. R., Reyes, M. E., & Contractor, A. A. (2022). Racial and ethnic differences in emotion regulation: A systematic review. *Journal Of Clinical Psychology*, 78(5), 785-808.

Winiarski, D. A., Schechter, J. C., Brennan, P. A., Foster, S. L., Cunningham, P. B., & Whitmore, E. A. (2017). Adolescent physiological and behavioral patterns of emotion dysregulation predict multisystemic therapy response. *Journal of Emotional And Behavioral Disorders*, 25(3), 131-142.

Wolff, K. T., & Baglivio, M. T. (2017). Adverse childhood experiences, negative emotionality, and pathways to juvenile recidivism. *Crime & Delinquency*, 63(12), 1495-1521.

You, S., & Lim, S. A. (2015). Development pathways from abusive parenting to delinquency: The mediating role of depression and aggression. *Child Abuse & Neglect*, 46, 152-162.

Zamani, S. D., Taremian, F., & Motamed, N. (2018). Relationship of personality factors, emotion regulation, antisocial cognition, mental health and life fields on juvenile delinquency behaviors. *Journal of Advances in Medical and Biomedical Research*, 26(115), 92-106.

Zastrow, C. (2010). *Sosyal Hizmet Giriş*. Ankara: Nika Yayınevi.

Zelechowski, A. D., Bohner, J., & Perry, B. D. (2024). Beyond recidivism: reconceptualizing success through relational health for trauma-exposed youth experiencing juvenile justice involvement. *Frontiers in Psychology*, 15, 1263451.

Zhang, X., Gatzke-Kopp, L. M., Fosco, G. M., & Bierman, K. L. (2020). Parental support of self-regulation among children at risk for externalizing symptoms: Developmental trajectories of physiological regulation and behavioral adjustment. *Developmental Psychology*, 56(3), 528.

BÖLÜM II

Yenidoğan'da Non-invazif Mekanik Ventilasyon Desteęi ve Hemşirelik Bakımı

**Sultan GÜNER BAŞARA
Bircan KAHRAMAN BERBEROĞLU**

Giriş

Mekanik Ventilasyon

Solunum sıkıntısı yenidoğan döneminin önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir (Ekhaguere & ark., 2022; Harshini & ark., 2020) aynı zamanda term ve preterm bebeklerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine (YYBÜ) sık yatış nedenleri arasında yer alır. Yenidoğanda siyanoz, burun kanadı solunumu, hırıltı, solukluk, apne, raller ve/veya ronküs ile beraber solunum seslerinde azalma, dakikada 60'dan fazla olan solunum hızı, inleme, interkostal çekilme ve retraksiyon solunum işlevinin yetersiz olduğunu gösteren belirti ve bulgulardır (Rijal & Shrestha, 2018; Özkeçeci & Karagöl, 2021). Ayrıca solunum sıkıntısı bulguları ile birlikte kan gazında pH< 7.20-

7.25, $\text{PaCO}_2 > 60 \text{ mmHg}$, $\text{PaO}_2 < 50-60 \text{ mmHg}$ ve pulsoksimetre ve monitörde $\text{SpO}_2 < \%80$ değerleri gelişmektedir. Özellikle pretermelerde merkezi sinir sistemi ve solunum sistemi tam gelişmemiş olması nedeniyle solunum kontrolü ve akciğer işlevlerinde daha büyük sorunlar ortaya çıkar. Yüzey gerilimini azaltıcı etkisi ile alveoler kollapsı önleyerek gaz alışverişini sağlayan, surfaktan eksikliğine bağlı komplians azdır, alveoller gerektiği şekilde açık tutulamaz ve fonksiyonel rezidüel kapasite düşüktür. Fetal akciğer sıvısının emilimindeki güçlükler, solunum kaslarındaki güçsüzlük ve hava yollarının kapanmaya eğilimli olması solunumun preterm bebek tarafından yapılmasını zorlaştırmaktadır (Humberg & ark., 2020; Dassios, Vervenioti & Dimitriou, 2022; Ramaswamy, Abiramalatha & Roehr, 2022; Özkeçeci & Karagöl, 2021).

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde mekanik ventilasyon (MV) desteği sık uygulanan tedavi yöntemlerinden olup solunum fonksiyonu yetersiz veya hiç olmayan bebeklerde solunumu desteklemek, alveolar oksijenizasyonu ve biriken karbondioksit atılımını sağlamak için kullanılan önemli bir tedavi yöntemidir (Sangsari & ark., 2022). Mekanik ventilasyonda hedef, kabul edilebilir bir oksijen yüzdesinde ($\text{F}_1\text{O}_2 < 0.60$) kabul edilebilir bir oksijenasyondur. Mekanik ventilasyonun etkin bir şekilde uygulanmaya başlanması ile solunum yetersizliğine bağlı ölüm oranı belirgin olarak azalmıştır (Carvalho & ark., 2018). Yenidoğanın MV desteği farklı yöntemlerle uygulanabilmektedir. Bu yöntemlerden biri olan hacim kontrollü ventilasyonda gerekli basınçtan bağımsız olarak her solunumda bebeğe belirli bir tidal volüm uygulanmaktadır. Diğer bir yöntem olan basınç kontrollü

ventilasyonda ise önceden belirlenmiş basınca ulaşana kadar gereken gaz hacmi hastaya verilmektedir. Yüksek hızlı ventilasyonlarda belirlenen hacim temel olarak çok yüksek solunum hızlarıyla (180-900/dakika) sağlanmaktadır. Yenidoğan ventilasyonunda önceki yıllarda basınç kontrollü ve zaman döngülü ventilatörler tercih edilirken, günümüzde hacim garantili ve yüksek frekanslı ventilatörler de kullanılmaktadır. Hacim kontrollü modlar gerekli basınçtan bağımsız bir tidal volüm oluşturmaktadır, bu nedenle, akciğerler daha az uyumlu olduğunda, ventilatör ayarlanan hacmi elde etmek için daha yüksek tepe basıncı sağlamaktadır (Greenough & ark., 2016; Gupta & Janakiraman, 2018; Grazioli, Karam & Rimensberger, 2015). Günümüzde mekanik ventilasyon İnvazif mekanik ventilasyon (İMV) ve non-invazif mekanik ventilasyon (NİMV) şeklinde uygulanmaktadır. Yenidoğanlarda invazif mekanik ventilasyon, ciddi akciğer yaralanmalarına yol açabilir. Uzun süreli veya aşırı basınçla yapılan ventilasyon, akciğerlerde barotravma (yüksek basınç sonucu zarar), volümetrik travma (aşırı hava miktarının akciğerlere verilmesi) ve oksijen toksisitesine yol açabilmektedir. Prematüre bebeklerde antioksidan sistemler geç geliştiği için akciğer hasarlanması daha fazla olmaktadır. Aşırı hipoksi akciğer iltihabına, yaygın alveoler yaralanmalara, ilerleyici pulmoner hasara ve ölüme neden olabilir. Bu durumlar, solunum distresine neden olan temel sorunları kötüleştirebilir ve akciğerlerin iyileşmesini engelleyebilir. Bu nedenle, son yıllarda akciğer koruma stratejileri yoğun bir şekilde incelendiğinde özellikle entübasyon ve mekanik ventilasyon uygulamalarının morbidite ve mortaliteyi etkileyecek komplikasyonların ortaya çıkmasına neden olması günümüzde

NİMV desteğinin daha sık tercih edilmesini sağlamaktadır (van Kaam & ark., 2021; Williams & Greenough, 2021; Carvalho & ark., 2018).

Tablo 1: Yenidoğanda Solunum Güçlüğü Nedenleri

Solunum Sistemi İle İlgili Nedenler	Solunum Sistemi Dışı Nedenler
Üst Solunum Yolları İle ilgili 1. Koanal Atrezi 2. Konjenital Stridor 3. Laringotrakeomalazi	Metabolik 1. Hipoglisemi 2. Hipotermi 3. Metabolik Asidoz
Akciğerler ile ilgili 1. Respiratuvar Distres Sendromu (RDS) 2. Hava Kaçağı sendromu 3. Yenidoğanın Geçici Takipnesi 4. Mekonyum Aspirasyonu Sendromu 5. Persistant Pulmoner Hipertansiyon 6. Pulmoner Kanama 7. Pnömoni 8. Pulmoner Agenezi 9. Akciğer Kistleri 10. Atelaktazi	Kardiyak 1. Doğumsal Kalp Hastalıkları 2. Kalp Yetmezliği
	Serebral 1. Kanama 2. Ödem 3. İlaç etkisi
	Hematolojik 1. Akut Kan Kaybı 2. İkizden İkize Transfüzyon 3. Polisitemi
	Diğer Trakea-özefajial Fistül Diafragma Hernisi

Kırımı, E. (2007). *Solunum güçlüğü olan yenidoğana yaklaşım*, *Aktüel Tıp Dergisi*, 19(11):87-98.

Noninvazif Mekanik Ventilasyon

Nazal noninvazif mekanik ventilasyon (NİMV), solunum yetersizliği nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde (YYBÜ) yatan prematüre bebeklerin solunumunu entübe etmeden desteklemede kullanılan ve günümüzde invazif mekanik ventilasyondan fazla tercih edilen önemli bir tedavi yöntemidir (Mahmoud & ark., 2022; Fu & ark., 2024). Spontan solunumu olan bebeklerde nazal NİMV üst hava yolu direncinin düşmesi ve obstüriktif apnenin azaltılması, akciğer hacminin korunması, oksijenasyonun artırılması ve akciğer solunum işinin azaltılmasında önemli solunum desteği sağlar (Shi & ark., 2020). Spontan solunumunun olması durumunda yenidoğanın burnu deliklerine yerleştirilen kanül veya burun ve ağızda içine alabilen maske aracılığı ile ısıtılmış ve nemlendirilmiş hava belli bir basınç altında verilmektedir (Imbulana & ark., 2018; Razak ve Patel, 2020). Günümüzde nazal NİMV ve özellikle devamlı hava yolu basıncı (CPAP) uygulaması, solunum problemi olan prematüre bebeklerin tedavisinde öncelikli uygulanan yöntemdir (Herting, Hartel ve Gopel, 2020). Non-invazif mekanik ventilasyon; nazal CPAP, yüksek akışlı nazal kanül, nazal iki taraflı pozitif hava basıncı, invazif olmayan aralıklı pozitif basınçlı ventilasyon, senkronize invazif olmayan nazal aralıklı pozitif basınçlı ventilasyon, invazif olmayan yüksek flow ventilasyon olarak uygulanabilmektedir (Mahmoud ve ark., 2020).

Konvensiyonel mekanik ventilasyon ile karşılaştırıldığında nazal NİMV barotravma, mortalite, morbidite ve bronkopulmoner displazi (BPD) insidansını önemli derecede azaltmaktadır (Alessi, 2018; Bashir & ark., 2019). Fakat preterm yenidoğanlarda erken

dönemde nazal NİMV uygulanması; pnömotoraks, abdominal distansiyon, pulmoner kan akımı direnci ve kardiyak out-putta düşme, nazal travma ve nazal yaralanma gibi komplikasyonlara neden olabilmektedir (Boel & ark., 2017; Shehadeh, 2020; Nasef, Rashed & Aly, 2020). Nazal NİMV sırasında preterm bebeklerde bir araştırmada %20-60 oranında yüz ve %68 oranında burunda basınç yaralanması meydana geldiğini belirtmektedir (Dai & ark., 2020). Diğer bir araştırmada ise preterm bebeklerde nazal NİMV uygulanmasına bağlı burunda basınç yaralanma insidansı %20-100 arasında değiştiği yönündedir (Imbulana & ark., 2018). Burun yaralanması septal nekrozdan septal düşmeye kadar gidebilmektedir. Düşük doğum ağırlıklı bebeklerde nazal yaralanmalar sıklıkla ilk 48-72. saatte ve çoğunlukla septumda gelişmektedir (Ota, Davidson & Guinsburg, 2013; Solanki & Bhil, 2019). Yenidoğanın gestasyon yaşının <32 hafta, doğum kilosunun <1500 gr ve tedavi süresinin beş günden fazla olması cilt yaralanmalarında artışa neden olmaktadır (Khan & ark., 2017; Haymes, 2020).

İnvazif olmayan mekanik ventilasyonun başarısında hemşirelik bakımı oldukça önemlidir (Özkeçeci & Karagöl, 2021; Haymes, 2020). Mekanik ventilasyon uygulanan bebeklerin hemşirelik bakımında amaç, mekanik ventilasyon desteği almaya bağlı enfeksiyon, uzun süre mekanik ventilasyon uygulaması sonucu BPD, subglotik darlık, nörogelişimsel problemler ve doku hasarı gibi komplikasyonları önlemektir (Joseph, 2015; El-Garhy & ark., 2020). Hemşirelik bakımında doku hasarı oluşmadan koruyucu önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır (Sarı ve Atalay, 2016). Nazal NİMV esnasında cilt yaralanmalarını azaltacak ve engelleyecek hemşirelik bakım stratejilerini destekleyecek kanıt ve hemşirelik

bakımına ilişkin standart uygulama oldukça sınırlıdır (Başara, Çalışır & Türkmen, 2024).

Bebeklerde kullanılan Non-invazif mekanik ventilasyon modları;

1. Nasal Continuous Positive Airways Pressure (NCPAP)
 - a. Sabit akışlı NCPAP: Bubble CPAP, ventilatör kaynaklı NCPAP
 - b. Değişken akımlı NCPAP
2. Bi-level Positive Airway Pressure (BiPAP)
3. Nasal Aralıklı Positive Pressure Ventilasyon (NIPPV)
4. Nasal Yüksek Frekanslı Ventilasyon (NHFV)
5. Yüksek Isı Nemlendirme Akımlı Nazal Kanül (Heated Humidified High Flow Nasal Cannula-HHFN) Terapi
6. Düşük Akımlı Nazal Kanül (Low Flow Nasal Cannula - LFNC) Terapi (Boel ve ark, 2017).

İkili ve Kısa Burun Kanülü ile CPAP Uygulaması: Günümüzde yenidoğanlarda en sık kullanılan CPAP uygulama yöntemidir. Kullanılan malzemenin farklı biçimlerde tasarlanmış şekilleri olsa da hepsinin ortak özelliği 1-2 cm'lik iki kısa ve yumuşak kanülünün olmasıdır. İkili kısa burun kanülünde, tekli burun kanülüne göre direnç daha azdır. Her iki burun deliğinden de basınç verilmesi nedeniyle ikili kısa burun kanülü ile uygulanan CPAP'in daha etkili olduğu bildirilmektedir. En çok görülen sorun bu araçların tıkanması ve kıvrılmasıdır. Bebekler ağızlarını açtığında ve ağladıklarında basınç kaybına yol açarlar.

Nazal Kanül ile CPAP yöntemi: Pratik ve ucuz bir sistem olarak dikkati çekmektedir. Özel hazırlanmış ürün: Ram kanül veya Nazal oksijen kanülleri kısaltılarak tasarlanmıştır.

Tekli ve Kısa Burun Kanülü ile CPAP Uygulaması: Kısaltılmış trakeal tüpün tek bir burun deliğinden 1-2 cm içeriye itilmesi ile uygulanır. Burun deliğinin dışında kalan tüp uzunluğu da 3 cm kadardır. Uygulaması oldukça kolaydır ancak verilen basınçlı hava diğer burun deliğinden kaçabilir. İkili ve kısa burun kanülüne göre direnç daha fazladır.

Uzun Nazofaringeal Kanül ile CPAP Uygulaması: Trakeal tüpün kısaltılarak tek bir burun deliğinden geçirilip farikse yerleştirilmesi ile uygulanır. Yüksek direnç ve basınçtaki azalma nedeniyle ikili ve kısa burun kanülüne göre etkisi daha azdır. Tüpün burun içerisine sokulması gereken kısım daha uzundur. Kullanılan tüp ne kadar uzun ise hava yolu direnci de o kadar artar.

Burun Maskesi ile CPAP Uygulaması: Etkinliği konusunda yeterli veri yoktur. Burun deliklerinde daha az travma yaptığı düşünülmektedir. Yerleştirmek oldukça güçtür ve daha fazla basınç uygulamak gerekir. İnvazif olmayan araçlar olmalarına rağmen sadece düşük basınçlarda uygulanabilirler ve 1500 gr altındaki bebeklerde uygulanamazlar



Şekil 1. Uzun Nazofarenjial Kanül

<https://turkish.alibaba.com/g/neonate-endotracheal-tube.html>



Şekil 2. Nazal Maske

www.medicalexpo.com



Şekil 3. Nazal Kanül

www.greatgroup.com

Non-invazif Mekanik Ventilasyon Uygulanan Yenidoğan Bebeğin Hemşirelik Bakımı

Noninvaziv mekanik ventilasyon solunum patolojisinin yönetiminde hayati destek sağlamaktadır. Bu, invaziv ventilasyona alternatif bir tekniktir ve bronkopulmoner displazi gibi diğer komplikasyonların oluşumunu azaltmayı hedeflemektedir. Prenatal steroidlerin, pulmoner sürfaktanın ve CPAP'ın uygulanması, son birkaç yılda yenidoğan ölümlerinin azalmasında önemli katkı sağlamaktadır. Hemşirelik bakımı, invazif olmayan ventilasyonda başarının temel dayanağıdır. Bu nedenle, bunun nasıl


gerçekleştirileceğini, temel özelliklerini, uygun bakımı, ayrıca ortaya çıkabilecek en sık görülen komplikasyonları ve teknik sorunları bilmek önemlidir (Mostafa, El-Khedr & Ibrahiem, 2024; Li & ark., 2021). Mekanik ventilasyon uygulanan bir bebeğe bakan hemşireler birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Uzmanlaşmış bakım, güvenli ve etkili bakım sağlamada önemli bir husustur ve bakımın ana yönleri ile, termoregülasyon, hava yolu açıklığı, stabil hemodinamik durum, büyüme ve gelişimin sürdürülmesi için yeterli beslenmeyi içerir bunun yanında mekanik ventilasyon desteği almaya bağlı enfeksiyon, uzun süre mekanik ventilasyona bağlı kalma sonucu kronik akciğer hastalığı, subglotik darlık, nörogelişimsel problemler gibi komplikasyonlardaki başedilmesi gerekmektedir (Joseph, 2015; Flanagan, 2016; Rocha & ark., 2018). Nazal NİMV desteği alan yenidoğanın devamlı olarak, oksijen satürasyonu, solunum sayısı, kalp tepe atımı, oksijen konsantrasyonu (PI_{O_2}), her saat solunum yükü dahil bütün vital bulguların takibinin yanı sıra, uygulanan basınç, gaz akışı, verilen havanın nemlendirilmesi ve ısıtılması, nemlendiricideki su seviyesi, pronglarının doğru yerleşimi, devre ve pronglarda birikmiş yoğunlaşma kontrol edilmeli ve fazla su boşaltılmalı, septal columellar bütünlüğü, orogastrik tüp yerleşimi ve abdominal distansiyon izlenmelidir (Rocha & ark., 2018; Queensland Clinical Guideline, 2021).

Cilt Sıcaklığının Korunması (Termoregülasyon)

Yenidoğan bebeklerin vücut ağırlığına oranla daha büyük yüzey alanı olduğundan hipotermi kolay gelişir (Oranges & ark., 2015). Özellikle prematüre bebeklerde deri ve subkutan fascia ısının merkezden yüzeye akışına karşı yetersiz bariyer oluşturur ve doğum

ağırlığı 1000 gr altındaki bebeklerde evaporsiyon ile ısı kaybı erişkinlerdekenden 8-10 kat fazladır (Demissie & ark., 2018). Neonatal hipotermi mortalite ve morbidite riskini arttıran küresel bir sorundur. Normal sağlıklı bir bebekte vücut ısısı 36.5°C-37,5°C arasındadır (Wilson & ark., 2016; Ramaswamy & ark., 2022). Isı stabilitesindeki azalmanın, hipoksiye bağlı ölüm ve hipotansiyon gibi uzun vadeli fizyolojik etkiler neden olabilir (Demissie & ark., 2018). Dünya Sağlık Örgütü yenidoğanlar için vücut ısını 36- 36,4 °C ye kadar hafif hipotermi, 32-35.9° C 'ye kadar orta hipotermi, 32°C' den düşük olanları ağır hipotermi olarak sınıflandırmaktadır (Soares & ark., 2019). Yenidoğanda ısı kaybına neden olan dört mekanizma vardır; evaporasyon (buharlaşma), radyasyon, konveksiyon (taşınma), kondüksiyon (iletim). Hipotermi gelişen bebekte oksijen tüketimine bağlı solunum sıkıntısı gelişmektedir, yenidoğanın doğumdan sonra doğum oda ısısı term yenidoğanlar için minimum 25°C, prematüreler için 26-28°C ve devamlı kalınacak oda sıcaklığının 25-26°C olması gerekmektedir (Carns & ark., 2018, El-Atawi & ark., 2018). Kuvözler bebeğin ısının regülasyonu ve ısı kaybının önlenmesi için önemli aletlerdir. Genellikle çift duvarlı kuvözler kullanılarak radyan ısı kaybı engellenir, bebekte kullanılan servokontrollü deri problemleri deri ısını 36,5°C de tutmak için kuvöz iç çevre ısını ayarlar ve bu durum bebekte en az oksijen tüketimine neden olur. Prematüre bebeklerde sıcaklık ile birlikte kuvöz içi nemde sağlanmalıdır (%70-%90) ve birinci haftadan sonra düşürülmelidir (%50 dek adım adım), özellikle 27. GH dan küçük bebeklerde kuvöz içi nem oranı %80 olmalıdır (Rashid & ark., 2023; Vilinski & Sheridan, 2014). Carns ve arkadaşları (2018) nazal CPAP alan yenidoğanlarda hipotermisinin

etkilerini retrospektif olarak inceledikleri çalışmada CPAP tedavisi sırasında bebeklerin %50 den fazlasında hipotermi gelişmiştir ve taburcu olmak için sağ kalımın üç değişkene; ortalama sıcaklık, tedavi şekli ve ortalama solunum hızına dayandığı belirtilmektedir.



Şekil 4. Yenidoğanda ısı kaybına neden olan dört mekanizma

Carns, J., Kawaza, K., Quinn, M. K., Miao, Y., Guerra, R., Molyneux, E., ... & Richards-Kortum, R. (2018). Impact of hypothermia on implementation of CPAP for neonatal respiratory distress syndrome in a low-resource setting. *PLoS One*, 13(3), e0194144.

Hava Yollarının Güvenliği

Noninvaziv mekanik ventilasyon sırasında nazal kanüllerin yerinden çıkması bebekte akut hipoksi, bradikardi ve hava yollarında travma gibi komplikasyonlara yol açar. Nazal kanüllerin yerinden çıkmasının sık görülen nedenleri arasında bebeğin ajite olması, mekanik ventilasyon süresinin uzaması, tüp tespitlerinin tükrük veya sekresyonlarla ıslanıp yapışkanlığını yitirmesi gibi nedenler sayılabilir. Bu durumun önlenmesi için düzenli takip oldukça önemlidir (Atasay, Akın & Alan, 2016). Bebeğe verilen hava ısıtılıp nemlendirilmezse hava yollarında nekroz, hipotermi ve silier

aktivitede azalma görülür (Alanazi & ark., 2023). Bebeğe verilecek hava ve oksijen karışımı mutlak nemlendirilmelidir aksi takdirde sekresyonlar kuruyarak solunum yollarını tıkar. Supraglotik alanın atlanmasından dolayı özellikle ETT ve trakeostomi yoluyla desteklenen bebeklerde, verilen gazın, 33 mgH₂O / L'den yüksek mutlak bir nemde verilmesi tavsiye edilir. Yapılan çalışmalarda silier aktivitenin, nispi nem oranı %70'in altına düştüğünde azaldığı, verilen havanın vücut sıcaklığına yakın ısıda ve nem oranı da %75'in üzerinde olduğunda normal silier aktivite sağlanabildiği, sıcaklığın 32-34°C arasında olması gerektiği bilinmektedir (Doctor & ark., 2017).

Aspirasyon

Swett ve arkadaşları (2017), gestasyon haftası 29-30, postnatal 3. günde olan ve n CPAP tedavisi alan 16 yenidoğanın aspirasyonu sırasında kalp tepe atımı ve solunum hızlarının değişmediği ve satürasyon değerlerinin her işlem sonrasında düştüğünü tespit etmişlerdir. Nazal aspirasyon rutin bakımın bir parçası olmamalıdır, fakat dikkatli takip ile ağız içi aspirasyonu gerekli ise nazikçe aspire edilmelidir. Oksijen gereksiniminde artma, solunumun artması, apne, solunum sıkıntısı ve hipoaktifleşme, sekresyonların artmasında bebeğin aspirasyon ihtiyacına dikkatli bir şekilde karar verilmesi gereken durumlardır, aspirasyondan birkaç dakika sonra bebeğin genel durumu iyiye gitmiyor ise tıbbi değerlendirmenin yapılması gerekmektedir (Khan ve ark, 2017; Fedor, 2017; Clinical guideline, 2019; Kenner & ark., 2022). Oral aspirasyon daha sık gerekebilir, nazal aspirasyon aspirasyon gerekiyor ise sekresyonu nazik bir şekilde aspire edilmelidir. Nazal kanül temizlenmeli ve her vardiya başında nazal kanüllerin bir kez açıklığı kontrol edilmeli.

Aspiratör basıncı 100 mmHg ayarlanmalı ve aspiratör kateteri bebeğin kilosuna göre seçilmeli (Garzotto & ark., 2019; Queensland Clinical Guideline, 2021).



Şekil 5. Nazal maske NİMV

<https://www.imgrumweb.com/hashtag/nCPAP>

Pozisyon

Noninvaziv ventilasyon tedavisi alan bebekler için pozisyonlama, yalnızca solunum cihazlarının en uygun şekilde yerleştirilmesini değil, aynı zamanda bu cihazları aylarca kullanması gerekebilecek bebeklerde şekil bozukluklarının önlenmesini içinde son derece önemlidir. Günümüzde geliştirilen nazal kanüller noninvaziv ventilasyonun etkinliğini sağlarken aynı zamanda bebeğin gelişimsel olarak uygun pozisyonda tutulmasına olanak sağlamaktadır. Ancak, bebeğin haftalar veya aylar boyunca noninvaziv ventilasyonda kalması gerektiği durumlarda, yaş ve klinik duruma bağlı olarak güvenli pozisyonlama için çeşitli

seeneklere ihtiya duyulabilir. Ayrıca, kafatası ekillenmesi veya burun delikleri zerindeki basın baėlı olarak ara sıra cihaz deėişiklikleri yapılması ve bebeėin bymesiyle birlikte nazal kanl boyutlarının zaman zaman deėiştirilmesi gerekebilir. zellikle bařta meydana gelen ekil deėişikliğinin uzun sre aynı pozisyon nedeniyle oluřtuėu bildirilmektedir. Nazal NİMV uygulamasında prematre bebeklerin prone pozisyonunda daha iyi uyudukları ve nazal prongların yerinde tutabildiėi ifade edilmektedir. Aynı zamanda prone pozisyonunda bebeklerde oksijenlenmenin daha iyi olduėu, daha az stres belirtisi yařadıkları ve daha derin uyudukları bildirilmektedir (Flanagan, 2016). Prematre bebeklerin prone pozisyonunda kardiyorespiratuvar sorunların giderilmesinde etkili olduėunu ispatlamıřtır ve apnenin daha az grldė bilinmektedir (Hassan, Mohamed & Mohamed, 2020). Bebeėin boynunda ařırı ekstansiyon veya fleksiyon olmamasına dikkat edilmelidir. zellikle prematre bebeklerin pozisyon ynetimi eřitlendirilmiř olmalıdır. Hemřireler, tek bir pozisyonunda ısrar etmek yerine, bebeklerin benzersiz fizyolojik kořullarına gre pozisyonu ayarlamalıdır. Bu, sekelleri azaltmaya ve uzun sreli hastanede yatıř sırasında iyileřme ve bymelerini desteklemeye yardımcı olacaktır (Yang & Zhang, 2023).

Beslenme

Nazal NİMV veya İMV tedavisi enteral beslenmeye engel teřkil etmez ve ok dřk doėum aėırlıklı bebeklerde ve prematre bebeklerde gastrozefajial refl riskini arttırmamaktadır (Kumar & ark, 2017). NİMV uygulaması sırasında mide diletasyonu grlebilir. Ařırı abdominal distansiyon, orogastrik tp gastrik dekompresyonla giderilir, ancak bu komplikasyon oėu zaman

enteral beslenmenin azaltılması hatta kesilmesine ve bebeğin sayısız karın grafisi çektilmesine neden olabilir Mide sekresyonları ve beslenmenin aspirasyon riskini önlemek için takılan orogastirik sondanın açık drenaja alınması gerekmektedir ve CPAP daki bebeklerin önemli bir kısmı, orogastrik beslenmeyi iyi tolere etmektedir ((Barnes, Herbert & Bonilha, 2023). CPAP'daki bebeğin oral beslenmesi çoğu yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yaygın haldedir ancak bu uygulamanın yenidoğanın yutma mekanizması üzerine etkisi araştırılmamıştır. Yutma ve nefes alma arasında çok yakın bir ilişki vardır ve bebekler CPAP alma esnasında ağızdan beslenmeye başlamanın güvenliği ile ilgili tartışmalar vardır ve beslenme esnasında trakeal aspirasyon riski önemli ölçüde artmaktadır (Ferrara ve ark, 2017). Aspirasyon riskini azaltmak için özellikle beslenme, verilen havanın taşınması gibi durumların yakından izlenmesi gerekmektedir, beslenme esnasında yatağın başının yükseltilmesi, yenidoğanın konumlandırılması ve verilen besinin yavaş verilmesi önemlidir (Fedor, 2017).

Ağrı

Günümüzde bebeklerde ağrıyı azaltmak için kullanılan farmakolojik olmayan yöntemler farmakolojik yöntemlere göre daha ucuz, kolay uygulanabilir, güvenlidirler ve bu yöntemler farmakolojik uygulamalar ile kombine edilerek de kullanılabilirler (Thirunavukarasu et al., 2022). Yenidoğan ve bebeklerde sıklıkla kanguru bakımı, kundaklama, besleyici olmayan emme, koku (anne, anne sütü, aromatik kokular), sukroz, glukoz ve anne sütü, müzik terapi, masaj, beyaz gürültü ve akupunktur olmak üzere çeşitli farmakolojik olmayan yöntemler kullanılır (Hatfield et al., 2019; Corrigan et al., 2020; Shah et al., 2023). Ağrı normal bir fizyolojik

tepkidir. Ancak yenidoğanların sözel ifadelerinin olmaması nedeniyle ağrıyı değerlendirmek zordur. Ağrının giderilmesinde ilk basamak ağrının değerlendirilmesidir. Yenidoğanlarda ağrıyı değerlendirmek için çeşitli ağrı ölçekleri kullanılmaktadır.; Prematüre Bebek Ağrı Profili (PIPP), Yenidoğan Bebek Ağrı Ölçeği (NIPS) ve CRIES ölçeği en yaygın kullanılan ölçeklerdir (Özçevik & Ocakçı, 2019).


Günümüze kadar yapılan araştırmalarda yenidoğanların ağrıyı davranışsal ve fizyolojik yollarla gösterdikleri belirlenmiştir. (Akcın ve Polat, 2017). Nazal NİMV özellikle burun yaralanmasına neden olarak şiddetli ağrıya neden olabilir, bu durum NİMV'nin etkinliğini zayıflatabilir. Ayrıca, bu bebeklerin konforu ve ağrı yönetiminin optimize edilmesi zorunludur; bu, yalnızca solunum desteğinin etkinliği ve toleransını artırmakla kalmaz, aynı zamanda ilerleyen nörogelişimsel sonuçlarını korumaya da yardımcı olur. Ağrıyı azaltmak ve konforu iyileştirmek için kullanılan farmakolojik olmayan stratejiler açısından NIMV sırasında kullanılan cihazlar ve kanüllerin konfor ve ağrı üzerindeki etkisine odaklanılmalıdır (Tauzin & Durrmeyer, 2019). Göktürk ve Sarılioğlu (2024) araştırmalarında CPAP uygulanan bebeklerde beyaz gürültü dinletmenin ağrı ve stres üzerinde olumlu etki yarattığını bildirmektedir. Başka bir araştırmada ayak masajının CPAP uygulanan bebeğin ağrı puanlarını düşürdüğü yönündedir (Masoumi & ark., 2023). Ayrıca bireyselleştirilmiş gelişimsel bakım verilmesi, vanilya aroması koklatılması ve girişimler sırasında anne-baba tarafından elle kundaklama uygulanması da etkin diğer yöntemler arasında bulunmaktadır (Türk Neonatoloji Derneği, 2021).

Cilt Bakımı

Yenidoğan cildinin hassas, kırılgan ve incedir ve özel bakıma ihtiyacı vardır. Cildin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için korunması, transepidermal su kaybı oluşumunun engellenmesi gerekir. Özellikle prematüre bebeklerin cildinin immatür olması, küvöz içi nem ve sıcaklık, pozisyon değişiminin sayısı, basınç yaralanmalarının gelişmesini etkilemektedir (Rahma & Lane, 2022; Kelly-O'Flynn, Mohamud & Copson, 2020). Nazal NİMV'de nazal kanüllerin nazal septum üzerine aşırı basınç oluşturmaları nedeniyle, burunda kanama, septal ciltte kalıcı hiperemi, epidermal ülser ve plastik cerrahinin müdahale etmesini gerektiren nekrotik ülser, travma gelişmektedir ve septum en fazla yaralanan bölgedir; uygun bakım yapılamazsa kalıcı deformiteler de oluşabilmektedir (Chen & ark., 2017).

Literatürde nazal NİMV uygulanmasında prematüre yenidoğanların burnunda meydana gelen basınç yaralanmalarının önlenmesine yönelik kanıta dayalı çalışmalar incelendiğinde, koruyucu örtü, arayüz olarak maske ve kanül kullanımı, maske ve kanül arasında rotasyon yapılan uygulamaların karşılaştırıldığı görülmektedir (Bonfim & ark., 2014; Newnam & ark., 2015; Chandrasekaran & ark., 2017; Kumar & ark., 2017; Bashir & ark., 2019). Maske aracılığı ile nazal NİMV uygulanan yenidoğanların septum ve filtrumda, kanül aracılığı ile uygulanan yenidoğanlarda ise nasal septum ve burun iç duvarlarda travma gözlemlenebilir (Ilhan & Bor, 2020)). Maske kullanımının kanül kullanımına göre burun yaralanma oranı ciddi derecede düşürebilmektedir (Chandrasekaran & ark., 2017; Bashir & ark., 2019; Kumar & ark., 2017). Kanül ve maskenin dönüşümlü kullanıldığı NİMV

uygulamalarda ise çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda daha az burun yaralanması meydana gelmektedir ve yenidoğanın doğum kilosu arttıkça yaralanma riski azalmaktadır (Magalhães & ark, 2022; Haymes, 2020). Yenidoğan için gerekli olan hava basıncının sağlanmasında kanül ve maskenin dönüşümlü kullanımı gerekmektedir. Ayrıca kullanılan kanül ve maske tipi (tek kullanımlık olması vb.) nazal yaralanma için bir risk faktörü değildir (Fong, 2024). Nazal NİMV uygulanmasında bebeğin kilosuna uygun hidrokolloid örtü kullanılan uygulamalarda nazal yaralanmanın daha az geliştiği ve yaralanmaların hafif ve orta dereceli olarak nazal septum ve burun deliklerinde olduğu bilinmektedir (Nguyen, 2021; Imbulana & ark., 2018).



Şekil 6. Nazal NİMV burun yaralanmaları

<https://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/piper/neonatal-cpap-learning-package.pdf>

Nazal NİMV esnasında cilt yaralanmalarını azaltacak ve engelleyecek hemşirelik bakımını destekleyecek bakıma yönelik kanıt dayalı uygulamalar sınırlıdır (Pascual & ark., 2022). Hemşirelik bakımında amaç, yenidoğanın hastaneye kabul edilişinden itibaren risk değerlendirilmesi ve doku hasarı oluşmadan koruyucu önlemlerin alınmasıdır (Sarı ve Atalay, 2016). Nazal NİMV uygulanmasına bağlı yenidoğanda gelişen burun

yaralanmalarını önleyici müdahaleler dört noktaya dayanmaktadır: (1) risk değerlendirmesi, (2)cilt bakımı, (3)beslenme ve (4) basınç yönetimi (Ergün & Aktaş, 2024). Pediatrikte basınç ülseri riskini değerlendirmek için kullanılan değerlendirme araçlarından yenidoğan hastalar için uygun olan az sayıda ölçüm aracı vardır (August ve diğerleri, 2013). Yenidoğan Cilt Durum Değerlendirmesi (Neonatal Skin Condition Score), Yenidoğanın Basınç Yaralanma Riski ve Değerlendirme Aracı (Neonatal Infant Pressure Injury Risk and Assessment Tool), Yenidoğan Cilt Riski Değerlendirme Ölçeği (Neonatal Skin Risk Assessment Scale) ve Neonatal Q Basınç Ülseri Riski Değerlendirme Ölçeği (Neonatal Braden Q Scale) günümüzde kullanılan ölçeklerdir (Baltacı & ark., 2020; Molina & ark., 2017; Lund, 2004).

Yenidoğanın cilt değerlendirilmeli (3-6 saatte bir), cilt temizliğinin sadece ılık su, pamuk kompresleri veya yumuşak bir malzeme ile yapılmalıdır (Molina & ark., 2017; Alessi, 2018).Yenidoğanın kilosuna uygun boyutta kanül ve maske seçilmeli, kanül ile septum arasında yaklaşık 2 mm mesafenin korunması sağlanmalıdır. Septum ve filtrum üzerine dolaşımı hızlandırmak amaçlı hafif masaj yapılmalı (her 3-4 saatte bir). Düzenli olarak prong ve maske rotasyon sağlanmalıdır. Ayrıca burun derisi, septum ve filtrumun hidrojel ile yağlanması yara oluşumunu azaltmaktadır (Nguyen, 2021; Jabraeili & ark., 2017). Yenidoğana verilen havanın ısıtılmış (32-34°C) ve nemlendirilmiş (%75'in üzerinde) olmasına dikkat edilmelidir (Pant & Sood, 2023).

Kaynaklar

Akcan, E., Polat, S. (2017). Yenidoğanlarda Ağrı ve Ağrı Yönetiminde Hemşirenin Rolü. *ACU Sağlık Bil Deg.* (2):64-69.

Alanazi, S. M. H., Alanazi, I. Z., Almazyad, L. T., Alanazi, M. A., Alanazi, S. A., Alenezi, H. M., ... & Alanazi, R. A. K. (2023). Overview of Respiratory Care of the Neonate, Review Article. *Archives of Pharmacy Practice*, 14(2-2023), 153-162.

Alessi, S. (2018). Evidence Regarding the Use of Bubble Continuous Positive Airway Pressure in the Extremely Low Birth-Weight Infant. *Advances in Neonatal Care*: 13(3); p.199-207.

Atasay, B., Akın, İ. M., & Alan, S. (2016). Respiratory distress and management strategies in the newborn. *Respiratory Management of Newborns*, 31, 95.

Baltacı, N.Y., Can, N., Yalaz, M., Erol, E.K., Uygur, Ö., Terek, D...& Kültürsay, N. (2020). Basınç Ülseri Risk Değerlendirmesinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması: Neonatal Braden Q Ölçeği. *İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi*, 10(2), 94-103. doi:10.5222/buchd.2020.87049

Barnes, C., Herbert, T. L., & Bonilha, H. S. (2023). Parameters for orally feeding neonates who require noninvasive ventilation: A systematic review. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 32(4), 1714-1733.

Bashir, T., Murki, S., Kiran, S., Reddy, V.K., Oleti, T.P. (2019). 'Nasal mask' in comparison with 'nasal prongs' or 'rotation of nasal mask with nasal prongs' reduce the incidence of nasal injury in preterm neonates supported on nasal continuous positive airway

pressure (nCPAP): A randomized controlled trial. *PLoS One*. 31;14(1):e0211476.

Başara, S. G., Çalışır, H., & Türkmen, M. K. (2024). Effectiveness of Using Checklist in Preventing Facial, Nasal and Head Pressure Injuries in Preterm Infants in Nasal Noninvasive Mechanic Ventilation: A Quasi-Experimental Study. *The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing*, 10-1097.

Boel, L., Broad, K., Chakraborty, M. (2017). Non-invasive Respiratory Support in Newborn Infants, Symposium: Neonatology. *Pediatrics and Child Health*,28:1

Bonfim, F.S.F., Vasconcelos, M.G.L., Sousa, N.F.C., Silva, C.D.V., Leal, L.P. (2014). Nasal Septum Injury in Preterm Infants Using Nasal Prongs. *Rev. Latino-Am. Enfermagem*.22(5):826-33.

Carns, J., Kawaza, K., Quinn, M. K., Miao, Y., Guerra, R., Molyneux, E., ... & Richards-Kortum, R. (2018). Impact of hypothermia on implementation of CPAP for neonatal respiratory distress syndrome in a low-resource setting. *PLoS One*, 13(3), e0194144.

Carvalho, C. G., Procianoy, R. S., Neto, E. C., & Silveira, R. C. (2018). Preterm Neonates with Respiratory Distress Syndrome: Ventilator-Induced Lung Injury and Oxidative Stress. *Journal of immunology research*, 2018(1), 6963754.

Chandrasekaran, A., Thukral, A., Sankar, M.J., Agarwa, R., Paul, V.K., Deorari, A.K. (2017). Nasal Masks or Binasal Prongs for Delivering Continuous Positive Airway Pressure in Preterm Neonates—A Randomised Trial, *Eur J Pediatr*, 176:379–386.

Chen, C.Y., Chou, A., Chen, Y., Chou, H., Tsao, P., Hsieh, W. (2017). Quality improvement of nasal continuous positive airway pressure therapy in neonatal intensive care unit. *Pediatrics and Neonatology*, 58(3), 229-235.

Clinical guideline. (2019). Management of an Infant on the Children's Ward requiring Continuous Positive Airway Pressure (CPAP), www.coeneonatalpccsicnetwork.nhs.uk

Corrigan, M. J., Keeler, J. R., Miller, H. D., Bertha, A. B. K., Fowler, S. B. (2020). Music therapy and retinopathy of prematurity screening: using recorded maternal singing and heartbeat for post exam recovery. *J Perinatol*, 40(12):1780-1788. doi: 10.1038/s41372-020-0719-9.

Dai, T., Lv, L., Liu, X., Chen, J., Ye, Y., Xu, L. (2020). Nasal pressure injuries due to nasal continuous positive airway pressure treatment in newborns: a prospective observational study. *Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing*, 47(1), 26-31. doi: 10.1097/WON.0000000000000604

Dassios, T., Vervenioti, A., & Dimitriou, G. (2022). Respiratory muscle function in the newborn: a narrative review. *Pediatric research*, 91(4), 795-803.

Demissie, B. W., Abera, B. B., Chichiabellu, T. Y., & Astawesegn, F. H. (2018). Neonatal hypothermia and associated factors among neonates admitted to neonatal intensive care unit of public hospitals in Addis Ababa, Ethiopia. *BMC pediatrics*, 18, 1-10.

Demtse, A. G., Pfister, R. E., Nigussie, A. K., McClure, E. M., Ferede, Y. G., Tazu Bongor, Z., ... & Muhe, L. M. (2020).

Hypothermia in preterm newborns: impact on survival. *Global pediatric health*, 7, 2333794X20957655.

Doctor, T.N., Foster, J.P., Stewart, A., Tan, K., Todd, D.A., McGrory, L. (2017). Heated and humidified inspired gas through heated humidifiers in comparison to non-heated and non-humidified gas in hospitalised neonates receiving respiratory support. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, Issue 2. Art. No.: CD012549

Ekhaguere, O. A., Okonkwo, I. R., Batra, M., & Hedstrom, A. B. (2022). Respiratory distress syndrome management in resource limited settings—Current evidence and opportunities in 2022. *Frontiers in pediatrics*, 10, 961509.

El-Atawi, K., Elhalik, M., Kulkarni, T., Zakaria, A., Abdelsamed, A., & Alexander, L. (2018). The first sixty minutes in preterm neonates' life: Predicted morbidities and interventions. *J Pediatr Neonatal Care*, 8(2), 00311.

El-Garhy, S. H. A., Ouda, W. E. S., Ismail, S. S., & Moneim, S. E. A. A. (2020). Quality of Nursing Care Provided to Neonates Undergoing Mechanical Ventilation: An Assessment Study. *International Journal of Novel Research in Healthcare and Nursing*, 7(2), 356-365.

Ergün, K., & Aktaş, E. (2024). Evaluating the Effectiveness of Brief Training for Neonatal Intensive Care Nurses on the Prevention of Medical Device-Related Nasal Pressure Injury. *Advances in Skin & Wound Care*, 37(3), 1-7.

Fedor, K. L. (2017). Noninvasive respiratory support in infants and children. *Respiratory care*, 62(6), 699-717.

Fedor, K.L. (2017). Noninvasive Respiratory Support in Infants and Children. *Respir Care*, 62(6):699–717.

Ferrara, L., Bidiwala, A., Sher, I., Pirzada, M., Barlev, D., Islam, S., ... & Hanna, N. (2017). Effect of nasal continuous positive airway pressure on the pharyngeal swallow in neonates. *Journal of Perinatology*, 37(4), 398-403.

Flanagan, K. A. (2016). Noninvasive ventilation in premature neonates. *Advances in Neonatal Care*, 16(2), 91-98.

Flanagan, K. A. (2016). Noninvasive ventilation in premature neonates. *Advances in Neonatal Care*, 16(2), 91-98.

Fong, S. Y. V. L. (2024). Strategy of interface rotation to reduce nasal trauma in preterm neonates under non-invasive ventilation. *Journal of Neonatal Nursing*, 30(3), 205-213.

Fu, Y., Li, X., Yu, Y., Li, R., & Shi, T. (2024). Summary of the best evidence for the prevention of nasal injury in preterm infants with nasal noninvasive ventilation. *Translational Pediatrics*, 13(2), 224.

Garzotto, F., Zaccaria, M., Vidal, E., Ricci, Z., Lorenzin, A., Neri, M., ... & Ronco, C. (2019). Choice of catheter size for infants in continuous renal replacement therapy: bigger is not always better. *Pediatric Critical Care Medicine*, 20(3), e170-e179.

Göktürk, G., & Sarılioğlu, A. (2024). Effect of white noise during nasal continuous positive airway pressure application on newborn's pain and stress levels, physiological parameters, and crying durations: A randomized controlled study. *Journal of Pediatric Nursing*, 78, e330-e337.

Grazioli, S., Karam, O., & Rimensberger, P. C. (2015). New generation neonatal high frequency ventilators: effect of oscillatory frequency and working principles on performance. *Respiratory care*, 60(3), 363-370.

Greenough, A., Rossor, T. E., Sundaresan, A., Murthy, V., & Milner, A. D. (2016). Synchronized mechanical ventilation for respiratory support in newborn infants. *Cochrane database of systematic reviews*, (9).
<https://doi.org/10.1002/14651858.CD003668.pub4>

Gupta, S., & Janakiraman, S. (2018). Volume ventilation in neonates. *Paediatrics and Child Health*, 28(1), 1-5.

Harshini, B. P., Ananda Kumar, T. S., Kumar, G. V., & Khan, I. (2020). An etiological study of respiratory distress in neonates in a tertiary care medical college hospital. *Pediatric Rev Int J Pediatr Res*, 7(1), 22-26.

Hassan, A., Mohamed, F., & Mohamed, N. (2020). Effect of Different Body Positions on Cardiorespiratory Parameters of Preterm Neonates Undergoing Mechanical Ventilation. *American Journal of Nursing Research*, 8(4), 463-470.

Hatfield, L. A., Murphy, N., Karp, K. & Polomano, R. C. A. (2019). Systematic review of behavioral and environmental interventions for procedural pain management in preterm infants. *J. Pediatr. Nurs.*, 44, 22–30.
<https://doi.org/10.1080/14767058.2020.1755652>

Haymes, E. (2020). The effects of continuous positive airway pressure (CPAP) on nasal skin breakdown. *Journal of Neonatal Nursing*; 26 : 37-42.

Humberg, A., Fortmann, I., Siller, B., Kopp, M. V., Herting, E., Göpel, W., ... & German Neonatal Network, German Center for Lung Research and Priming Immunity at the beginning of life (PRIMAL) Consortium. (2020, August). Preterm birth and sustained inflammation: consequences for the neonate. In *Seminars in immunopathology* (Vol. 42, pp. 451-468). Springer Berlin Heidelberg.

Ilhan, O., & Bor, M. (2020). Randomized trial of mask or prongs for nasal intermittent mandatory ventilation in term infants with transient tachypnea of the newborn. *Pediatrics international*, 62(4), 484-491.

Imbulana, D.I., Louise, S., Dawson, J.A. et al. (2018). A Randomized controlled trial of a barrier dressing to reduce nasal injury in preterm infants receiving binasal noninvasive respiratory support. *J Pediatr*, 201, 34-9.
<https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2018.05.026>

Jabraeili, M., Mahallei, M., Arshadi, M., Mohammadpooras, A., Shamshiri, M., Salimi, Z., Karimipoor, S. (2017). The Efficacy of a Protocolized Nursing Care on Nasal Skin Breakdown in Preterm Neonates Receiving Nasal Continuous Positive Airway Pressure. *Int J Pediatr*, 5(1), 37, pp.4217-4225.

Joseph, R. A. (2015). Prolonged mechanical ventilation: challenges to nurses and outcome in extremely preterm babies. *Critical Care Nurse*, 35(4), 58-66.

Joseph, R.A. (2015). Prolonged mechanical ventilation: challenges to nurses and outcome in extremely preterm babies. *Crit Care Nurse*, 35(4):4. doi:10.4037/ccn2015396.

Kelly-O'Flynn, S., Mohamud, L., & Copson, D. (2020). Medical adhesive-related skin injury. *British Journal of Nursing*, 29(6), S20-S26.

Kenner, C., & Boykova, M. V. (2022). *Neonatal nursing care handbook: an evidence-based approach to conditions and procedures*. Springer Publishing Company. pp. 508-510.

Khan, j., Sundaram, V., Murki, S., Bhatti, A., Saini, S.S., Kumar, P. (2017). Nasal injury and comfort with jet versus bubble continuous positive airway pressure delivery systems in preterm infants with respiratory distress. *Eur J Pediatr*, 176:1629–1635.

Kumar, R.K., Singhal, A., Vaidya, U., Banerjee, S., Anwar, F. and Rao, S. (2017). Optimizing Nutrition in Preterm Low Birth weight infants—Consensus Summary. *Frontiers in Nutrition*, 4: 20.

Li, P., Ji, J., Yu, M., Zhu, L., & Fang, J. (2021). The effect of preventive nursing on the duration of mechanical ventilation and the incidence of complications in neonates with respiratory distress syndrome. *Int J Clin Exp Med*, 14(1), 530-538.

Lund CH, Osborne JW. (2004). Validity and reliability of the neonatal skin condition score. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs*, 33(3):320-7. doi: 10.1177/0884217504265174.

Magalhães PAF, D'Amorim ACG, Oliveira EFALD, Ramos MEA, Mendes APDDA, Barbosa JFDS, Reinaux CMA. Rotating nasal masks with nasal prongs reduces the incidence of moderate to

severe nasal injury in preterm infants supported by noninvasive ventilation. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva*. 2022 ; 34 : 247-254.

Mahmoud, R. A., Schmalisch, G., Oswal, A., & Roehr, C. C. (2022). Non-invasive ventilatory support in neonates: an evidence-based update. *Paediatric respiratory reviews*, 44, 11-18.

Masoumi, Z., SeyedBagheri, S., Bakhtar, B., & Sadeghi, T. (2023). The effect of foot reflexology before suctioning on pain and SPO2 in neonates under nasal CPAP hospitalized in the NICU. *Journal of Neonatal Nursing*, 29(3), 540-544.

Molina, P.G., López, A.A., María, S., Rodríguez, G., Paya, C.B., Carmen, M., Dolz, R., Lopez, E.B. (2017). Neonatal pressure ulcers: prevention and treatment. *Research and Reports in Neonatology*:7 pp.29–39.

Mostafa, A. E. I., El-Khedr, S. M., & Ibrahiem, M. Y. (2024). Nurses' Performance Regarding Non-Invasive Ventilation of Neonates and its Relation to Associated Pressure Injuries. *Tanta Scientific Nursing Journal*, 32(1), 226-245.

Nasef, N., Rashed, H. M., & Aly, H. (2020). Practical aspects on the use of non-invasive respiratory support in preterm infants. *International Journal of Pediatrics and Adolescent Medicine*, 7(1), 21-27.neonatology.org.tr

Newnam, K.M., McGrath, J.M., Salyer, J., Estes, T., Jallo, N., Bass, W.T. (2015). A Comparative Effectiveness Study of Continuous Positive Airway Pressure-Related Skin Breakdown

When Using Different Nasal İnterface in The Extremely Low Birth Weight Neonate. *Applied Nursing Research*, 28, 36-41.

Nguyen, C. V. B., Nguyen, T. T., Pham, T. T. T., Lam, S. T. H., Pham, A. L., Tran, D. N., & Tran, T. D. (2021). Effectiveness of hydrocolloid nasal dressing pads in preventing nasal ulceration in preterm infants using non-invasive ventilation. *MedPharmRes*, 5(4), 46-51.

Oranges, T., Dini, V., & Romanelli, M. (2015). Skin physiology of the neonate and infant: clinical implications. *Advances in wound care*, 4(10), 587-595.

Ota, N.T., Davidson, J., Guinsburg, R. (2013). Early nasal injury resulting from the use of nasal prongs in preterm infants with very low birth weight: a pilot study. *Rev Bras Ter İntensiva*, 25(3):245-250.

Özçevik, D., & Ocakçı, A. F. (2019). Yenidoğanda ağrı: değerlendirme, yönetim ve hemşirenin rolü. *Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi*, 18(1), 18-26.

Özkeçeci, C. F., & Karagöl, B. S. (2021). Mekanik ventilatördeki yenidoğan bebeğin bakımı. *Kocatepe Tıp Dergisi*, 22(1), 73-79.

Pant, D., & Sood, J. (2023). Ventilation and Ventilatory Modes in Neonates. In *Clinical Anesthesia for the Newborn and the Neonate* (pp. 259-290). Singapore: Springer Nature Singapore.

Pascual, A., & Wielenga, J. M. (2022). Nasal pressure injuries among newborns caused by nasal CPAP: An incidence study. *Journal of Neonatal Nursing*.

Queensland Clinical Guideline. (2021). Respiratory distress and CPAP, (Tarihinde 12.12.2024 <https://www.health.qld.gov.au/qcg/publications#neonatal>)

Rahma, A., & Lane, M. E. (2022). Skin barrier function in infants: update and outlook. *Pharmaceutics*, 14(2), 433.

Ramaswamy, V. V., Abiramalatha, T., & Roehr, C. C. (2022). Addressing the lack of clarity about administering surfactant in preterm infants with respiratory distress syndrome treated with noninvasive respiratory support. *JAMA pediatrics*, 176(2), 121-122.

Ramaswamy, V. V., de Almeida, M. F., Dawson, J. A., Trevisanuto, D., Nakwa, F. L., Kamlin, C. O., ... & Liley, H. G. (2022). Maintaining normal temperature immediately after birth in late preterm and term infants: a systematic review and meta-analysis. *Resuscitation*, 180, 81-98.

Rashid, F. L., Basem, A., Hussein, A. K., Al-Obaidi, M. A., & Hamida, M. B. B. (2023). Advancements and Innovations in Thermodynamics for Infant Incubators: A Review. *International Journal of Heat & Technology*, 41(6).

Razak, A., & Patel, W. (2020). Nasal mask vs binasal prongs for nasal continuous positive airway pressure in preterm infants: A systematic review and meta-analysis. *Pediatric Pulmonology*, 55(9), 2261-2271.

Rijal, P., & Shrestha, M. (2018). Scenario of Neonatal Respiratory Distress in Tertiary Hospital. *Journal of Nepal Health Research Council*, 16(2), 131-135. <https://doi.org/10.33314/jnhrc.v16i2.1566>

Rocha, G., Soares, P., Gonçalves, A., Silva, A. I., Almeida, D., Figueiredo, S., ... & Guimarães, H. (2018). Respiratory care for the ventilated neonate. *Canadian respiratory journal*, 2018(1), 7472964.

Sangsari, R., Saeedi, M., Maddah, M., Mirnia, K., & Goldsmith, J. P. (2022). Weaning and extubation from neonatal mechanical ventilation: an evidenced-based review. *BMC pulmonary medicine*, 22(1), 421.

Sarı, Ç., Altay, N. (2016). Yenidoğanlarda Basınç Ülseri Gelişimini Önlemeye Yönelik Hemşirelik Girişimleri. *J Contemp Med*. 6,138-147.

Shah PS, Torgalkar R, Shah VS. (2023) Breastfeeding or breast milk for procedural pain in neonates. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, Issue 8. Art. No.: CD004950. DOI: 10.1002/14651858.CD004950.pub4.

Shehadeh, A. M. (2020). Non-invasive respiratory support for preterm infants following extubation from mechanical ventilation. A narrative review and guideline suggestion. *Pediatrics & Neonatology*, 61(2), 142-147.

Shi, Y., Muniraman, H., Biniwale, M., & Ramanathan, R. (2020). A review on non-invasive respiratory support for management of respiratory distress in extremely preterm infants. *Frontiers in pediatrics*, 8, 270.

Soares, T., Pedroza, G. A., Breigeiron, M. K., & Cunha, M. L. C. D. (2019). Prevalence of hypothermia in the first hour of life of

premature infants weighing $\leq$ 1500g. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, 41, e20190094.

Solanki, J. R., & Bhil, D. L. (2019). Comparative study of nasal mask versus nasal prong in terms of nasal septal necrosis for delivering nasal continuous positive airway pressure in newborns with respiratory distress. *Indian Journal of Child Health*, 601-604.

Sweet, M., Armbruster, D., Bainbridge, E., Reiner, B., Tan, A., Chipps, E. (2017). A Pilot Study of Responses to Suctioning Among Neonates on Bubble Nasal Continuous Positive Airway Pressure. *Advances in Neonatal Care*, 17(6):3-11.

Tauzin, M., & Durrmeyer, X. (2019). Managing neonatal pain in the era of non-invasive respiratory support. In *Seminars in Fetal and Neonatal Medicine* (Vol. 24, No. 4, p. 101004). WB Saunders.

Thirunavukarasu, A. J., Hassan, R., Savant, S. V., & Hamilton, D. L. (2022). Analgesia for retinopathy of prematurity screening: A systematic review. *Pain Practice*, 22(7), 642-651.

Türk Neonatoloji Derneği. (2021). Yenidoğan Döneminde Ağrı ve Tedavisi Rehberi Güncellemesi, Yenidoğanda ağrı tedavisi,: s.11-22.

van Kaam, A. H., De Luca, D., Hentschel, R., Hutten, J., Sindelar, R., Thome, U., & Zimmermann, L. J. (2021). Modes and strategies for providing conventional mechanical ventilation in neonates. *Pediatric research*, 90(5), 957-962.

Vilinsky, A., & Sheridan, A. (2014). Hypothermia in the newborn—an exploration of its cause, effect and prevention. *British Journal of Midwifery*, (22), 8.

Williams, E. E., & Greenough, A. (2021). Lung protection during mechanical ventilation in the premature infant. *Clinics in Perinatology*, 48(4), 869-880.

Wilson, E., Maier, R. F., Norman, M., Misselwitz, B., Howell, E. A., Zeitlin, J., ... & Fenton, A. (2016). Admission hypothermia in very preterm infants and neonatal mortality and morbidity. *The Journal of pediatrics*, 175, 61-67.

Yang, L., Fu, H., & Zhang, L. (2023). A systematic review of improved positions and supporting devices for premature infants in the NICU. *Heliyon*, 9(3).

BÖLÜM III

Otizmli Çocuklara Sahip Olan Ailelerle Yapılan Hemşirelik Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi: Sistematiik Derleme

Serap KIRICI¹

Giriş

Otizm spektrum bozukluğu (OSB), tekrarlayıcı iletişim, sosyal kısıtlılık ve kısıtlı davranışlarla karakterize nörogelişimsel bir bozukluktur (Zengin Akkuş ve ark., 2021). OSB'nin bulguları genellikle kişide üç yaşından önce ortaya çıkmakta olup, bütün yaşam boyunca devam etmektedir (Chen ve ark., 2015). Otizmin evrensel düzeyde yaygınlığı her geçen yıl git gide artmakta ve bu durum otizmli birey ve ailelerine yönelik yapılan araştırmaları daha önemli hale getirmektedir. Zira otizm yalnızca bireyin değil tüm aile üyelerinin iyilik durumunu da ciddi derecede etkileyen bir

¹ Öğretim Görevlisi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

bozukluktur. Bařta bakım ile ilgili yükler aileler üzerindeki sosyal ve psikolojik yüklerle beraber aile dinamiklerini deęiřtirmekte ve bütün bunlar yařam kalitesini olumsuz etkilemektedir (Toper ve Özkan, 2024). Belirli süre sonunda çocuęunun özel durumunu kabullenmeye bařlayan ebeveynler çocuklarının bakımlarını en iyi seviyeye nasıl getirecekleri, eęitim ve gelişimlerini nasıl destekleyecekleri hususunda stres yaşamaktadır (Cengiz ve ark., 2021). Çalışmalar otizimli çocuęu olan ailelerin, dięer engelli ve normal gelişim gösteren çocukların ailelerinden daha çok ebeveynlik stresi yařadığını göstermektedir. Bu stres çoęunlukla çocuklarının gereksinimlerini karřılamanın güçlükleriyle ilişkilidir (Ooi ve ark., 2016). Bu nedenle ebeveynlerin içinde bulundukları güçlüklerin anlařılması açasından otizimli çocuklara sahip olan ailelerle yapılan hemřirelik lisansüstü tezlerinin incelenmesi amaçlanmıřtır.

Gereç ve Yöntem

Arařtırma, 1-10 Nisan 2023 tarihleri arasında konu ile ilgili lisansüstü tezlerin retrospektif olarak taranması řeklinde gerçekteřtirilmiřtir. Veriler Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) web sayfasında yer alan tez arřivi linkinden (<https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/>) yararlanarak “otizimli çocuk, hemřire, aile” kelimesi kullanılarak tarama yapıldı.

Çalışmaya dâhil edilme kriterleri

Tezlerin 2014-2024 yılları arasında hemřirelik alanında Türkiye’de yapılmıř olması, yayınlanmıř olması, yayın dilinin Türkçe olması, onaylanmıř ve tam metin erişimine izin verilen, çalışmanın otizimli çocuklara sahip aile üyeleriyle yapılmıř nicel tasarımlı arařtırmalar olması olarak belirlenmiřtir.

Bulgular

Yapılan tarama sonucunda ilk etapta 24 teze ulaşıldı, fakat tezlerden 7'sinin başlık ve özetinin çalışma konumuzla uyumlu olmaması, tezlerden 1'inin nicel araştırma tasarımıyla olmaması ve tezlerden 4'ünün yayın dilinin Türkçe olmaması sebebiyle çalışmaya 13 tez dâhil edildi. Çalışmaların 12'sinin yüksek lisans tezi, 3'ünün de doktora tezi olduğu belirlenmiştir. Çalışmaların yayın yıllarına bakıldığında (2015, 2016, 2020) yıllarına ait bir yayın, (2023) yılına ait iki yayın, (2001) yıllarına ait üç yayın ve (2022) yıllarına ait dört bulunmaktadır. Bu çalışmaların tanımlayıcı (n=9), kesitsel (=1) ve deneysel (=2) türde olduğu anlaşılmaktadır. Tezler kronolojik sıraya ve lisansüstü seviyeye göre incelenmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. Tezlere İlişkin Bilgiler

Yazar/Yıl	Tezin adı	Türü	Çalışma tipi
Ölmez, H., 2015	Otistik çocukların ebeveynlerinde görülen psikolojik belirtiler ve yaşanan güçlüklerin belirlenmesi	Yüksek lisans	Tanımlayıcı
Şıkşık, G., 2016	Otizmli çocuğa sahip ebeveynlerin otizm algıları ve aile özellikleri ile benlik saygıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi	Yüksek lisans	Tanımlayıcı
Atar, K., 2020	Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların annelerinin bakım yükü ve bakım gereksinimleri	Yüksek lisans	Tanımlayıcı
Akkaya, Ç., 2021	Otizmli çocukların annelerinde ebeveyn rolüne ilişkin kendilik algısı, sosyal destek ve depresif belirtiler	Yüksek lisans	Kesitsel
Vural, B., 2021	Çocuğu otizm spektrum bozukluğu tanısı almış ebeveynlerde ebeveyn yeterlilik ölçeğinin uyarlaması ve ebeveyn özyeterliliğini yordayan faktörler	Doktora	Tanımlayıcı
Yılmaz, G., 2021	Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların beslenme davranışlarının annelerin yaşam kalitesine etkisi	Yüksek lisans	Tanımlayıcı
Karpuzluk, A., 2022	Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocuğa sahip annelerin ebeveynlik stresi ve çocuk sahibi olma motivasyonları	Yüksek lisans	Tanımlayıcı
Şahin Büyük, D., 2022	Otizmli çocuğu olan ebeveynlere yönelik güçlendirme programının ebeveynlerin öz yeterlik, bakım yükü ve stres düzeylerine etkisi	Doktora	Deneyisel
Şanlı, M.E., 2022	Otizm spektrum bozukluğuna sahip çocukların ebeveynlerine verilen pozitif psikoterapi temelli eğitimin stresle başa çıkma, anksiyete ve depresyon düzeyine etkisi	Doktora	Deneyisel
Çiğdem, C.S., 2022	Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların ebeveynlerine uygulanan güçlendirme psikoeğitiminin psikolojik dayanıklılık ve ebeveyn öz-yeterliliğine etkisi	Yüksek lisans	Tanımlayıcı
Onur, E.C., 2023	Otizm spektrum bozukluğu tanısı olan çocuğa sahip ebeveynlerin çocukları için geleneksel ve tamamlayıcı tedavi kullanım durumları ve etkileyen faktörlerin incelenmesi	Yüksek lisans	Tanımlayıcı
Orgun, M., 2023	Otizm spektrum bozukluğu tanısı olan çocuğa sahip annelerin aleksitimi düzeyleri ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi	Yüksek lisans	Tanımlayıcı

Tartışma ve Sonuç

Ölmez (2015)'in çalışmasında ebeveynlerin genel olarak yüksek düzeyde psikolojik belirti gösterdikleri belirlenmiştir ($p<0.05$). Araştırmaya katılan ebeveynler otizmlı çocuğa bakarken yaşadıkları güçlükler "çocuğun geleceği hakkında endişelenme", "kendine zaman ayıramama" ve "günlük yaşamını sürdürmede" ilk sırada yer almaktadır. Şıkşık (2016)'ın çalışmasında ebeveynlerin otizmlı çocuklarına ilişkin görüşlerini ebeveynin, anne ya da baba olma durumu etkilememektedir ($p>0.05$). Babaların aile işlevleri annelere göre daha sağlıklı bulunmuştur. Atar (2020)'ın çalışmasında annenin yaş, eğitim seviyesi, ayrımcılık/dışlanma yaşama durumu ve aile eğitimi/danışmanlık alma durumu gibi değişkenlerin bakım verme yükünü etkilediği belirlenmiştir. Bu değişkenlerin annenin bakım yükünü arttırdığı sonucuna varılmıştır. Akkaya (2021)'nın çalışmasında otizmlı çocuğu olan annelerinin en olumsuz algıya sahip olduđu ebeveynlik rolleri ile ilgili alanın rol dengeleme olduđu, annelerin %46'sının depresyon yönünden risk altında olduđu, sosyal destek algısı yüksek olan annelerde depresyon riskinin azaldığı ve ebeveynlik rolünden aldıkları doyum artmaktadır. Vural (2021)'ın çalışmasında ebeveyn öz yeterlilik ölçeğinin Türk kültürü için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduđu saptanmıştır. Ayrıca iyimserlik, kendini toparlama gücü ve oxford mutluluk puanlarının artması ebeveyn yeterliliğini arttırmaktadır. Ebeveyn yeterliliği üzerinde en etkili faktörün kendini toparlama gücü olduđu saptanmıştır. Yılmaz (2021)'ın çalışmasında otizmlı çocukların anneleri çocuklarının beslenme davranışından etkilendiklerini, olumsuz beslenme davranışı olan otizmlı çocukların annelerinin yaşam kalitelerinin olumsuz yönde

etkilendiđi sonucu ortaya ıkmıřtır. Karpuzluk (2022)'un alıřmasında katılımcıların ebeveynlik stres dzeyi orta derecede yksek ve ocuk sahibi olma motivasyonları dřk dzeyde bulunmuřtur. Annenin yařı, eđitim seviyesi, otizmli ocuđun dođum sırası ve bařka ocuk sahibi olma kararı, ebeveynlik stres dzeyinin istatistiksel olarak anlamlı derecede etkilediđi belirlenmiřtir. řahin Byk (2022)'n alıřmasında otizmli ocuđu olan ebeveynlere ynelik uygulanan glendirme programının ebeveynlerin z yeterliliđini artırıp stresini azaltarak ve aileyi glendirdiđi fakat bakım ykn etkilemediđi belirlenmiřtir. řanlı (2022)'nın alıřmasında pozitif psikoterapi temelli eđitimin otizm spektrum bozukluđuna sahip ocuđu olan ebeveynlerin depresyon ve anksiyete dzeylerini dřrmede ve stresle bařa ıkma becerilerini artırmada etkili olduđu belirlenmiřtir. iđdem (2022)'in alıřmasında glendirme psikoeđitim programının otizm spektrum bozukluđu olan ocukların ebeveynlerinin ebeveyn z-yeterlilik ve psikolojik dayanıklılık dzeyini artırdıđı belirlenmiřtir. Onur (2023)'un alıřmasında annelerin, %73.2'si geleneksel ve tamamlayıcı tedavi kullanırken ocuđun hekimine danıřtıđı, %78.0'ı kullanımdan yarar grdđn, %27.5'i geleneksel ve tamamlayıcı tedavi konusunda bilgi sahibi olduđu ve bilgi kaynađının %29.3'n zel eđitim đretmenlerinin oluřturduđu belirtmiřlerdir. Orgun (2023)'un alıřmasında annelerin aleksitimi ve yařam kalitesi arasında negatif ynl iliřki olduđu, annelerin aleksitimi puan ortalamaları ykseldike yařam kalitelerinin dřtđ belirlenmiřtir.

Kaynaklar

Cengiz, S., Yıldız, M. N., & Peker, A. (2021). Özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynler ile tipik gelişim gösteren çocuğa sahip ebeveynlerin stres ve yaşam doyum düzeylerinin incelenmesi. *OPUS International Journal of Society Researches*, 17(36), 2940-2956.

Akkuş, P. Z., Saygan, B. B., Bahadır, E. İ., Cak, T., & Özmert, E. (2021). Otizm spektrum bozukluğu tanısı ile yaşamak: Ailelerin deneyimleri. *Turkish Journal of Pediatric Disease*, 15(4), 272-279.

Toper, F., & Özkan, Y. (2022). Otizmli Çocuğa Sahip Ailelerin Finansal Yüklerine İlişkin Deneyimleri. *Toplum ve Sosyal Hizmet*, 33(4), 1027-1048.

Chen, M.H., Wei, H.T., Chen, L.C., Su, T.P., Bai, Y.M., Hsu, J.W., Huang, L.E., Chang, W.H., Chen, T.J., & Chen, Y.S. (2015). Autistic spectrum disorder, attention deficit hyperactivity disorder, and psychiatric comorbidities: A nationwide study. *Res Autism Spectr Disord*, 10: 1-6.

Ooi, K.L., Mehmood, Y.S., Khan, S. A., & Tahir. (2016). A meta-synthesis on parenting a child with autism. *Neuropsychiatric Disease and Treatment*, 5(12), 745-762.

BÖLÜM I

Serebral Palsili Çocuklarda Refleksolojinin Uygulanması

Bircan KAHRAMAN BERBEROĞLU¹
Sultan GÜNER BAŞARA²

Giriş

Serebral palsy (SP), anne karnında ya da yenidoğan döneminde gelişmekte olan beyinde meydana gelen, kalıcı hasar nedeniyle ortaya çıkan ancak ilerleyici olmayan, hareket ve duruş gelişimini etkileyerek aktivite kısıtlılıklarına yol açan bir rahatsızlıktır (Chambers & Chambers, 2020; Ferriero & Arn, 2020; Himmelmann & Panteliadis, 2018). SP'li çocuklar, hareket, duruş ve kas tonusunda bozuklukların yanı sıra, motor ve duyuşal problemler ile

¹ Arş. Gör. Dr., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Aydın/Türkiye, Orcid: 0000-0003-2920-4819, biircan5@gmail.com

² Dr.Öğr. Üyesi., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Tokat/Türkiye, Orcid: 0000-0002-0665-5396, sgune6377@hotmail.com

bunlara bağılı ikincil sorunlar da yaşayabilir. Bu çocuklarda epilepsi, zihinsel gerilik, işitme ve görme bozuklukları, duyuşal-motor algı problemleri, ağrı, davranışsal sorunlar ve diğerk vücut sistemlerine ilişkin rahatsızlıklar oldukça yaygındır. Ayrıca, beyindeki hasara bağılı olarak disfaji, beslenme paternindeki bozukluklar, kusma, kronik kabızlık, uyku sorunları ve salya akıntısı gibi problemlere de sıkça rastlanmaktadır (Himmelmänn & Panteliadis, 2018; Chambers & Chambers, 2020; Ferriero & Arn, 2020). Bu tür ikincil sorunlar, SP'li bir çocuğa sahip ailelerin yaşamını büyük ölçüde etkileyerek ebeveynler üzerinde ciddi bir stres kaynağı oluşturur. Ebeveynler, çocuklarının yaşam boyu sürecekk bu rahatsızlığı nedeniyle, kendi bakım verememe durumlarında çocuğun öz bakımının yeterince karşılanamayacağı endişesi gibi zor kabul edilebilecek ve üstesinden gelinmesi güç problemlerle karşılaşırklar. Gün boyunca çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayan bir annenin gece boyunca dinlenememesi de ruhsal olarak yıpranmalarına neden olur. Yapılan araştırmalar, SP'li çocuğı olan ailelerin, normal gelişen çocuğı olan ailelere kıyasla daha yüksek stres seviyelerine sahip olduğunu ve zihinsel sağlıklarının daha fazla etkilendiğini ortaya koymuştur (Wayte & ark, 2012; Guillamón & ark, 2013; Himmelmänn & Panteliadis, 2018; Ferriero & Arn, 2020). Aileler, çocuklarının yaşadığı sorunlara yönelik yaşam boyu farklı tedavi yöntemleri arayışında olurlar. SP rehabilitasyonunda, geleneksel tedavi yaklaşımlarına ek olarak tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemleri de aileler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Yapılan bir çalışmada, nörolojik sorunu olan çocukların alternatif yöntemleri sık kullandığı ve bu yöntemler arasında refleksoloji uygulamasının üçüncü sırada olduğu belirtilmiştir (Low & ark, 2008).

Refleksoloji, yetişkinler üzerinde farklı problemlere yönelik uygulanmış ve bu uygulamaların sonuçları raporlanmıştır. Multipl skleroz, perimenstrüel yakınmalar, astım, gibi durumların yanı sıra, ağrı, yaşam kalitesi, yorgunluk, anksiyete, uyku düzeni ve hipertansiyonu olan hastalarda refleksoloji çalışıldığı görülmektedir (Özdemir, 2011; Yılar, 2014; Alan, 2015; Avcı, 2015; Aydın, 2015; Doğan, 2015; Gözüyeşil, 2015; Metin, 2015; Ünal, 2015; Bakır, 2016; Kizir, 2016; Kurt, 2016; Polat, 2016; Güven, 2017; Esmel-esmel & ark, 2017; Zengin, 2017; McCullough & ark, 2018; Rameznibadr & ark, 2018; Shahsavari & ark, 2018; Kapila & ark, 2019; Silverdale, 2019; Büyükbayram & Ayık, 2021). Refleksolojinin SP’li çocuklar arasında oldukça yaygın bir kullanım alanı olmasına rağmen, bu yöntemin SP’li çocuklar üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar sınırlıdır. Hasta ve sağlıklı yetişkinler üzerinde yapılan çalışmaların olumlu etkileri göz önüne alındığında, refleksolojinin SP’li bir çocuğun adım atmasına, konuşma yeteneğinin gelişmesine, algısının artmasına, spastisitenin azalmasına, kabızlık probleminin çözülmesine ve yeme-içme süreçlerinin kolaylaştırılmasına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda, bu bölüm SP’li çocuklarda refleksoloji uygulamasının etkilerini incelemek amacıyla ele alınmıştır.

Serebral Palsi

SP, etiyojisi, türleri ve şiddeti açısından farklılıklar gösteren, kalıcı ve yaşam boyu süren bir rahatsızlıktır. Beynin motor bölgelerinde oluşan lezyonlar nedeniyle gelişir ve çocukların normal gelişim süreçlerini etkileyerek motor fonksiyon ve postür bozukluklarına neden olur. SP, en yaygın nörogelişimsel

yetersizliklerden biridir (Chambers & Chambers, 2020; Milićević, 2022).

SP'li çocuklarda motor gelişimin primer unsuru olan motor fonksiyonlar, lezyonun şiddetiyle orantılı olarak gecikir ve sorunlu bir şekilde gelişir (Chambers & Chambers, 2020; Ferriero & Arn, 2020; Himmelmann & Panteliadis, 2018). İlk bakışta ana sorun motor problemlerdir. Ancak motor problemlerin yanı sıra SP'ye epileptik nöbetler, bilişsel engellilik, diş, görme, işitme, solunum, gastrointestinal, üriner, kas-iskelet, oral motor, uyku ve davranış sorunları ile ağrı ve disfaji gibi sorunlar eşlik edebilir (Himmelmann & Panteliadis, 2018; Chambers & Chambers, 2020). SP, birçok sistemi etkileyen bir rahatsızlık olup, rehabilitasyon süreci; medikal ve cerrahi tedavi yöntemleri, fizyoterapi, ergoterapi, alçı, ortez ve diğer yardımcı cihazlar, konuşma ve dil terapisi, rekreasyonel aktiviteler, okul desteği, eğitim ve psikososyal yaklaşımlar gibi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir (Himmelmann & Panteliadis, 2018).

Refleksoloji

Refleksoloji, rahatlamayı artırmak için belirli refleks noktalarına basınç uygulayarak yapılan, bütünsel iyileştirme sağlayan ve enerji dengesini yeniden kurmayı hedefleyen tamamlayıcı bir terapi yöntemidir (Magill & Berenson, 2008; Yüksel 2021). Refleksoloji, salgı bezleri, vücut bölgeleri ve organlar ilişkili refleks noktalarına elle uygulanarak yapılan, kişinin ellerine, ayaklarına ve kulaklarına dokunarak vücut fonksiyonlarının normalleşmesine yardımcı olan bir tekniktir (Livanelioğlu ve Günel, 2009; Yalçiner, 2017). Bu yaklaşıma göre, kulaklar, eller ve ayak tabanlarında her vücut bölümüne karşılık gelen bir sinir noktası

bulunur. Her organın, kulaklarda, ellerde ve ayak tabanlarında yer alan bu sinir noktalarına yapılan uyarılar ilgili bölgeyi harekete geçirir (Yalçiner, 2017).

Uygulayıcılar, genellikle daha kolay erişilebilir, daha duyarlı ve daha geniş alanlara sahip olduğu için ayaklar ile çalışmayı tercih ederler. Ancak ayak masajı ile refleksoloji birbirinden farklıdır. Refleksolojide kullanılan teknikler, klasik masajdan farklı olup, solucan hareketini andıran bir yönelimle yapılır (Gözüyeşil, 2015). Tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak kullanılan refleksoloji, vücudun kendi iyileşme mekanizmasını aktive ederek fizyolojik bir rahatlama sağlar. Refleks noktalarına elle yapılan uyarılarla sinirler ve kan dolaşımı uyarılır, bu da refleksolojinin temel prensibini oluşturur. Refleksoloji, holistik bir dengeleme tedavisi olarak tanımlanır (Yalçiner, 2017).

Refleksoloji, yan etkisi olmayan ve invaziv olmayan, bütünsel bir tedavi yöntemidir. Tanı koymak ya da hastalığı tek başına tedavi etmek için kullanılmaz. Ana amacı, hastalığın yol açtığı ikincil sorunları hafifletmek, rahatlama sağlamak ve vücudun dengeyi yeniden kurmasına yardımcı olmaktır (Wang & ark., 2008). Ucuz, etkili ve kolay uygulanabilen bir yöntem olup, hemşirelik girişimi olarak da kullanılabilir (Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2011; Dikmen, 2023).

Ülkemizde tamamlayıcı tedavilerle ilgili yapılan çalışmaların sayısı sınırlıdır. Bu durum, tamamlayıcı tedavilere olan güven eksikliğinden, bu tedavilerin yeterince bilinmemesinden ve uygulayıcı profesyonel sayısının az olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, tamamlayıcı tedavi kullanımıyla ilgili net veriler yoktur

(Cole & Shanley, 2002; Özçelik & Fadıloğlu, 2009). Hemşireler tarafından kullanılan tamamlayıcı tedaviler üç gruba ayrılmıştır (Cole & Shanley 2002; Khorshid & Yapucu, 2010). Refleksoloji, hemşirelerin doğrudan uygulama yapabildikleri terapiler arasında birinci grupta yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'ne göre (tarih: 27 Ekim 2014, sayı: 9158) bu tür uygulamalar yalnızca Bakanlıkça yetkilendirilmiş ünitelerde, sertifikalı tabipler ve diş tabipleri tarafından yapılabilir. Ayrıca, bu alanda temel eğitimi olan sağlık çalışanları, sertifikalı tabiplere yardımcı olabilirler. Aynı yönetmeliğin eklerinde ise, refleksoloji uygulamasının sertifikalı tabipler ve tabip gözetimindeki sertifikalı sağlık meslek mensupları tarafından yapılabileceği belirtilmektedir (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği, 2014). 19/04/2011 tarihinde yayımlanan 27910 sayılı Hemşirelik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hemşiresi'nin görev, yetki ve sorumlulukları arasında hemşirelerin, bireylerin kullandığı ilaçlar, bitkiler, vitaminler, alternatif tedaviler ve besinsel destekler gibi alternatif uygulamaları değerlendirebileceği belirtilmiştir. Ayrıca hemşirelerin masaj, manevi destek, anksiyeteyi azaltma, gevşeme teknikleri ve terapötik dokunma gibi hemşirelik girişimlerini uygulama yetkisine sahip oldukları da ifade edilmiştir (Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2011). Hemşirelerin bu alanda kendini geliştirmesi, tamamlayıcı tedavileri öğrenmesi ve hastalarına uygulayabilmesi önemlidir (Karayağız Muslu & Öztürk, 2008; Akkuş Topçu, 2009; Turan & ark., 2010; Çevik, 2013; Büyükbayram & Ayık, 2021; Dikmen, 2023).

Son yıllarda yapılan arařtırmalar, refleksolojinin yorgunluk, uykusuzluk, anksiyete, depresyon, dispne, migren ağrıları, romatizmal kas ağrıları, spazmlar, bulantı, kusma, kabızlık ve bazı üriner sistem sorunlarını gibi sorunları azalttığını, multiple skleroz gibi nörolojik kökenli hastalıklarda uygulanan rehabilitasyon sürecini desteklediğini, kanser ağrıları ile kemoterapinin yan etkilerini hafiflettiğini, doğumu kolaylařtırdığını, doğum sürecindeki yakınmaları azalttığını, premenstrüel sendrom ve dismenore yakınmalarını hafiflettiğini ve bebeklerde infantil koliği hafiflettiğini göstermektedir (Aydın, 2015; Alan, 2015; Avcı, 2015; Bakır, 2016; Esmel-esmel & ark, 2017; Gözüyeřil, 2015; Güven, 2017; Kapila & ark, 2019; Koç, 2013; Kurt, 2016; Özdemir, 2011; Polat, 2016; Rameznibadr & ark, 2018; Shahsavari & ark, 2018; Silverdale, 2019; Ünal, 2015; Yılar, 2014; Yılmaz, 2014; Zengin, 2017; Büyükbayram & Ayık, 2021).

Refleksoloji Uygulaması

Refleksoloji seansı 30 ila 60 dakika arasında sürer. Bu yöntemde, parmaklar veya yardımcı araçlar kullanarak ayak tabanındaki refleks noktalara çeřitli řekillerde basınç uygulanır. Basınç derin olmalı, ancak acı vermemelidir. Uygulama öncesinde, ayağın pasif hareketlerle gevřemesi ve ısınması sağlanır, ardından başparmak ile ayak tabanı taranır. Çalışma yapılacak bölgelere temel uygulama tekniklerinden bir ya da birkaç kullanılabilir. Nokta sayısı fazla olduėunda, tüm teknikleri uygulamak zaman alabilir, bu nedenle bir ya da birkaç teknikle çalışma yapılabilir. Refleksoloji herhangi bir parmağın kenarıyla basınç uygulanarak gerçekteřtirilir (Wang & ark., 2008).

Refleksoloji uygulamalarında farklı basınç teknikleri kullanılır; başparmak, parmak hareketleri, ovma, sıvazlama ve sıkma bunlar arasındadır (Koç, 2013). En uygun pozisyon, kişinin rahatlığına göre seçilir ve genellikle sırt üstü ya da kucakta uygulanır (Doğan, 2015). Uygulama odasının sıcaklık ve ışığı uygun olmalıdır. Uygulayıcının tırnakları, parmak boyunu geçmemelidir (Gözüyeşil, 2015). Uygulama genellikle önce bir ayakta yapılır, ardından diğer ayağa geçilir (Koç, 2013). Basınç şiddeti kişiye göre değişir; yetişkinlerde daha kuvvetli, çocuklarda orta derecede, bebeklerde ise hafif derece basınç uygulanır (Wilhelm, 2009; Özdemir, 2011). Bebeklerde doku hasarını önlemek için basınç bebeğin duyarlılığına göre ayarlanır. Eller yıkanır, sıcaklık için sürtülür ve çıplak ellerle uygulanır (Orhan, 2016). Yenidoğanlar için basınç nazik olmalı ve seanslar kısa tutulmalıdır. Başparmak ve işaret parmağı gibi parmaklar kullanılır, başka bir yardımcı araç gerekmez (Orhan, 2016).

Sonuç

SP'li bir çocuğun adım atma, konuşma, algılama, spastisite, kabızlık ve yeme-içme sorunları gibi birçok problemi aynı anda barındırdığı için bu çocukların sorunlarını tamamen çözmek zordur ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Literatürde SP'li çocuklar için tedavi yöntemleri bulunsa da, aileler, geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda alternatif tedavi arayışına girerler. Bu da, onları duygusal olarak rahatlatır (Bower, 2009; Majnemer & ark, 2013; Gözüyeşil, 2015; Yalçiner, 2017).

Refleksoloji, motor bozuklukların yanı sıra birçok problemin görüldüğü SP'li çocuklarda kullanılmasına rağmen, bu çocuklar üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar oldukça sınırlıdır

(Gözüyeşil, 2015). Hasta ve sağlıklı yetişkinler üzerinde yapılan çalışmaların olumlu etkileri göz önüne alındığında, refleksoloji ile SP’li bir çocuğun adım atması, konuşabilmesi, algısının artması, spastisitenin azalması, kabızlığın düzelmesi ve yeme-içmenin kolaylaşması sağlanabilir. SP’li çocuklarda nörogelişimsel tedavi yaklaşımlarına ek olarak uygulanan refleksoloji, uyku, konstipasyon, salya problemi, motor beceriler, yaşam kalitesi ve aile etkilenimi gibi SP’ye bağlı eşlik eden sorunlar üzerinde olumlu etki gösterebilir.

Kaynaklar

Akkuş Topçu S. (2009). Hemşirelik uygulamaları ve eğitiminde tamamlayıcı ve alternatif tedaviler. *Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi*, 6(2):5-9.

Alan, H. (2015). Jinekolojik Kanser Hastalarında Kemoterapi Tedavisi Sürecinde Uygulanan Progresif Kas Gevşeme Egzersizleri Ve Refleksolojinin Ağrı, Yorgunluk, Anksiyete, Depresyon Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi; Randomize Kontrol Çalışması. Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Avcı, N. (2015). Total Abdominal Histerektomi Ameliyatı Sonrası Ağrının Ve Anksiyetenin Azaltılmasında Refleksolojinin Etkisi. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Aydın Y. (2015). Aşırı Aktif Mesane Şikayeti Olan Kadınlarda Refleksolojinin Etkinliği. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Bakır E. (2016). Romatoid Artritli Hastalarda Ayak Refleksolojisinin Ağrı Ve Uyku Kalitesine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Bower E. (2009). Finnie's handling the young child with cerebral palsy at home.

Büyükbayram, Z., & Ayık, D. B. (2021). Türkiye’de refleksoloji uygulaması ile ilgili yapılan hemşirelik tezlerinin incelenmesi: bir sistematik derleme. *Sağlık Profesyonelleri Araştırma Dergisi*, 3(1), 25-37.

Chambers, H.G., & Chambers, R. (2020). Introduction to the cerebral palsies. Philip D. Nowicki (Ed). *Orthopedic Care of Patients with Cerebral Palsy* içinde. (1.bs., pp. 1-12). İsviçre: Springer.

Cole A, & Shanley E. (2002). Complementary therapies as a means of developing the scope of professional nursing practice. *Journal of Advanced Nursing*, 27: 1171-1176.

Çevik K. (2013). Hemşirelikte tamamlayıcı ve alternatif tedavi: Refleksoloji. *Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi*;29(2):71-82.

Dikmen, R. (2023). Hemşirelikte Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulamalarına İlişkin Eğitim ve Yönetmelik Durumu. *Doğal Yaşam Tıbbi Dergisi*, 5(1), 6-13.

Doğan HD. (2015). Multiple Sklerozlu Hastalara Uygulanan Refleksolojinin Ağrı, Yorgunluk Ve Yaşam Kalitesine Etkisi. Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Esmel-esmel N, Tomas-Esmel E, Tous-Andreu M, Bove-Ribe A, & Jimenez-Herrera M. (2017). Reflexology and polysomnography: Changes in cerebral wave activity induced by reflexology promote N1 and N2 sleep stages, *Complementary Therapies in Clinical Practice*, 28:54-64.

Ferriero, K., & Arn, P. (2020). Abnormalities and congenital malformations as a cause of cerebral palsy. Freeman Miller, Steven Bachrach, Nancy Lennon, & Margaret E. O'Neil (Ed). *Cerebral Palsy* (Second Edition) içinde. (1.bs.,pp. 37-44). İsviçre: Springer.

Gözüyeşil Y. (2015). Refleksoloji. Başer, M., Taşcı, S. (Ed.), Kanıta Dayalı Rehberleriyle *Tamamlayıcı ve Destekleyici Uygulamaları* içinde (s.89-95) Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi.

Guillamón N, Nieto R, Pousada M, Redolar D, Muñoz E, & Hernández E. (2013). Quality of life and mental health among parents of children with cerebral palsy: the influence of self-efficacy and coping strategies. *Journal of Clinical Nursing*, 22(11-12), 1579-1590.

Güven E. (2017). Elektif Sezaryen Olan Hastalarda Post-Operatif Ağrı Ve Anksiyetenin Azaltılmasında Refleksolojinin Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19/04/2011 Tarihli 27910 Sayılı Resmi Gazete, Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği Görev, Yetki ve 68 Sorumlulukları, Hemşirelik Girişimleri [İnternet]. Erişim adresi:<http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110419-5.htm>. <https://www.rcm.org.uk/news-views-and-analysis/news/reflexology-school-for-midwives>, Reflexology school for midwives (Erişim tarihi:04.11.2024)

Himmelmann, K., & Panteliadis C.P. (2018). Clinical characteristics. Panteliadis (Ed). *Cerebral Palsy: A Multidisciplinary Approach, (Third Edition)* içinde. (10.bs., pp. 75-89). İsviçre: Springer

Kapila AK, Her A, Knife N, Chaplin P, & Patel A. (2019). A prospective Cohort Study on the Impact of Reflexology in Patients

with Breast Cancer Using the MYCaW Scale, *Clinical Breast Cancer*, 1-8.

Karayağız Muslu G, & Öztürk C. (2008). Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler ve çocuklarda kullanımı. *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi*, 51:62-7.

Khorshid L, & Yapucu Ü. (2010). Tamamlayıcı Tedavilerde Hemşirenin Rolü. *Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi*, 8: 124-130.

Kızır Y. (2016). Koroner Anjiyografi Planlanan Hastalarda Refleksolojinin Anksiyete Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi. Şanlıurfa: Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Koç T. (2013). Süt Çocuğunda Refleksoloji Tekniğı İle Uygulanan Ayak Masajının Akut Ağrıya Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Kurt S. (2016). Onkoloji Hastalarında Periferel Nöropatinin Yönetiminde Refleksolojinin Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Livanelioğlu A, & Günel M. (2009). *Serebral Palside Fizyoterapi*. Ankara: Yeni Özbek Matbaası, 219-109.

Low, E., Murray, D., O'Mahony, O., & Hourihane, J.B. (2008). Complementary and alternative medicine use in Irish paediatric patients. *Irish Journal of Medical Science*, 177(2), 147-150

Magill L, & Berenson S. (2008). The conjoint use of music therapy and reflexology with hospitalized advanced stage cancer

patients and their families. *Palliative and Supportive Care*, 6(03), 289-296.

Majnemer A, Shikako-Thomas K, Shevell MI, Poulin C, Lach L, & Schmitz N. (2013). Complementary and Alternative Medicine Treatments in Adolescents With Cerebral Palsy. *Journal of Child Neurology*, 28(11), 1443-1447.

McCullough JEM, Liddle SD, Close C, & Sinclair M. (2018). Reflexology: A Randomised Controlled Trial Investigating The Effects on Beta-Endorphin, Cortisol and Pregnancy Related Stress, *Complementary Therapies in Clinical Practice*, 31:76-84.

Metin ZG. (2015). Romatoid Artritli Hastalarda Aromaterapi Masaji ve Refleksoloji Uygulamalarının Ağrı ve Yorgunluğa Etkileri. Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Milićević, M. (2022). Functional and environmental predictors of health-related quality of life of school-age children with cerebral palsy: A cross-sectional study of caregiver perspectives. *Child: Care, Health and Development*. 49(1),1–11. doi.org/10.1111/cch.13007

Orhan, İ. (2016). Temel Refleksoloji Notları, 1. Uluslararası ve 3. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi Bildiri Kitabı, 24-26 Kasım 2016, s. 9-14. Antalya.

Özçelik H, & Fadıloğlu Ç. (2009). Kanser hastalarının tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanım nedenleri. *Türk Onkoloji Dergisi*, 24: 48-52.

Özdemir G. (2011). Hemodiyaliz Hastalarına Uygulanan Refleksolojinin Yorgunluk, Ağrı Ve Krampa Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Öztürk R. (2015). Abdominal Histerektomi Sonrası Refleksolojinin İyilik Haline Etkisi. Doktora Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015.

Polat H. (2013). Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarına Uygulanan Refleksolojinin Dispne Ve Yorgunluğa Etkisi. Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Rameznibadr F, Amini K, Hossaingholipor K, & Faghihzadeh S. (2018). The impacts of foot reflexology on anxiety among male candidates for coronary angiography: A three-group single-blind randomized clinical trial, *Complementary Therapies in Clinical Practice*, 32:200-204.

Shahsavari H, Abad MEE, & Yekaninejad MS. (2018). The effects of foot reflexology on Anxiety and Physiological Parameters among Candidates for Bronchoscopy: A Randomized Controlled Trial, *European Journal of Integrative Medicine*, 12:177–181

Silverdale N. (2019). Massage and Reflexology for post-Operative Cancer Cystectomy Patients: Evaluation of a Pilot Service, *Complementary Therapies in Clinical Practice*, 34:109–112.

Turan N, Öztürk A, & Kaya N. (2010). Hemşirelikte yeni bir sorumluluk alanı: tamamlayıcı terapi. *Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi*; 3(1):93-8.

Ünal KS. (2015). Hemodiyaliz Hastalarında Ayak Refleksolojisi Uygulamasının Konstipasyona Etkisi. Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Wang MY, Tsai PS, Lee PH, Chang WY, & Yang CM. (2008). The efficacy of reflexology: systematic review. *Journal of Advanced Nursing*, 62 (5), 512-520.

Wayte S, McCaughey E, Holley S, Annaz D, & Hill CM. (2012). Sleep problems in children with cerebral palsy and their relationship with maternal sleep and depression. *Acta Paediatrica*, 101:618-23.

Wilhelm Z.A. (2009). Adım Adım Sağlık: *Refleksoloji*. (4.baskı). İstanbul: Dharma Yayınları.

Yalçın B. (2017). *Batı klinik refleksoloji*, Hastalık Bozukluk Ve Engellilerde Refleksoloji Uygulamaları.

Yılar Z. (2014). Ayak Refleksolojisinin Doğum Ağrısına Ve Doğum Eyleminin Süresine Etkisi. Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Yılmaz FA. (2014). Ayak Refleksolojinin Dismenore Ve Okul Performansına Etkisi. Doktora Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Yüksel, H. (2021). Tamamlayıcı tıp uygulamaları: Refleksoloji. *Bütünleyici ve Anadolu Tıbbi Dergisi*, 2(3), 56-66.

Zengin L. (2017). Kemoterapi Alan Hastalarda Uyku Hijyeni Eğitimi Ve Refleksolojinin Uyku Kalitesine ve Yorgunluğa Etkisi. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

BÖLÜM IV

Solunum Sistemi Hastalıkları ve Pediatri Hemşireliği

Meltem PEPE

Giriş

Solunum sistemi, homeostatik denge kapsamında hücre ve dokuların ihtiyaç duyduğu oksijeni dolaşıma kazandırırken, atık ürün olan karbondioksitin de vücuttan uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. Solunum sistemi gerek anatomik yapısı gerekse hastalıkları dolayısıyla üst ve alt solunum yolları olmak üzere iki bölümde incelenmektedir. Göğüs boşluğunun dışında kalan, burun, farenks, larenks, trakeanın üst kısmı üst solunum yollarını; göğüs kafesi içerisinde kalan trakeanın alt kısmı, bronş, bronşiol ve alveollerin bulunduğu kısımlar ise alt solunum yollarını oluşturmaktadır (Vagas & Akgül, 2009).

Çocukluk dönemi yaşamsal dönem içerisindeki 0-18 yaş grubu dönemi kapsamakta ve solunum sistemi yetişkin bir bireyle kıyaslandığında özellikle erken bebeklik, çocukluk dönemlerinde

anatomik ve fizyolojik açılardan değerlendirildiğinde birçok farklılık göze çarpmaktadır. Çocuk solunum sisteminin yetişkinlerden farkları aşağıdaki gibidir;

- Bebekler yaklaşık olarak dört aya kadar sadece burun solunumu yapmakta ve ağız solunumunu gerçekleştirememektedir
- Dil göreceli olarak daha büyüktür ve bu durum hava yolu obstrüksiyonu için risk oluşturmaktadır
- Epiglot kıkırdak yapı daha kısa ve kalındır
- Yetişkinlere kıyasla larinks daha yukarıda ve huni şeklinde gözlenmektedir
- Larinks, trakea ve bronşlarda duvar kalınlığı yaklaşık on sekiz yaşına kadar, lümen çapına kıyasla daha ince gözlemlenirken bu durum aynı zamanda hava yollarında kollaps riskini de artırmaktadır
- Bronşlar eşit açı ile akciğerlere giriş göstermektedir
- Abdomen içi organlar ve mediastinal yapılar büyüklüklerinden dolayı solunumu etkileyebilmektedirler
- Solunum yolları yetişkinlere kıyasla daha kısa olduğu için herhangi bir patojenin ilerleyişi çok daha hızlı olabilmektedir
- Yenidoğan ve erken çocukluk dönemlerinde, interkostal kaslar henüz tam gelişmediği için zayıf ve toraks daha çok kıkırdak hâkimiyetindedir. Bu durum

ise diyafragma etkinliğinde artışla birlikte abdominal solunumun görülmesine sebep olmaktadır

- Sistemde görülen bu farklılıklar ve immatürite çocuklarda solunum sistemi hastalıklarının görülme sıklığında artışa sebep olmaktadır (Flibotte & Gokulakrishnan, 2018; Hay & ark., 2020; Carlo, 2021).

Solunum sisteminin ilk organı burundur fakat farenks yapısı sayesinde burun solunumu yapılamadığı durumlarda ağız da solunuma yardımcı olabilir. Çocukları ağız solunumu yapmaya iten sebepleri inceleyen çalışmalarda obstrüktif, habitual ve anatomik sebepler olmak üzere başlıca üç sebep kategorize edilmektedir. Obstrüktif sebeplerde; havayollarının burun alanında direnç artışı veya normal hava akışının tıkanmasıyla ağız solunumu görülmektedir. Obstrüktif sebeplere bağlı olarak ağız solunumu yapan bireyler genellikle uzun, dar yüzlü ve nazofarengeal pasajlı ektomorf kişilerdir. Habitual sebeplere bağlı olarak ağız solunumu sürdüren çocuklarda tıkanık sebeplerinin ortadan kaldırılmasına rağmen alışkanlıklardan dolayı halen ağız solunumunun sürdürüldüğü görülmektedir. Anatomik yapısal bozukluklara bağlı olarak sıklıkla kısa üst dudak varlığı sebebiyle, dudağın kapatılmasında normalden daha fazla efor gerekliliği olan kişilerde yine benzer şekilde ağız solunumu görülmektedir (Sim & Finn, 2008; Doğan, 2020; Carlo, 2021). Ağız solunuma katkı sağlayabilirken aynı zamanda ağız ve burun solunumunun bazı farklılıkları bulunmakta ve burun solunumunun sağladığı avantajlarla birlikte daha sağlıklı bir solunum şekli sağladığı görülmektedir.

Ağız solunumuna kıyasla burun solunumu;

- Burun solunumunun daha derin solunum yapma imkânı sağlarken, derin solunumla birlikte diyafram kasılmasının desteklendiği, akciğer bazlı havalanma alanlarının ve bütün bu işleyişle birlikte ise oksijenlenmenin artırıldığı,
- Dilin konumunun belirlenmesiyle birlikte buna bağlı olarak konuşmayı ve telaffuzun düzenlenmesi,
- Orofasiyal kasların koordinasyonunun düzenlenmesi,
- Yetersiz kraniofasiyal gelişimin önlenmesi için yardımcı olunması,
- Mukus üretimi düzenlenmesi ve beraberinde horlamanın azalması,
- Nefes almayla birlikte akciğere nakledilecek olan havanın nemlendirme ve ısıtılmasının sağlanması,
- Solunumla ilişkili alanlar ve bağışıklık için birer tehdit unsuru oluşturabilecek toz, polen gibi allerjenler ya da bakteri, virüs gibi mikroorganizmaların yavaşlatılarak etkisiz hale getirilmesi ve atılımlarının sağlanması,
- Koku algılanmasının sağlanması,
- Diş arkının oluşumunun daha sağlıklı tamamlanması gibi avantajlar sağlamaktadır (Flibotte & Gokulakrishnan, 2018; Hay & ark., 2020; Doğan, 2020)

Ağız ya da burun yoluyla solunum sağlayan çocuklar için avantaj ve dezavantaj durumlarının incelendiği çalışmalarda; ağız solunumu yapan çocukların daha çok huzursuz uyku, terleme, uykunun kalitesinin düşmesinden dolayı gündüz uyku hali, sinirlilik, baş ağrısı, akademik performansın olumsuz etkilenmesi, ağız kuruluğu, kötü nefes, daha kolay yorulma, beslenme alışkanlıklarında değişiklik, üst solunum yolu enfeksiyonları sıklığında artış, üst solunum yollarında akıntı gibi problemlerin daha sık görüldüğü belirtilmektedir (Chambi-Rocha & ark., 2018; Doğan, 2020).

Çocuklarda görülen solunum sistemi farklılıkları onların büyüme ve gelişmesi için gerekli yapılar olsa da zaman zaman onların aleyhine olacak şekilde solunum yolu hastalıklarının sık görülmesine, alt hava yollarına enfeksiyonun hızlı ilerleyişine de olanak tanımaktadır. Bu gelişimsel farklarla birlikte solunum sistemi hastalıkları çocuklarda en sık görülen sistem hastalıklarındandır. Dünyada halen beş yaş altı ölüm sebeplerinde %20 gibi bir rakamla pnömoni gözlenirken, özellikle bu rakamlardaki yüksekliğin gelişmemiş ülkelerden kaynaklandığı bildirilmektedir (Dünya Sağlık Örgütü-DSÖ, 2022). Türkiye’de 0-6 ve 7-14 yaş grubunda yer alan çocuklarda her iki grup için de üst solunum yolu enfeksiyonun oldukça sık görüldüğü; oranların ise sırasıyla %35,9 ile %29,4 olduğu tespit edilmiştir (Türkiye İstatistik Kurumu-TÜİK, 2019). Çocuklarda görülen solunum yolu enfeksiyonlarının etyolojisinde sıklıkla; A grubu beta hemolitik streptokok, stafilokok, hemofilus influenza, klamidya trachomatis, mikoplazma pnömoni gibi bakteriyel ya da respiratuar sinsitiyal virüs gibi viral nedenlere rastlanmaktadır. Çocuklarda solunum sistemini etkileyen

hastalıkların başında; sinüzit, nazofarenjit, tonsillit, farenjit, otitis media(üst solunum yolu enfeksiyonu kaynaklı), krup, bronşiolit, astım ve pnömoninin geldiği görülmektedir (Conk & ark., 2018). Solunum sistemi hastalıkları sıklıkla viral kaynaklı olarak geliştiği için tedavisinde tamamlayıcı alternatif tedavilerin benimsenmesi farmakolojik yükü azaltarak kişiye destek sağlamaktadır. Çocuklarda geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonlarında uygulanan tamamlayıcı ve alternatif tedavi (TAT) girişim sıklığı incelendiğinde ülke bazında; Afrika’da %80, Kanada %70, Avusturalya %48, Amerika %42, Belçika %38 olarak veilmektedir (DSÖ, 2005). Ülkemizde bu durum değerlendirildiğinde %9-93.7 gibi çok geniş bir aralık karşımıza çıkmaktadır (Topaloğlu & ark., 2013; Cırık & Efe, 2017). Ülkemizde TAT kullanım sıklığı ve durumunu değerlendiren bir başka çalışmada; ebeveynlerin sıklıkla (%95.1) TAT’ ye ilişkin uygulamalara başvurduğu, bu ebeveynlerin %92.1’inin farmakolojik tedaviye başlamadan önce TAT uygulamalarını başlattığı, çocukları ÜSYE geçiren ebeveynlerin %86’sının çocuğuna TAT uyguladığı, TAT’ ı tercih eden ebeveynlerin %73.3’ünün ise tıbbi yöntemlerin faydası olmadığını ya da ilaç kullanmak istemediği için TAT uygulamalarına başvurduğu saptanmıştır (Hazır & Bozkurt, 2020). Sağlık bakanlığı’nın da sıklıkla vurguladığı akılcı ilaç kullanımı konusuyla da ilişkili olacak şekilde çoğu kez antibiyotikler yanlış kullanılmaktadır. Bu yanlış kullanım sıklıkla solunum sistemi hastalıklarında gerçekleşmektedir (Brink & ark., 2004; Rudge & Holmes, 2016; Güngör & ark., 2019). Bu konuda kişilerin bilinç düzeyleri de önem taşımaktadır. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotik kullanımı ile ilgili gerçekleştirilen bir araştırmada; ebeveynlerin

çoğunun (%90-95) çoklu semptom olmadan yalnızca ateş, öksürük ya da boğaz ve kulak ağrısı gibi durumların varlığında antibiyotik kullanımı gerekmediğini düşündükleri, buna rağmen soğuk algınlığı/grip ve tek başına sulu /yeşil burun akıntısı gibi durumlarda ise %41-48' inin antibiyotik kullanımına başvurdukları görülmüştür (Yaşar, 2019). Birinci basamak ve hastanelerde çalışan bütün hemşirelere bu bilinçlendirme konusunda önemli görevler düşmektedir. Özellikle pediatri hemşireleri karar verme mekanizmaları gelişmekte olan çocuklar için savunucu rolleri başta olmak üzere bütün rollerini aktif bir şekilde kullanmalı ve çocuklar için optimal bakımı sağlamalıdır. Pediatri hemşireleri sağlıkta sürdürülebilirlik için bakımın devamlılığını benimsemeli ve bakımda aile merkezli bakımı tercih etmelidirler (Hazır & Bozkurt, 2020).

1. Nazofarenjit

Nazofarenjit, çocukluk döneminde sıklıkla soğuk algınlığı olarak ifade edilen, üç aydan başlayarak üç yaşa kadar olan çocuklarda sık görülen hastalıktır. Hastalık tüm yıl boyunca görülse de diğer solunum sistemi hastalıkları gibi kış aylarında hastalığın insidansı artış göstermekte ve çocuklar yıl içerisinde 5-8 kez nazofarenjit olabilmektedirler (Akşit, 2002).

1.1. Etiyoloji

Nazofarenjitin etiyojisinde %80 virüsler yer almaktadır. Hastalıkta 200' den fazla virüs çeşidi etyoloji olarak gösterilse de en sık rinovirüsler karşımıza çıkmaktadır. Rinovirüs haricinde hastalıkta, respiratuar sinsitiyal virüs, adenovirüs, influenza virüsler, coxsackievirüsler ve parainfluenza virüsler de etyoloji

olabilmektedirler. Bakteriyel nazofarenjit etyolojisinde ise en sık A grubu streptokoklar olmak üzere, korinobakteriyum difteri, mikoplazma pnömoni, nayseria menenjit, nayseria gonore yer almaktadır (Ertuğrul & Tanman, 2002; Erol & ark., 2017).

1.2. Fizyopatoloji

Nazofarenks bölgesi nazal kavite kökünde yer alırken yumuşak damak ve kafatası ile de sınırlandırılmaktadır. Nazofarenks ve çevre dokularda görülen enflamasyonla birlikte submukozada ödem ve vazodilatasyon da görülmektedir. Ödem sebebiyle nazal konjesyon, sekresyonların hava akımına engel olması ile de nefes alıp vermede güçlük görülmektedir (Conk & ark., 2018).

1.3. Klinik belirtiler

Hastalıkta birçok belirti görülebileceği gibi aşağıdaki belirtiler sıktır:

- Burun tıkanıklığı,
- Rinitis,
- Hapşırma,
- Nazal akıntı,
- Öksürük,
- Ateş (Üç güne kadar devam edebilmektedir),
- Boğaz ağrısı,
- Huzursuzluk ve keyifsizlik.

Hastalık bebeklerde emmeyi engelleyecek kadar sık nazal obstrüksiyon gelişmesine sebep olmaktadır. Daha büyük çocuklarda

ise burun ve farenks bölgesinde kuruluk, irritasyon görülmesi hastalığın başlangıç belirtilerindendir. Ardından birkaç saat içerisinde aksırma, ürperme hissi, kas ağrıları, burun akıntısı, öksürük görülmeye başlamakta ve zaman zaman bu şikâyetlere baş/boğaz ağrısı, iştahsızlık, hafif ateş belirtileri de eşlik etmektedir. Hastalıkta akut dönem 2 ila 4 gün devam ederken aynı zamanda hastalığa bağlı ishal ve kusma da görülebilmektedir (Akşit, 2002; Törüner & Büyükgönenç, 2017; Hay & ark., 2020; Carlo, 2021).

1.4. Tanı

Nazofarenjitin tanılanmasında fizik muayenenin yapılması ve hastanın öyküsü yeterli olmaktadır. Lökosit sayısı ve ateşi normal sınırlarda seyreden çocuklarda hastalıkla ilgili yukarıda değinilmiş olan bulguların varlığı tanı koymada yeterlidir (Akşit, 2002).

1.5. Tedavi

Spesifik bir tedavisi bulunmayan viral nazofarenjit hastalığında zaman zaman antibiyotik kullanılmaktadır. Fakat viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımının etkisizliği ve doğru olmadığı Sağlık Bakanlığı' nca (SB) bildirilmektedir. Antibiyotiklerin yanlış kullanımı maddi kayıplar ve antibiyotik direnci gelişmesine de zemin hazırlamaktadır (SB, 2020). Antihistaminik ilaçların zaman zaman nazofarenjitin tedavisinde kullanıldığı görülse de mukoz membranlarda kuruluğa sebebiyet verdiği için kullanımı önerilmemektedir. Hastalığın verdiği rahatsızlıklar ve özellikle ateşi düşürme amaçlı antipiretik ilaçlar kullanılmaktadır. Bebek ve çocuklarda tuzlu burun damlalarının rahatsızlık süresince 3-4 saatte bir tekrarlı kullanımı nazal konjesyonu azaltmaktadır. Özellikle bebeklerde beslenme öncesinde

bu işlemin gerçekleştirilmesi emzirme işlemini kolaylaştırmaktadır. Çocuklarda beslenme öncesi öksürüğü baskılamak için de öksürük baskılayıcı ajanlar kullanılabilmektedir (Törüner & Büyükgönenç, 2017; Flibotte & Gokulakrishnan, 2018).

1.6. Nazofarenjit, faranjit ve sinüzitte hemşirelik girişimleri

Nazofarenjit takip ve tedavinin sıklıkla evde sürdürüldüğü bir solunum sistemi rahatsızlığıdır. Bu sebeple hasta çocuğun ihtiyaç duyacağı bakım ve girişimlerin uygulayıcıları ebeveynler olacağı için, hemşireler sıklıkla eğitim ve danışmanlık üzerine odaklanmalıdır. Bu süreçte pediatri hemşireleri çocuk ve aileyi kapsamlı bir şekilde tanımlanmalı, ihtiyaç ve imkana yönelik bir eğitim planlanmalıdır. Eğitim esnası ve sonrasında aile hastalık ve bakımla ilgili sorular sormada cesaretlendirilmelidir. Eğitim planlanırken nazofarenjitli bir çocuğa ait toplanması gereken bilgiler:

- Çocuğun semptomlarının başlama süresi, sıklığı, derecesi ile ilgili bilgiler,
- Çocuğun beslenme ve sıvı alım durumu,
- Ateş ve öksürük varlığının sorgulanması,
- Nazal sekresyonun durumu, rengi ve derecesi,
- Solunum distresinin sorgulanmasıdır (Conk & ark., 2018).

Eğitimci ve danışman rolü ile bir hemşire, aşağıdaki bilgiler ışığında eğitimi yürütür ve geri dönüt doğrultusunda danışmanlığı sürdürür:

- Küçük bebeklerde burun solunumu gerçekleştirildiği için özellikle beslenme öncesi burun temizliğinin yapılması önemlidir. Beslenmeden/emzirmeden 15-20 dk öncesinde serum fizyolojik damlatıldıktan sonra aspirasyon işlemi gerçekleştirilerek burun temizliği sağlanabilir.
- Sekresyonların drenajı ve solunumun rahatlatılması için uygun yataş pozisyonu ayarlanmalıdır.
- Bebek/çocuklarda dehidratasyonun önlenmesi ve sekresyon atılımının kolaylaştırılması için yeterli sıvı alımı planlanmalıdır. Sıvı alımı arttırılırken aynı zamanda AÇT (Aldığı çıkardığı takibi) yapılmalıdır.
- Solunum fonksiyonlarında güçlük görülmesi halinde evde uygulanabilecek buhar yöntemleri ile ilgili bilgi verilmelidir.
- Çocuk eğitimi algılayabilecek yaşta ise hijyen eğitimi verilmelidir. Mümkün mertebe tek kullanımlık eşyalar ya da kişiye özel kullanımı olan eşyalar (kağıt havlu, havlu, sabun vs.) bu dönemde tercih edilmelidir.
- Çocuk kreş veya okula gidiyorsa hastalık süresince bulaş riskinden dolayı okula ara verilmelidir.
- Ateş varsa; ailelere ateş takibinin nasıl yapılacağı, müdehale edilmesi gereken sınırlar, ateşin yükseldiği zamanlarda yapılması gereken girişimler, uzmana başvurulması gereken durumlarla ilgili bilgilendirme yapılmalıdır.

- Aile ile iletişim içerisinde, ihtiyaçlar ve geri dönütler doğrultusunda danışmanlık verilmelidir (Çavuşoğlu, 2013; Törüner & Büyükgönenç, 2017).

Nazofarenjit sıklıkla viral kaynaklı geliştiği için tedavide antibiyotik kullanımı gerektirmemektedir. Çocuklarda görülen solunum sistemi hastalıklarında kullanılabilecek antibiyotik tedavisi için ebeveynlerin tutum ve davranışlarına yönelik değerlendirme yapan bir çalışmada; ebeveynlerin %81 gibi büyük bir çoğunluğunda, antibiyotik kullanımına ilişkin tedaviyle ilgili bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu, ebeveynlerin bi çoğunun antibiyotik kullanımı gerekmediğini düşünmelerine rağmen, yarısına yakınının halen grip / soğuk algınlığı gibi durumlarda antibiyotiğe başvurduğu görülmüştür (Yaşar, 2019). Bu çalışmada da görülmektedir ki ebeveynlerin nazofarenjit gibi üst solunum yolu hastalıklarının tedavileri konusunda bilgi eksiklikleri bulunmaktadır. Pediatri hemşireleri çocukta uygun tedaviyi desteklemek için ebeveynlere yönelik eğitimler planlaması ve uygulaması da gerekmektedir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında kanıta dayalı uygulamaları değerlendiren bir çalışmada; korunmada ekinazya, probiyotikler ve çinkonun etkili olduğu, vitamin C' nin koruma amaçlı kullanımında mega dozlar gerektirdiği için önerilmediği ve semptom başlangıcı sonrasında yararlı olmayacağı, sarımsakla ilgili gerçekleştirilen çalışmaların ise yetersizliğinden dolayı kanıtın bulunmadığı fakat korunmada etkili olabileceği, çinkonun ise semptomlar başladıktan sonra görülme sürelerini kısaltabileceği konusunda etkinliği belirtilmektedir (Akan, 2012). Pediatri hemşireleri araştırmacı rolleri ile alanda yapılan çalışmaları takip etmeli, sürekli olarak alandaki bilgilerini güncelleyerek kanıta dayalı uygulamaları bakıma

dahil etmelidirler. Bu tarz kanıta dayalı uygulamalar konusunda ekibi koordine ederek uygulamada bütünlüğü de sağlamalıdır (Çavuşoğlu, 2013).

2. Tonsillit ve Farenjit

Viral ajanların sıklıkla etyolojide yer aldığı tonsilla ve farenks alanlarında görülen enflamasyon oluşumu sırasıyla tonsillit ve farenjit olarak isimlendirilmektedir. Tonsillit ve farenjit gibi hastalıklar, çocuklarda bir arada sık görüldüğü için zaman zaman tonsillofarenjit ismiyle de tanımlanabilmekte ve çocukluk dönemi solunum sistemi hastalıkları arasında en sık rastlanılan hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple bu bölümde tonsillit ve farenjite aynı başlık altında yer verilmiştir (Tezer & Demirdağ, 2018).

2.1. İnsidans ve etiyoloji

Tonsillit ve farenjit hastalıklarının görülme sıklıkları sonbahar ve kış mevsimlerinde artış göstermektedir. Hastalık etkeni olarak virüsler, bakteriler ve diğer nonbakteriyel ajanlar karşımıza çıksa da sıklıkla A grubu beta hemolitik streptokoklar bu hastalığın sorumluları olarak gösterilmektedir. Bakterinin eşlik ettiği tonsillit veya farenjit hastalıklarında, etkin tedavinin sağlanamazsa akut glomerülonefrit, akut romatizmal ateş, pnömoni gibi daha ciddi ve kompleks sağlık sorunlarına yol açabilmektedir (Hızlı & Altay, 2019).

2.2. Fizyopatolojisi

Çocuklar farengeal kavitede lenfoid dokularının daha büyük olmasından dolayı yetişkinlere nazaran tonsillite daha yatkındır, bu durum da onların daha sık solunum yolu hastalıkları

geçirmelerine sebebiyet vermektedir. Tonsiller vücut giriş noktası olan orofarenkste bulunan, hastalık etkeni olabilecek mikroorganizmaların vücuda girişini önlemekte görevli dokudur. Bu bölgede görülen enfeksiyon ve enflamasyon durumları tonsillit olarak isimlendirilmektedir. Sindirim ve solunum sistemlerinin ortak dokusu olan farenksin enfekte olması durumu ise farenjit olarak tanımlanmaktadır (Koçyiğit & ark., 2016).

2.3. Klinik belirtiler

Tonsillit ve farenjit hastalıklarının belirtileri etkene göre değişebilmektedir. Etiyolojide de sıklıkla karşımıza çıkan bakteri kolonizasyonu kaynaklı tonsillit ve farenjit hastalıklarında; ani başlangıçlı boğaz ağrısı ve yutma zorluğu, ateş, kusma, baş ve karın ağrısı, tonsillofarengeal inflamasyon ve buna bağlı kızarıklık, ön servikal bölgede lenfadenopati gibi belirtilerin ortaya çıkmasına sebep olabilirken bazı olgularda da kızıl döküntüsünün görülebileceği belirtilmektedir. Bakteriye nazaran etiyolojide daha az gördüğümüz virüs kaynaklı tonsillit ve farenjite ise; burun akıntısı, öksürük, burun tıkanıklığı/horlama, konjonktivit, diare, ülseratifstomatit ve viraleksantemler gibi belirtilerle kendisini gösterebilmektedir (Tezer & Demirdağ, 2018; Ünüvar & Göl, 2018; Hızlı & Altay, 2019).

2.4. Tanı

Tonsillit, farenjitin tanılanma sürecinde sıklıkla muayenedeki tonsilla, farenksin görünümü ve hastalığa ait semptomlar yeterli görülmektedir. Fakat streptokok ve streptokok dışı tonsillit veya farenjit hastalığına ait ortak klinik bulguların varlığı semptom ve fizik muayene bulgularını yetersiz kılmakta ayırıcı tanı için ayrıca

tanısal testlerin yapılması önerilmektedir. Bu gibi durumlarda boğaz kültürü, hızlı antijen ve Anti Streptoizin o, Anti Dnaaz testleri ayırıcı tanıda kullanılabilir (Tezer & Demirdağ, 2018; Hızlı & Altay, 2019).

2.5. Tedavi

Tedavide öncelikli olan hastalığının etkeninin tanımlanmış olmasıdır. Viral etkenlerde antibiyotığın gereksiz, hatalı kullanımı ve direnci gibi durumlar gelişebileceği için destekleyici bakım tedavisi önceliklidir. Bakteriyel etkenlerde ise erken antibiyotik tedavisi ile semptomların düzeltilme süresi 24-48 saate çekilebilmektedir. Çocukların özellikle akut romatizmal ateş gibi hastalıklardan korunması için semptomların ilk dokuz gününde uygun antibiyotik tedavisine başlanması gerekmektedir (Hızlı & Altay, 2019).

Tedavide etkinliği kanıtlanmış ve en sık rastlanılan antibiyotik oral penisilindir. Tanımlanmış alerjisi bulunmayan çocuklarda 10 güne tamamlanan oral penisilin tedavisi etkin başarı sağlamaktadır. Penisilin alerjisi öyküsü olan çocuklarda ise alternatif olarak, amoksisilin, sefalosporinler (birinci kuşak), oral klindamisin ya da klaritromisin ilaçları da 10 gün süreyle kullanılabilir fakat en güçlü alternatifin %1 dirençle klindamisin olduğu bildirilmektedir. Daha kısa süreli tedavi istenildiği durumlarda ise Sefpodoksim ve sefdinir ilaçları beş günlük tedavi şeklinde kullanılabilir (Ünüvar & Göl, 2018). Semptomların sıklık ve şiddetini düşürmede destek tedavi önerilmekte ve tıbbi olarak nonsteroidantiinflamatuvarlar ve asetaminofen grubu ilaçlar kullanılabilir. Analjezik ve antipiretik olarak aspirinin

kullanımı, destek amaçlı kortikosteroidlerin kullanımı önerilmemektedir (Hızlı & Altay, 2019).

2.6. Hemşirelik girişimleri

Tonsillitte çocuğun rahatını sağlamak, hastalığın semptomlarını hafifletmek, operatif bir durum varsa kanama kontrolü, preoperatif ve postoperatif bakımlar hemşirelik girişimlerinde esastır. Müköz membranın nem dengesini koruyarak solunumu desteklemek amaçlı soğuk buhar uygulaması yapılabilir. Gargaralarda ılık tuzlu su, boğaz pastili, farmakolojik olarak aneljezik/antipiretik ve kodein grubu ilaçların kullanımı fayda sağlayabilmektedir. Operatif durumlarda prosedürler gözden geçirilmeli, fiziki değerlendirme yapılmalı, çocuğun operasyona hazırlamak için uygun girişimlerde bulunulmalıdır. Tonsillektominin preoperatif döneminde kanama eğilimini değerlendirmek amacıyla kanama ve pıhtılaşma zamanları öğrenilmelidir. Operasyon öncesi çocuk iletişime uygun bir yaşta ise kendisini ifade etmesi sağlanarak psikolojik olarak ihtiyaçları belirlenmelidir. Bütün sürece aile de dahil edilerek, anlaşılır şekilde ve gerektiği kadar müdahaleler açıklanmalıdır (Törüner & Büyükgönenç, 2017).

Postoperatif dönemde çocuğa verilecek pozisyonlar önem arz etmektedir. Vücut için prone ve baş için ise lateral pozisyonlar, operasyon sekresyonların drenajını kolaylaştırmak için fayda sağlayacaktır. Çocuk kendine geldiğinde dik oturur pozisyonda ve yatakta takibinin yapılması önemlidir. Aspirasyon gerekli görüldüğü durumlarda ve yüzeysel olarak gerçekleştirilmeli, nazofarenksi yaralayabilecek her türlü travmatik uygulamadan kaçınılmalıdır. Kanama bulguları sık sık kontrol edilmeli ve kanamaya sebep

olabilecek uygulamalardan kaçınılmalıdır. Postoperatif dönem ilk bir saat için daha sık değerlendirme yapılmalıdır ve bu değerlendirme her 15 dk' da bir şeklindedir. Devamındaki dört saat için ise saatte bir değerlendirme yapılırken, bir sonraki 24 saat içinse 2 ya da 4 saatte bir yaşam bulguları değerlendirilmelidir (Çavuşoğlu, 2013). Postoperatif dönemde çocuğun sık öksürmesi ve hapşırması insizyon bölgesinde zedelenme ve kanama risklerini artıracığından hemşire bu konuda çocuk ve aileyi uyarmalıdır. Kanamanın kontrolü hemşire tarafından yapılmalı fakat aileye de taze kan bulgularının takibi konusunda eğitim verilmelidir. Kanama durumunda çocuk ve aile sakinleştirilmeli ve hızlı bir şekilde doktora haber verilerek gerekli müdahalelerde bulunulmalıdır. Postoperatif dönemde sıvı ve yumuşak besinlerden oluşan bir diyetin uygun olduğu belirtilmektedir (Topal Hançer & Yılmaz, 2019). Özellikle soğuk ve asitsiz sıvıların bol tüketimi hidrasyonun sürdürülmesinde kanama riskinin düşürülmesinde etkilidir. Soğuk su, küçültülmüş buz parçaları, tatlandırılmış buzlu çubuklar çocuklara yaklaşık üç hafta verilebilir. Verilen içeceğin kırmızı renkte olmamasına kanamayı ayırt etmeyi zorlaştıracığından dolayı dikkat edilmelidir. Ağrı düzey değerlendirmesi yapılmalıdır. Gerekli görüldüğü durumlarda doktor tarafından order edilmiş analjeziklerin uygun kullanımı sağlanmalıdır. Acil durumlarda gerekli olabilecek malzemelerin kontrolleri sağlanmalı ve müdahale için hazır tutulmalıdır (Conk & ark., 2018).

Tonsillektomi operasyonu geçirmiş çocuklarda sade süt ve ballı sütün, 15 gün süresince uygulanmasının yara üzerindeki etkisini araştırmış bir çalışmada, çocuklara uygulanan ballı sütün kanama riski ve ağrının azaltılmasında, yara iyileşme sürecinin

desteklenilmesinde etkili bir yöntem olduđu tespit edilmiştir (Topal Hançer & Yılmaz, 2019). Alan çalışmalarının özellikle de kanıta dayalı uygulamaların kliniğe entegrasyonu ile ilgili çalışmalarda pediatri hemşirelerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu süreçte ekiple iş birliği içerisinde uygulamalar güncellenmeli ve geliştirilmelidir. Farenjit ve nazofarenjitte uygulanan hemşirelik girişimlerinin benzerliğinden dolayı bir bütün olarak ele alınmış ve bu bölümde ayrıca yer verilmemiştir (Bkz. sayfa, 6-7)

3. Otitis Media

Otitis media orta kulakta görülen, akut, effüzyonlu ve kronik olmak üzere üç bölümde incelenen, orta kulağın enflamasyonlu hastalığıdır. Enflamasyonda akut ve kronik seyirli olarak hastalık gözlemlenirken, vakalarda enfeksiyöz, nonenfeksiyöz, effüzyonlu ya da effüzyonsuz durumlar da görülebilmektedir. Akut otitis media, ani başlangıçlı ve kısa süreli olacak şekilde östaki borusundan orta kulağa patojenlerin yayılımı ile görülmektedir. Kronik otitis media vakalarında hastalığın üç aydan daha uzun sürelerle devam etmesi beklenmektedir. Effüzyonlu otitis media timpanik membran arkasında enfeksiyon belirtisine rastlanmaksızın sıvı toplanma alanlarının ve enflamasyonun görülmesi durumudur (Koçyiğit & ark., 2016).

3.1. İnsidans ve etiyoloji

Çocuklarda otitis media hastalığı için insidansın özellikle 6-18 ay arası bebeklerde artış gösterdiği belirtilmektedir. Aynı zamanda bebeklerin %90' ının iki yaşına gelene kadar en az bir kez hastalığı geçirmiş oldukları belirtilmektedir. Yaşamın ilk altı-24 ay arası döneminde bebeğin; ilk aylarda emzirilmemiş olması, ev dışı

ortamda bulunması, etnik kökeni, sigara dumanı maruziyeti, emzik kullanma, alta yatan alerjik rinit gibi bir patojen varlığı, yarık damak ve down sendromu bulunması gibi durumların otitis media hastalığı için riski arttırdığı belirtilmektedir (Öncel, 2009; Uğurlu & ark., 2014).

Otitis media hastalığının bakteriyel etyolojisinde, *Streptococcus pneumoniae* (%40-50) sıklıkla görülürken, tiplendirilemeyen *Haemophilus influenzae* (%30-40) ikinci ve *Moraxella catarrhalis* (%10-15) ise üçüncü görülme sıklığıyla karşımıza çıkmaktadır. Otitis mediada nadir olarak *Staphylococcus aureus*'a ve anaeroplarda görülebilmektedir. Büyük çocuklarda A grubu streptokoklar sık görülürken aynı zamanda perforasyon ve mastoiditle de ilişkili olabileceği bulunmuştur. Yenidoğanlar ve bağışıklığı baskılanmış çocuklarda kronik süperatif otitis media görülme sıklığının oldukça fazla olduğu ve dikkatli olunması gerektiği bildirilmektedir (Ramakrishnan & ark., 2007).

3.2. Fizyopatoloji

Çocuk ve yetişkinlerde solunum sistemi farklılıkları kısmında da bahsedildiği üzere çocuklarda özellikle üç yaşa kadar östaki borusunun anatomik yapısı kısa ve geniş olması, horizontal durum, destekleyici kıkırdak yapının gevşekliği gibi durumlar otitis medianın görülme sıklığını arttırmaktadır. Enflamasyon süreci orta kulak içerisinde eksuda toplanmasını tetiklemektedir. Akışkan olmayan bu sıvı patojen kolonizasyonu için yardım ederken aynı zamanda ses iletimini de engeller. Genişlemiş lenfoid dokular orta kulaktan drenaj akıntı sistemleri tıkayarak akışı engelleyebilir. Östaki borusunda meydana gelen tıkanıklıklar onun denge görevini sürdürmesini engelleyebilir. Otitis media kısa sürelerde tedavisi

gerçekleştirilmediğinde, özellikle kanallardaki tıkanıklıklarla birlikte timpanik membrana da zarar verebilmektedir (Koçyiğit & ark., 2016; Carlo, 2021).

3.3. Klinik Belirtiler

Otitis media özellikle küçük çocuklarda sık görülmesi nedeniyle semptomları çocuk tarafından yetersiz ifade edilebilmektedir. Hastalığın en spesifik bulgusu kulak ağrısı iken, konuşamayan çocuklarda sık sık kulak çekiştirme veya kulağı ovalama hareketleri de bu ağrının birer göstergesi olarak sayılabilmektedir. Hastalığa sıklıkla ateş, huzursuzluk, diyare ve kusma gibi semptomlar eşlik etmekte, zaman zaman kulakta akıntı da görülebilmektedir (Uğurlu & ark., 2014).

3.4. Tanı

Otitis media hastalığında otoskopik muayene yapılmaktadır. Muayene esnasında kulak zarına ilişkin değerlendirmelerde, bombeli görünüm, zar arkasında kabarcıklar, hava-sıvı seviyesi görülmesi veya zar hareketlerinde azalma görülebilirken aynı zamanda ağrı varlığı da otitis media hastalığını düşündürmektedir. Kulak zarının hareketlerinde azalma varsa tespiti içinse pnömatik otoskopi yapılması gerekebilmektedir (Öncel, 2009).

3.5. Tedavi

Tedavide, yakınmaların giderilmesi, komplikasyonlar ve kalıcı işitme kaybının önlenmesi olmak üzere başlıca üç esas bulunmaktadır. Çocuklarda ağrı belirgin olduğu için tedavide ilk amaç kulak ağrısının giderilmesidir ve bu amaçla parasetamol, ibuprofen kullanılabilir. Hastalığın riskleri ve hızlı ilerleyişinden dolayı iki yaşından küçük çocuklarda semptomatik tedavi yeterli

olmamakta ve antibiyotikler de tedaviye eklenmektedir (Hay & ark., 2020). Antibiyotik tedavisinde sıklıkla amoksisilin, amoksisilin ve klavulonik asit kombinasyonu, hastalığın seyrine göre ikinci ya da üçüncü kuşak sefalosporinler, klaritromisin, azitromisin gibi yeni grup makrolidler ve TMP-SMX tercih edilebilmektedir. Otitis media sıklıkla solunum sistemi enfeksiyonları ile bir arada görüldüğü için tedaviye topikal dekonjestanlar 5 günü aşmamak kaydıyla dahil edilebilmektedir. Nazal ve sistemik dekonjestanlar hastalık üzerinde etkinliklerinin bulunmaması nedeniyle tedavide kullanılmamaktadır (Koçyiğit & ark., 2016).

3.6. Hemşirelik girişimleri

Otitis mediada çocuğa yönelik hemşirelik girişimlerinin temel amaçları;

- Ağrının hafifletilmesi,
- Drenajın mümkün mertebe kolaylaştırılması,
- Komplikasyon ve tekrarların önlenmesi,
- Çocuk bakımı için tespit edilen eksiklikler yönünde aileye yönelik verilecek olan eğitimlerin verilmesi,
- Çocuk ve aileye özellikle duygusal yönde destek sağlamaktır (Çavuşoğlu, 2013).

Otitis media tedavisi genellikle evde bakımla sürdürülmekte, hastalık esnasında hospitalizasyonu gerektirmektedir. Bu sebepten bakım daha çok aileye yönelik verilecek eğitimleri içerirken, eğitimler de yukarıda değinilmiş olan kriterler çerçevesinde sağlanmalıdır. Otitis mediada ağrının giderilmesi çocuk ve bakım veren kişiler için önceliklidir. Ağrının giderilmesinde tedavi için

reçete edilmiş olan aneljezik ilaçların doğru kullanımı bilinmelidir. Ağrının giderilmesinde uygun pozisyonun verilmesi katkı sağlamaktadır. Başın yükseltilmesi ve Semi-fowler pozisyonu etkilenmiş olan bölgenin yukarıda tutulması için kullanılmaktadır. Aynı zamanda başın pozisyonunda etkilenmemiş olan kulak bölgesinin üzerine pozisyonu sağlamak basıncı azaltacağından ağrıyı minimize edecektir (Koçyiğit & ark., 2016). Bakımda kullanılan bu pozisyonlar otitis mediada drenajın sağlanması için de etkilidir. Çocuklarda hastalık döneminde ağrı kaynaklı olarak sıklıkla iştahta azalma görülmektedir. Ağrının minimize edilmesi, çocukta konforun artırılmasının yanı sıra, hidrasyonun sürdürülebilirliği için de bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastalık dönemi beslenmede çocuğun sevdiği yiyeceklere öncelik tanınırken, beslenmenin sık aralıklarla yapılması ve bol sıvı alımı üzerine süreç kurgulanmalıdır. Biberonla beslenen bebeklerde, beslenme esnasında verilen pozisyonun aspirasyon riskini minimize etmesi gerekmektedir. Bu sebeple çocuk beslenirken başın yükseltilmesi gerekmektedir. Tedavide reçete edilmiş olan antibiyotiğin düzenli kullanımı ile ilgili aileye eğitim düzenlenmeli aynı zamanda hidrasyon sağlamanın ilaç kullanımı dönemindeki önemi de vurgulanmalıdır. Çocukta gelişmiş otitis media komplikasyonları ve hastalığın sık tekrarı varsa bunun nedenleri sorgulanmalı ve aileye bu konuda da bir eğitim planlanmalıdır. Bu süreçte aile bakım için desteklenmeli ve aileye duygularını rahatça ifade edebilecekleri ortamlar sağlanarak duygusal destek de sürdürülmelidir (Conk & ark., 2018).

Bebeklerde beslenme tipi ve otitis mediaya yönelik gerçekleştirilmiş olan bir çalışmada; emzirilen ve biberonla beslenen

bebekler deęerlendirilmiř, emzirilen bebeklerde otitis media g r lme riskinin daha d ř k olduęu bildirilmiřtir. Emzirilen bebeklerde; emme sırasında uygun dil hareketinin geliřmesi, aspirasyon riskini minimize edecek uygun pozisyonun verilmesi ve anne s t n n baęıřık destekleyici imm n fakt rleri i eriyor olması otitis media hastalığının g r lme riskini d ř ren sebepler olarak bildirilmektedir (Yıldız & Canbulat, 2008). Anne s t  ve etkili emzirmenin  nemi saęlık bakanlıęımız tarafından s rekli olarak vurgulanmakta ve desteklenmektedir. Pediatri hemřireleri de aldıkları eęitimler doęrultusunda kliniklerde uygulamaları ger ekleřtirmektedirler. Emzirmenin otitis media ile olan iliřkisi konusunda da pediatri hemřireleri farkındalıklarını arttırarak aileyi de bu konuda bilgilendirmelidirler (T r ner & B y k nen , 2017).

4. Krup

Krup hastalığı akut bařlangı lı,  st solunum yolunu etkileyen, etkilenen b lgede tıkanık nedenleri arasında g sterilen nefes alma sırasında stridor ve solunum alanında zorlanma ile karakterize bir hastalıktır. Etkilenen b lge sıklıkla larenks ve trakea olduęu i in ses tellerindeki etkilenmeye baęlı havlar tarzda  ks r k ve seste kabalařma, akut, enfeksiy z s re lerden oluřan heterojen bir grubu ifade etmekte ve sıklıkla viral kaynaklı olarak karřımıza çıkmaktadır. Hastalıktan etkilenen b lgeye g re hastalığın tipleri; akut laringotrakeit, akut laringotrakeobronřit, laringotrakeobronkopnomoni ve spazmodik kruptur (Cherry, 2008).

4.1. İnsidans ve etiyoloji

Krup beř yařına kadar g r lebilen fakat sıklıkla 6-36 ay arasındaki  ocukları etkilendięi bir rahatsızlıktır (Cherry, 2008). Altı

yaş altındaki çocuklarda görülen krup için yıllık insidans %6 olarak verilmektedir. Çocukluk döneminde görülen solunum yolu enfeksiyonlarının %15'i, evde takip ve izlem gerektiren hastaların ise %1-5'i krup geçiren çocuk hastalardan oluşmaktadır. Özellikle sonbahar aylarında sık görülen hastalığın ailede krup öyküsü olanlarda ve ailede tekrarlayan krup hastalığı bulunan olgularda görülme sıklıklarının sırasıyla 3.2; 4.1 oranlarındadır (Woods, 2020).

Etyolojisinde sıklıkla viral ajanların yer aldığı krupta, yüksek ateş ve solunum yollarına ilişkin semptomlarla hastaneye başvuran beş yaş altı çocuk hastalarda %75-90 oranında viral ajan olarak parainfluenza tip 1 ve 2 görülmüştür. Etyolojide herpes simpleksin yer aldığı vakalarda hastalığın daha uzun seyirli olduğu ve bu tip uzamalarda etyolojide RSV, rhinovirüs, adenovirüs, human coronavirüs, enterovirüs ve metapnomovirüsler de görülmektedir (Schomacker & ark., 2012).

4.2. Fizyopatoloji

Hastalıkta enflamasyon süreci görülmekte ve bu enflamasyon sürecinin ortaya çıkışı mukoza ödemi, sekresyon ve kas spazmı ile olmaktadır. Çocuklarda hava yollarındaki immatürlük ve hava yollarının dar lümenli olması durumu hava yolu obstrüksiyonunu tetikleyen nedenlerdendir. Kas spazmı ve ödem görülmesi ile birlikte glottis oldukça duyarlı bir yapıya dönüşebilmekte, böyle bir durumda kollaps tetiklenebilmektedir. Krupla ilişkili olarak gerçekleşen inspirasyon sırasındaki stridorun özellikleri sebebiyle inspirasyon sırasında türbülans obstrüksiyon gerçekleşmektedir (Woods, 2020).

4.3. Klinik belirtiler

Krup rahatsızlığında klinik belirtiler; genel görünüm, dolaşım ve solunum sistemleri alanlarında olmak üzere üç bölümde ortaya çıkmaktadır. Genel görünüme ait bulgular; tonus, görünüm (bakış), konuşma (ağlama), etkileşim ve letarjiye yönelik belirtiler görülmektedir. Solunum sistemine ait bulgular; özellikle stridor ve havlar tarzda öksürük başta olmak üzere, burun kanadı solunumu, takipne ve yardımcı solunum kası kullanımı şeklindedir. Dolaşım sistemine ilişkin bulgulara ise; solgunluk ve siyanoz gibi belirtilere rastlanabilmektedir. Orta ve ağır krup görülen çocuklarda, solunum ve nabız sayısında artış, sakinken stridor, trakeal ve interkostal çekilmeler ve pulsus paradoksus belirtileri de görülebilmektedir. Solunum sıkıntısı varlığında çocukta ağlamanın da olmaması durumu klinik seyrin ciddiyetini göstermektedir. Krup çok sık komplikasyon göstermezken orta ve ağır seyirli vakalarda ise hipoksemi ve solunum yetmezliği gibi riskler bulunmaktadır (Flibotte & Gokulakrishnan, 2018).

4.4. Tanı

Krup hastalığının tanılanmasında öncelikli işlemler çocuğun öykü ve fizik muayene bulgularının alınması şeklindedir. Sıklıkla viral etyolojilere bağlı olarak gelişen hastalığın tanılandırılmasında, kültür alınması, sitolojik değerlendirmeler, immunolojik test ve moleküler yöntemler kullanılmaktadır. Krup hastalığı klinik atipik ise, yabancı cisim aspirasyonu ihtimal dahilindeyse, çocukta tekrarlı krup öyküsü varsa veya tedaviye beklenen cevap alınamıyorsa radyografik görüntülemeye başvurulabilmektedir. Krup hastalığına sahip çocukların yarısında radyografik bulgulara rastlanılmaktadır. Dört aylıktan daha küçük bebeklerde ve çocuklarda anatomik

değerlendirme amaçlı görüntüleme yöntemlerine başvurulduğu görülmektedir (Duman, 2007).

4.5. Tedavi

Kruplu çocuklarda havayolu tıkanıklığının ağırlık derecesinin belirlenmesi, solunumun rahatlatılması tedavide önceliklidir. Genel durumu iyi olan ve evde takibi gerçekleştirilen hafif solunum yolu tıkanıklığı olan çocuklarda kortikosteroid kullanılsa da bu kullanımın gerekliliği ile ilgili çelişkiler de bulunmaktadır. Orta derecede solunum yolu tıkanıklığı, sakinken stridor, yardımcı solunum kaslarının kullanılması ve interkostal çekilmeler, taşikardi gibi belirtileri olan çocuklar hastanede ve tek doz oral kortikosteroid kullanılarak tedavileri gerçekleştirilmektedir (Taştan, 2003). Ağır derecede solunum yolu tıkanıklığı olan çocuklarda korku, endişe, huzursuzluk, bilinç değişikliği, solukluk, siyanoz bulgulara görülebilmektedir. Bu çocukların solunumları da desteklenerek kortikosteroid, adrenalin ve oksijen gibi tedaviler uygulanmaktadır. Solunum sıkıntısı derinleşir ise tedaviye entübasyon işlemi gerçekleştirilerek devam edilmektedir. Krup tanısı almış çocuklarda atak şeklinde gelişen öksürükler ve laringeal alandaki ödemin azaltılması amacıyla soğuk buhar tedavisi de kullanılmaktadır (Duman, 2007). Soğuk buhar tedavisinin krupta kullanımının yarar sağladığı düşünülmesine rağmen kanıta dayalı gerçekleştirilmiş bir çalışması mevcut değildir. Nemli çadır uygulamalarında çocuklar ıslaklık, soğukluk, aileden ayrı kalma gibi durumlardan rahatsız olabileceği bu durum da tedavinin seyrini olumsuz yönde etkileyebildiği tartışılmaktadır. Nemli rezervuarlarda bakteri üreme riskinin yüksek olması ve nemlendirilmiş havanın solunum direncini

arttırması da uygulamada söz edilen olumsuzluklardandır (Conk & ark., 2018).

4.6. Hemşirelik girişimleri

Çocuklarda krup hastalığında öncelikli olan hemşirelik girişimleri özellikle solunumun durumuna yönelik iyi bir gözlemin yapılmasıyla başlamakta ve;

- Hava yolu açıklığının sürdürülmesi
- Sıvı dengesini / hidrasyonu sağlamak
- Korku ve anksiyeteyi gidermek
- Evde çocuğun bakımını sağlayabilmeleri için aileyi hazırlamak ve onlara destek olmayı içermektedir.

Hava yolu açıklığının sürdürülmesi için, bebek veya çocuğa nefes alıp vermeyi kolaylaştıracak uygun pozisyonun verilmesi gerekmektedir. Küçük bebek ve çocuklarda baş omuzla birlikte ince bir yastıkla desteklenmesi gerekirken büyük çocuklarda semi fowler ya da fowler pozisyonları verilebilir. Hava yollarının temizliği sağlandıktan sonra nemlendirilmiş oksijen tedavisi verilmelidir. Mukoza kuruluşunun önlenmesi ve nefes alıp verilisinin daha rahat sürdürülmesi adına nemlendirme önemlidir. Hidrasyonun sürdürülmesi için bebeklerde, solunumda sıkıntılı bir durum oluşmadığı sürece emzirme sürdürülmeli, emzirme için uygun teknik ve pozisyonlar anneye anlatılmalıdır. Çocuklarda sevdiği yiyeceklere öncelik verilmeli ve beslenme sık sık gerçekleştirilmelidir. Bol sıvı tüketiminin önemi vurgulanmalıdır (Conk & ark., 2018). Hastalığa bağlı olarak çocuğun sesinde yaşanan değişimler, hastane ortamı, gürültü, farklı cihazların bulunması

çocuğun anksiyetesini arttıracaktır. Böyle bir durumda çocuğun odasının sakin, sessiz olması, dingin bir ses tonu kullanılarak çocuğa bütün işlemlerin açıklanması ve mümkünse çocuğun aileyle birlikte hastanede kalmaları sağlanmalıdır. Hava yolu açıklığı tam sağlanana kadar intraket yerleştirme işlemi gibi ağırlı işlemler, anksiyeteyi o da hava açıklığını arttıracığı için ertelenmelidir. Hastanede çocuğa verilen bakıma aile de aktif olarak dahil edilmeli uygun olan zaman ve pozisyonlarda ailenin bakım uygulamasına izin verilerek varsa eksiklikler, yanlışlıklar gözlenmeli ve bu eksiklerin takviyesi, yanlışların düzeltilmesine yönelik eğitimler planlanmalıdır. Tedavide başarının sağlanabilmesi için sürdürülebilirlik çok önemlidir. Kreş dönemi çocuklarında hastalığın görülmesi durumunda başta öğretmenler olmak üzere, çocukla teması olan yetişkinlerin de konuyla ilgili bilgilendirilmesi ve gerekli eğitimlerin sağlanması gerekmektedir. Bu iletişimin kurulması ve eğitim süreçlerinin yönetimi hemşirelerin tedavide sürdürülebilirlik için yapabileceği görevlerdendir (Törüner & Büyükgöneneç, 2017; Güler & Akcan, 2020).

5. Bronşit

Bronşiolit, çocuklarda özellikle yaşamın ilk yıllarında sık rastlanılan, bronşiol yapılarında viral enfeksiyonlara bağlı olarak gelişen enflamasyon, ödem, epitel hücrelerinin nekrozu ve artmış mukus üretimi ile birlikte solunum sisteminde ciddi tıkanıklıklara da sebep olabilen bir alt solunum yolu hastalığıdır (Smith, 2017).

5.1. İnsidans ve etiyoloji

Bronşiolit, her yaş grubunda görülebilir bir hastalık olmasının yanı sıra özellikle iki yaşından küçük çocuklarda daha sık

görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde, bronşiolit vakalarının sıklıkla bir ve iki yaş bandında geliştiği bildirilmektedir. Bu ülkelerde bronşiolit geçiren çocukların %75' inin bir, %95' inin ise iki yaş altındaki bebeklerden oluştuğu bildirilmektedir. Hastalığın en ağır seyri altı aydan küçük bebeklerde görülürken, bunun sebebi olarak da bebeklerin hava yollarının daha küçük olduğu ve mukozal sekresyonları uzaklaştırma yetisinin henüz yetersiz oluşu gösterilmektedir (Yayla, 2017). Bebeklik dönemlerinde ortalama her üç bebekten birini etkileyecek kadar yaygın görülen hastalığın, hastaneye yatış oranları ise vaka içerisinde %2-3 şeklinde, hastalığın görülme sıklığına kıyasla oldukça düşük olarak verilmektedir (Smith, 2017).

Çocuklarda sıklıkla viral olarak görülen bronşiolit hastalığının etyolojisi respiratuar sinsitiyal virüs olarak gösterilmektedir. Respiratuar sinsitiyal virüsten sonra etyolojide ikinci sırada rinovirüs bulunmakta ve sık olmasa da çoklu patojen enfeksiyonuna da rastlanabildiği görülmektedir. Viral enfeksiyonların yanında kompleks immünolojik mekanizmalar da bronşiolitin etyolojisinde yer alabilmekte ve sıklıkla da immünglobulin E'nin eşlik ettiği tip 1 alerjik reaksiyonlar karşımıza çıkmaktadır (Yayla, 2017; Erol & ark., 2017).

5.2. Fizyopatoloji

Bronşiolit hastalığında, viral etkenlerin sebebiyet verdiği sitotoksik hasar varlığı düşünülmektedir. Geçirilen yaş itibariyle daha immatür olan hava yollarının epitel hücrelerinde enfeksiyona bağlı olarak nekroz görülebilmektedir. Hastalığın seyrinde ilerlemeyle, mukusta hiperinflasyon ve atelektazi ile birlikte bronşiolillerin tıkanması görülmektedir. Bebek ve çocuklarda kronik

akciğer hastalığı, kongenital anamoli, immünolojik yetersizlik ve önemli kalp hastalıklarının varlığı gibi durumlarda, hastalığın seyrinin daha ciddiye gidebildiği ve pek sık olmasa da mortalite görülebileceği bildirilmektedir (Smith, 2017).

5.3. Klinik Belirtiler

Bronşiolit etkeniyle enfekte olmuş bir bireyle temastan yaklaşık bir hafta sonrasında, hastalığa dair ilk belirtiler hafif şekilde ve üst solunum yollarında ortaya çıkmaktadır. Alt solunum yolu enfeksiyonuna (ASYE) ait bulgular ise hastalığın ilerlemesiyle daha sonraları görülmektedir. Öksürük virüsün alt solunum yolunda tutulum yaptığına dair ilk belirtidir. Öksürüğü, nefes alıp verişin zorlaşmasından dolayı solunum çabasında artış, taşipne, nefes darlığı (dispne), hışıltı, gerginlik ve beslenmede zorluk takip etmektedir. Solunum sıkıntısına ait belirtiler ise; burun kanatlarında genişleme, iç çekme, yardımcı solunum kaslarını kullanımı veya subkostal retraksiyolar şeklinde gösterilmektedir (Drysdale, Green & Sande, 2016; Smith, 2017). Bebeklerin bir kısmında apne, iştah azalması, letarji görülebilirken, özellikle prematüre ve yenidoğan bebeklerde bu belirtilere daha sık rastlanılmaktadır. Bir aydan küçük bebeklerde hipotermi belirtisine rastlanılabılırken, hastalık nadir olarak da ateş bulgusu verebilmektedir. Apne, beslenme problemi olan prematüreler ve semptomların şiddetlendiği vakalarda siyanoz, inspiratuar raller ve ekspiratuar da gözlenebilmektedir (Drysdale, Green & Sande, 2016).

5.4. Tanı

Bronşiolitin tanılanma sürecinde bir çok hastalıkta da olduğu gibi öykü ve fizik muayeneye ait bulguların alınması esastır.

Bebek/çocuğun öyküsünde; bilinç düzeyi, beslenme, hidrasyonun nasıl etkilendiği, bakım veren kişinin bebek bakımı sağlamadaki özellikleri ve bebek/çocuğun tekrar muayeneye getirebilme olanağı sorgulanmalıdır. Hasta bebek ise ayrıca prematürelilik durumu veya altta yatan başka bir kronik hastalığın varlığı sorgulanmalıdır. Fizik muayenede ise; bebek/çocuğu uzun süre gözlemleyerek durumun tespit edilmesi esastır (Carlo, 2021). Fizik muayenede tespit edilen ya da bildirilen genel durumunun iyi görünmemesi, ciddi solunum sıkıntısı olması, santral siyanoz, oda havasında hastanın inatçı düşük oksijen satürasyonu, dakika solunum sayısı yüksek, apne, emme güçlüğü ya da uygun sıvı alımının olmaması, klinik dehidratasyon olması durumunda bebek/çocuğun hastane ortamında bakım ve tedavisi sürdürülmektedir. Radyoloji ve laboratuvar testleri bronşiolit hastalığının tanılanmasında sık kullanılan yöntemler değillerdir. Radyolojik görüntüleme tetkikleri havayolu komplikasyonları, yoğun bakım gerektiren solunum güçlüğü, kardiyopulmoner alanda altta yatan bir hastalığı olan yüksek riskli bebek ve çocuklarda kullanılabilir (Drysdale, Green and Sande, 2016; Smith, 2017).

5.5. Tedavi

Tedavinin temelinde, bebek ve çocuklara yönelik geliştirilmiş destekleyici bakım yöntemleri yer almaktadır. Bronşiolitte destekleyici bakımın içeriğinde, lüzum hali oksijen desteği, hidrasyon ve beslenmenin sürdürülmesini yer almaktadır. Bebek/çocukta genel olarak satürasyonun %90'ın üzerinde olması istenirken, altta yatan başka bir hastalığın bulunmaması durumunda kısa süreli oksijen düşüklükleri de önem arz etmemektedir. Oral sıvı alımı mümkün mertebe desteklenmeli, oral sıvı alımının

sağlanamaması ya da yetersizliği durumlarında, bebeklere izotonik sıvı desteği nazogastrik ya da intravenöz (IV) yollardan sağlanmalıdır. Bronşiolitli bebek/çocuklarda salbutamol gibi bronkodilatörlerin yan etkilere (taşikardi ve tremor gibi) sebebiyet verebileceği için yarar-zarar kritiğinde, zararın ön plana çıkabileceği düşünülmekte ve tedavide kullanılması tavsiye edilmemektedir (Carlo, 2021). Nazal aspirasyon ve göğüs fizyoterapisini destekleyen kanıtlar yetersiz olduğu, sistemik ya da inhaler kortikosteroidlerin kullanımı önemli iyileşme sağlanamadığı için bronşiolit tedavisinde önerilmemektedir. Hastalığın etkeni sıklıkla viral olduğu için tedavide antibiyotığın de farmakolojik etkinliği bulunmamaktadır (Drysdale, Green & Sande, 2016).

5.6. Hemşirelik girişimleri

Bronşiolitte, semptomları daha hafif seyreden bebek/çocukların tedavileri evde devam ettirilirken, daha ciddi vakalarda ise tedavi hastanede sürdürülmektedir. Bu sebeple destekleyici bakıma ilişkin bilgi ve doğru yaklaşımların kazanımına yönelik aile merkezli bir bakıma başvurulmalı, ebeveynlere eğitim verilmeli, uygulamalar gözlenmeli ve takip edilmelidir (Friedman, Rieder & Walton, 2014). Bronşiolit geçiren bir bebekte destekleyici bakım yöntemleri hemşirelik girişimlerinin merkezinde yer almalıdır. Destekleyici bakım yöntemlerine ilişkin en önemli unsur, beslenmenin sürdürülmesi ve bebeğin anne sütü almasıdır. Bebek hastalık süresince her istediğinde, en geç iki saatlik periyotlarla emzirilmelidir. Beslenme esnasında aspirasyon riskini düşürmek, rahat ve etkili emzirmeyi sağlamak için uygun pozisyon ve beslenme öncesinde burun temizliği yapılmalıdır. Burun temizliğinde uygun

sprey veya damlalar kullanılmalı, gerekliyse ve mümkünse yüzeyel bir aspirasyon yapılmalıdır (Friedman, Rieder & Walton, 2014).

Respiratuar sinsityal virüs damlacık yoluyla bulaş gerçekleştirdiği için ebeveynlere enfeksiyon riskini azaltmaya dair eğitimlerin verilmesi önemlidir. Bulaşı önlemek için, bronşiolitli bebek/çocuğa bakım veren kişilerin temas öncesi ve sonrası ile hasta bebek/çocuğa yakın yüzeylere temas sonrası ellerini yıkamasının bulaşı önlemedeki önemi eğitimle ebeveynlere vurgulanmalıdır. Özellikle bebekler için yaşamın ilk üç ayından önce geçirilen bronşiolitlerde, klinik tablonun kötüleşebileceği bunun için ebeveynlerin bulaşı önlemek adına önlemler almaları gerekmektedir. Önlemlerin başında bebeklerin bulaş için riskin yüksek olduğu bölgelerden uzak tutulması gerekmektedir. Bu ortamlar ise; aşırı kalabalık, iyi havalandırılmamış, sigara dumanı gibi zehirli gazların olduğu alanlar iken aynı zamanda gündüz bakım evleri gibi yerler de kalabalık alanlar olduğu için hastalık riskini artırmaktadır. Anne sütüyle beslenme birçok hastalıkta olduğu gibi bronşiolitte de enfeksiyonlardan korunmak için önemlidir. Bebeklerin beslenme durumlarına göre hastaneye yatış oranlarını değerlendiren bir çalışmada; ilk dört ay anne sütü ile beslenen bebeklerin mama ile beslenenlere kıyasla hastaneye yatış oranlarının %72 daha az olduğu bulunmuştur (Yayla, 2017). Anne sütü alan bebeklerde bronşiolit görülme sıklığını araştıran bir diğer çalışmada, anne sütü alan bebeklerde özellikle Kolostrum ve Immünglobulin A içeriğinin hastalıktan korunmada etkinliğinden bahsetmektedir (Hall & ark., 2013). Hemşirelerin bebeklerde anne sütü alımının önemini bu boyutuyla da değerlendirmeleri ve anneyi emzirmeye teşvik etmeleri gerekmektedir. Çocuklarda D vitamini alımının bronşiolit

hastalığında etkinliğini arařtıran bir diğerk alıřmada, D vitamininin hırıltılı solunum insidansında düşüş sağladığı, T hücre fonksiyonları ve interlökin-10 desteğı sağladığı ve tedavideki etkinliğı bildirilmektedir (Najada & ark., 2004).

6. Pnömoni

Pnömoni enfeksiyöz olan ya da olmayan ajanlar tarafından oluşturulmuş akciğerk dokusunun enflamasyonudur. Pnömonide enflamasyon sıklıkla bakteri, virüs, mantar ve parazit kaynaklı meydana gelmektedir. Fiziksel etken olarak travma, radyasyon ve zehirli gaz kaynaklı irritasyonlar gibi sebeplerden dolayı da akciğerk parankimasında enflamasyon meydana gelebilmektedir (Matthew & Kelly, 2015).

6.1. İnsidans ve epidemiyoloji

Alt solunum yolu enfeksiyonları ve beraberinde pnömoni her yaş döneminde görülse de özellikle ilk beş yıl sık rastlanılan enfeksiyonlardandır. Yaşamın ilk on yılında erkek çocuklarında alt solunum yolu enfeksiyonu daha sık rastlanmakla beraber Adölesan döneme gelindiğinde bu oranın her iki cinsiyette de eşitlendiğı görölmektedir. Doğumdan itibaren yaşamın ilk bir yılı, alt solunum yolu enfeksiyonlarının görölme sıklığı yılda %30-35 seviyelerindeyken ve bu ASYE' nun %10'unu pnömonilerin oluşturduğu düşünölmektedir. Yaşamın ilk bir yılı hayati riski de yüksek olan pnömoni için uluslar arası düzeyde her yıl 152.000-490.000 bebeğink öldüğü belirtilmektedir. Özellikle prematüre olma durumunda bu riskin artış göstereceğı de bildirilmektedir (Söngüt, 2023). Yaşamın ikinci ve üçüncü yılı pnömoni insidansı için pik seviyesine ulaşmakta on yaş üzerinde ise insidans düşüş göstererek

yılda %1' e gerilemektedir. Pediyatrik yaş grubu değerlendirmesinde, ayakta tedavi edilen çocukların %23' ü pnömoni tanısı almıştır. Alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla hastaneye yatışı yapılan çocuklarda pnömoni, bir yaş ve altı bebeklerde %33-50 oranındayken, tüm pediyatrik yaş grubunda bu oran %29-38 olarak verilmektedir (Matthew & Kelly, 2015).

6.2. Fizyopatoloji

Pnömoni hastalığının fizyopatolojisinin başlaması için herhangi bir patojen veya etkenin akciğer alveol yapılarına ulaşması gerekmektedir. Pnömonide gelişen enflamasyonun sebebi sıklıkla viral olarak respiratuvar sinsityel virüs (RSV), bakteriyel olarak ise *S. Pneumoniae* varlığına sık rastlanmaktadır. Alveollere ulaşan patojenlerin adezyonu, kolonizasyonu, konak dokusuna invazyonu, doku hasarına ve fonksiyonel olarak bozulmaya sebebiyet vermesi ile gelişmektedir (Matthew & Kelly, 2015). Akciğerin savunmasında görevli, bakteri ve virüs gibi mikroorganizmaların yerleşim ve çoğalmasını engelleyecek çok sayıda gelişmiş savunma ağı mevcuttur. Bunlar, mukosilier transport, lizozim, nötrofil, sitokinler, laktoferrin, kompleman, fibronektin, immunglobinler, fosfolipitler, T lenfositler, makrofajlar gibi spesifik ve non-spesifik mekanizmalardır. Bakterinin yerleşimi için öncelikle mukosilier klirensin bozulması, silier hareketin azalması, mukusun niteliğinin değişimi gibi savunma alanlarında bozulma ve yetersizliklerin görülmesi gerekmektedir. Bütün bu mekanizmaları bozan herhangi bir sebep hastalığın ortaya çıkmasını desteklemektedir (Kocabaş & ark., 2009)

6.3. Klinik belirtiler

Yaş grubu olarak daha küçük olan çocuklarda zaman zaman pnömoninin spesifik bulguları olmaksızın, ateş, beslenme güçlüğü, huzursuzluk, kusma, diyare, karın ağrısı ya da laterji gibi semptomlarla da ortaya çıkabilmektedir (Somer, Yalçın & Ağaçfıdan, 2006).

Pnömonide, başlangıç semptomları olarak sıklıkla;

- Öksürük
- Ateş
- Solunum seslerinde azalma
- Taşipne
- Göğüs duvarında çekilmeler
- Raller ve ronkuslar eşlik etmektedir

Pnömoniye bağlı gelişebilecek semptomların daha ciddileştiği vakalarda ise,

- Burun kanadı solunumu
- Siyanoz diğer bulgulara eşlik etmektedir (Somer, Yalçın & Ağaçfıdan, 2006; Kocabaş & ark., 2009).

6.4. Tanı

Anamnez ve fizik muayene bulgularıyla örtüşecek şekilde klinik belirtilerde bahsedilen bulgulardan bazılarının ya da hepsinin görülmesi durumu tanının konulmasında önemlidir. Özellikle burun kanadı solunumu ve siyanoz gibi belirtilerin olması durumu tanıyı güçlendirmektedir. Alt solunum yolları hastalıklarına eşlik eden

taşıpne aynı zamanda üst solunum yolu enfeksiyonlarını ekarte etmek için de bir araçtır. Anamnez ve fizik muayene hastalığın tanılanmasında sıklıkla yeterli olmakla birlikte gerekli görüldüğü durumlarda labaratuvar incelemeleri, radyolojik görüntüleme tekniklerine başvurulabilir (Kocabaş & ark., 2009). Uzamış ya da sık tekrarlayan pnömoni olgusu, hastaneye yatış endikasyonunun varlığı, üç yaşından küçük olma durumu, nedeni tespit edilemeyen yüksek ateş, beyaz küre sayısının $>15\ 000/\text{mm}^3$ ün üzerinde olması ve komplikasyon düşünüldüğü durumlarda radyolojik görüntüleme yöntemlerine başvurulmaktadır. Labaratuvar bulgularında lökosit sayısı, eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) ve C-reaktif protein (CRP) düzeyi bakılabilmektedir. Bütün bu değerlendirmeler hastalığın etyolojisiyle ilgili (bakteriyal, viral) kesinlik barındırmaz fakat lökosit sayısı ($>15\ 000/\text{mm}^3$), ESH ve CRP düzeylerinin yüksekliğiyle birlikte, sola kaymanın (%10 bant formu) varlığı bakteriyel pnömoni tanısını destekler niteliktedir (Drummond & ark., 2000).

6.5. Tedavi

Pnömoninin tedavisinde öncelikli olan girişimler, vücut için gerekli olan oksijenin sağlanması, yaşamsal fonksiyonların sürdürülebilirliğinin desteklenmesi, etyolojinin bilindiği durumlarda uygun farmakolojik ajanın seçimi ve hastanın klinik iyileşmesinin sağlanması şeklindedir (Söngüt, 2023). Pnömonide farmakolojik ajanlarla etkili bir tedavi sağlanabilmesi için etyolojinin bilinmesi önemlidir. Antipiretik ve analjezik ilaçlar, etyolojiye bakılmaksızın her iki etyolojide de kullanılmaktadır. Bakteri kaynaklı pnömonilerde ise antibiyotik olarak sıklıkla penisilin ve amoksisilin, penisiline allerjisi olan çocuklarda ise makrolid ya da

sefalosporin ilaçların kullanımını görülmektedir. Etyolojiyi saptamaya yönelik tanı araçlarının bulunmadığı kliniklerde sıklıkla ampirik antibiyotik tedavisine başvurulmakta ve yaş gruplarına göre kullanılan antibiyotiklerin çeşidi ve dozu düzenlenilmektedir (Kocabaş & ark., 2009).

6.6. Hemşirelik girişimleri

Pnömonili çocuğa uygulanacak hemşirelik girişimleri başlıca;

- Tıbbi bir engel olmadıkça beslenmenin sürdürülmesi,
- İki saatte pozisyon değişimi,
- Hidrasyonun sürdürülmesi,
- Perküsyon ve postüral drenaj uygulaması,
- Ağrının giderilmesi,
- Olası komplikasyonların takinin yapılması,
- Derin solunum egzersizlerini içermektedir (Çavuşoğlu, 2013; Söngüt, 2023).

Sekresyonun atılımı için uygun pozisyonların sağlanması gerekmektedir ve çocuğun hangi akciğer lobunda sekresyon yoğunsa o bölge drenajı kolaylaştıracak şekilde yerçekiminden de faydalanılarak desteklenir. Hidrasyonun sürdürülmesi ve sekresyon atılımının kolaylaştırılması için bol sıvı tüketimi teşvik edilir. Bebeklerde solunum sıkıntısı oluşmadığı sürece emzirme desteklenir. Oral alımın yetersiz olduğu/olmadığı durumlarda ise İV sıvı düzenlemesi gerekmektedir. Ağrının kontrolü nefes alma derinliğini arttırmak ve yaşam kalitesi için önemlidir. Çocuklarda ağrı kontrolü için istemde bulunan farmakolojik ajanlar düzenli

olarak kullanılır ve atravmatik bakım tekniklerine başvurulur. Büyük çocuklarda solunum ve öksürük egzersizleri uygulanır ve aileye de uygulattırılır (Soydan, Çam Yanık & Çelebioğlu, 2020; Söngüt, 2023). Göğüs fizyoterapisi ve postüral drenaj sekresyonun atılımında önemlidir. Postüral drenaj için uygun zaman seçiminde bulunulmalı (yemek öncesi, yemekten hemen sonra olmamalı), ortamın hava nemlendirilmesi sağlanmalı, mukozayı yumuşatmak için girişimlerde bulunulmalı, oksijen desteği gerekliyse ayarlanmalı, uygun pozisyon (tabloda belirtildiği şekilde) her lob için özel olarak ayarlanmalı,

- İşlem 20- 30 dk & her pozisyon için 3-10 dk
- Her bir loba perküsyon uygulandıktan sonra vibrasyon
- İşlem sonrası, derin nefes ve öksürme egzersizleri
- İşlem günde 3-4 kez (sekresyonun yoğunluğuna göre) tekrarlanacak şekilde ayarlanmalıdır (Conk & ark., 2018).

7. Astım

Astım, solunum sisteminin sıklıkla alt bölümlerinde, genellikle alerjen duyarlılığı olan uyaranların etkisiyle ortaya çıkan, havayollarında inflamasyon ve akımın kısıtlanmasıyla karakterize bir hastalıktır. Astım çocukluk döneminde en sık görülen kronik rahatsızlıklardan biri olarak kabul görülürken, tekrarlı öksürük nöbetleri, ventilasyonda hışıltı ve nefes darlığı, göğüste yanma ve sıkışma hissi gibi ataklarla da kendini göstermektedir. Yapılan çalışmalarda çocukluk dönemi astım görülmesinde iki tip risk faktörü belirtilmektedir ve bu riskler; çocuğu astıma yatkın kılan

kişisel etmenler ve genetik olarak astıma yatkın olanlarda hastalığın gelişimine yol açan çevresel tetikleyiciler şeklindedir (Özdemir, 2018).

7.1. İnsidans ve epidemiyoloji

Dünya geneli astım prevalansında son yıllarda artış bildirilirken, bu artışın sıklıkla gelişmekte olan ülkelerde görüldüğü belirtilmektedir. rastlanmakta fakat bu artış gelişmekte olan ülkelerde daha fazla gözlemlenmektedir. Gelişmiş ülkelerde artış %1 seviyesindeyken, gelişmekte olan ülkelerde bu oranın %18' e yükseldiği bildirilmektedir (Astımda Küresel Girişimler-AKG, 2022). Ülkemizde çocuklarda astım düzeyini araştıran çalışmalarda ise prevalans değeri %6,4 -17,8 arasında bildirilmektedir (Bozkurt, Yıldız & Çokuğraş, 2012). Astım hastalığı genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin belirleyiciliğinin yüksek düzeyde olduğu bir hastalıktır. Ailede herhangi birinde tanılanmış astım varlığı, çocukta astım görülme durumunu %20-30 oranında arttırırken, anne ve babanın her ikisinde de tanılanmış astım olması durumlarında ise bu artışın %60-70 seviyelerine yükseleceği bildirilmektedir (Morishita & ark., 2016). Genotip olarak bakıldığında astımla uyumlu bulguları olan çocuklarda, fenotipin incelenmesinde ve astımın ortaya çıkışında çevresel faktörlerin yeri de oldukça önemlidir. Cinsiyet çocuklarda görülen astım insidansında bir diğer belirleyici olarak verilmekte ve 14 yaş öncesi dönemde erkek çocuklarında kız çocuklarına nazaran %50 daha fazla görülmektedir. Obezite de birçok hastalıkta olduğu gibi astım hastalığında da tetikleyici bir risk faktörü olarak değerlendirilmektedir ve obez olarak değerlendirilen çocuklarda astım hastalığına yakalanma riski diğer çocuklara kıyasla daha fazla olarak belirtilmektedir (Mungan & ark., 2003).

7.2. Fizyopatoloji

Astım hastalığı oldukça karakteristik fizyopatolojik değişikliklerle görülen kronik bir rahatsızlıktır. Astımın gelişim sürecinde çok sayıda kimyasal mediatör ve inflamasyondan sorumlu hücrelerin rol oynadığı düşünülmekte ve bu sürecin sonucunda da inflamasyonun görüldüğü bir rahatsızlık olarak değerlendirilmektedir (Cohn, Elias & Chupp, 2004). Astım hastalarında, hava yollarında tutulumun üç mekanizması vardır ve bunlar aynı anda ya da ayrı olarak da görülebilmektedir. İlk mekanizmanın başlangıcında gen yapısıyla ilişkili olarak değerlendirilen IgE aracılı olan veya olmayan mekanizmalarla birlikte kimyasal mediyatörlerin salınımı sonucunda ortaya çıkan inflamatuvar reaksiyonlar görülmektedir. İkinci mekanizmada ise akut inflamatuvar bileşenler sıklıkla ön plana çıkmakta ve alt hava yollarını özellikle de bronş duvarındaki düz kasların hücre reseptörlerini ve epitel hücrelerini etkilemektedir. İkinci mekanizma sonrasında uyaranlara verilen tepki daha da artış göstermektedir. Üçüncü mekanizmada ise dokuda yeniden yapılanma süreçleri ve ileri derecelerdeki doku hasarının düzeltilmesi gerçekleşmektedir. Bu mekanizmalardaki işlerlik de akciğer hücrelerinde zamanla hiperplazi gelişmesi ve bronşiyollerinin sertleşmesine sebep olabilmektedir. Bu yapısal etkilenmeyle birlikte ilerleyen zamanlarda akciğer enflamasyonu artış gösterirken ve akciğer fonksiyonlarında da azalma gözlenebilmektedir (Türk Toraks Derneği-TTD, 2009).

7.3. Klinik belirtiler

Hastalığın semptomları nöbetler şeklinde ve çoklu olarak ortaya çıkmakla birlikte aynı zamanda kişiden kişiye de değişiklik

gösterebilmektedir. Nöbetlerin tetikleyicilerine bakıldığında; alerjenler, enfeksiyonlar, havayolu iritanları, egzersiz ve stres benzeri sebeplere rastlanmaktadır. Semptomlar genellikle günün belli saatlerinde tekrarlamakta bu saatler ise kişiden kişiye farklılaşmakla birlikte genellikle uyku sırasında yoğunlaşma gösterebilmektedir (Sipahi & Tamay, 2018). Klinik belirtiler incelendiğinde sıklıkla; ani başlangıçlı, boğulur tarzda, şiddetli öksürük, hışıltı, göğüste sıkışma hissi, nefes darlığı karşımıza çıkmaktadır. Astıma, başka herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonunun eşlik ettiği durumlarda, bahsi geçen semptomlarda artış görülebilenken, diğer hastalığın iyileşme sürecinde de uzama, yaşanan atakların çocuktaki ciddiyetine göre siyanoz, uyku hali, konuşmada zorlanma, taşikardi, yardımcı solunum kaslarının kullanımı ve interkostal retraksiyonlar görülebilmektedir. Astım hastalığında, iritan madde maruziyeti, tozlu ortam, ortamda hayvan ya da kokulu ve havasız ortam varlığı gibi durumlarda da kriz sıklık ve şiddetinin artış gösterebileceği bildirilmektedir (Özdemir, 2018).

7.4. Tanı

Astım hastalığının tanılanmasında da solunum yollarını etkileyen diğer hastalıklarda da olduğu gibi detaylı bir anamnez ve fizik muayene önceliklidir. Astımla uyumlu semptomlar göz ardı edilmemelidir çünkü hastalığın ileriki seyirlerinde var olan bulgular gerileyebilmekte ve hastalığın tanılanmasını güçleştirebilmektedir (Özdemir, 2018). Bu nedenle, astımın çocuklarda ortaya çıkışı ve semptomların zamanının değerlendirmesi önemlidir. Astım semptomlarının şiddeti kişiler arasında değişkenlik gösterebilmektedir fakat tipik olarak viral solunum yolu enfeksiyonu ile karşılaşma halinde, zorlayıcı egzersizlerde ve

irritanlarla (parfüm, temizlik malzemelerinin kokusu vb) temas halinde tepkisel kriz artışı görülebilmektedir. Astım semptomlarında tipik olarak gece saatlerinde atışlar görülmekte ve öyküde böyle bir veri olmaması durumunda ise tanının yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir (Cockcroft, 2003). Astımın tanılandırılma sürecinde, solunum fonksiyon testlerinden de yararlanılmaktadır. Fakat bazen astım hastalığının görülmesi durumunda bile ilgili test sonuçları normal çıkabilmektedir. Astım ve alerjik hastalıklar güçlü bir ilişkiye sahip olduğu için, astımlı çocuklarda ayrıntılı alerjik değerlendirme yapılmasının astımın tanılama sürecinde fayda sağlayacağı bildirilmektedir (TTD, 2009).

7.5. Tedavi

Astım hastalığının tedavisinde öncelikli olan atakların tetikleyicilerinin tespit edilerek onlardan kaçınma yöntemlerinin geliştirilmesi, anne sütü alan bebeklerde emzirmeye devamlılığın sağlanması ve gerekli görüldüğü durumlarda farmakolojik müdahaleler yer almaktadır. Astım tedavisinde destek tedavisi oldukça önemli olmakla birlikte zaman zaman farmakolojik tedavinin de önüne geçmektedir. Bu yüzden astım hastalığının tedavisinde öncelikli olan atakları tetikleyen sebeplerin tespit edilmesidir, sıklıkla alerjen teması veya sigara dumanı gibi sebepler tetikleyici olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastalığın ataklarını tetikleyen sebeplerden mümkünse uzaklaşmayı sağlayacak ya da teması azaltacak önlemler kullanılacak farmakolojik tedavinin de sıklık ve dozunda düşüşleri sağlayabilecektir. Bebek ve çocuklarda ebeveyn/ bakım veren kişilerin hastalık hakkındaki bilgi düzeylerinin tespit edilmesi ve onlara verilecek ilgili eğitimler yine tedavide başarı şansını arttıran, hastalığın morbiditesinin azaltan

tedavide yer alması gereken uygulamalardandır (Sipahi ve Tamay, 2018). İki yaş altı astım tanısı almış bebeklerde emzirilmenin teşvik edilmesi, annenin sütünün yeterliliğinin değerlendirilmesi, emzirmenin gözlemlenip doğru olan yöntemlerin desteklenmesi, yanlış olanların ise uygulamalı eğitimlerle düzeltilmesi önem arz etmektedir. Astımın son dönem çalışmalarında D vitamini seviyesi ve astım arasında ters yönlü bir ilişki tespit edilmiş ve D vitamini seviyeleri yüksek olan çocuklarda daha az astım, hastaneye yatışın da daha düşük olduğu bulunmuştur (Erol & ark., 2017). Astım hastalığının tedavisinde sıklıkla inhaler uygulama yoluyla bronkodilatör gruba dahil olan farmakolojik tedavi kullanılır. Atakların sıklaştığı ve kontrol altına alınamadığı durumlarda ise kortizon tedavisi uygulanabilmekte fakat yan etkilerinin ciddiyeti bu ilaçların kullanım sıklığını düşürmektedir (Türkiye Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, 2020).

7.6. Hemşirelik girişimleri

Astım hastası olan çocuklarda hemşirelik girişimleri;

- Hava yolu açıklığının sağlanması,
- Sıvı gereksiniminin karşılanması,
- İstirahatin sağlanması,
- Ailenin de bakıma katılarak çocuğun evde bakımının sürdürülmesini içermektedir (Conk & ark., 2018).

Hava yolu açıklığının sürdürülmesi için, bebek/çocuğa rahat nefes alışverişinin sağlanabilmesi için gerekli, uygun pozisyonların verilmesi gerekmektedir. Küçük bebek ve çocuklarda baş omuzla birlikte ince bir yastıkla desteklenmesi gerekirken büyük çocuklarda

semi fowler ya da fowler pozisyonları verilebilir. Hava yollarının temizliđi sađlandıktan sonra nemlendirilmiş oksijen tedavisi verilmelidir. Mukoza kuruluşunun önlenmesi ve nefes alıp verililişinin daha rahat sürdürölmesi adına nemlendirme önemlidir. Hidrasyonun sürdürölmesi için bebeklerde solunumun el verdiđi ölçüde emzirme sürdürölmesi, emzirme için, solunumun sürdürölmesini destekleyecek uygun teknik, pozisyonlar anneye anlatılmalı ve uygulanmalıdır. Çocuklarda sevdiđi yiyeceklere öncelik verilmeli ve beslenme sık sık gerçekleştirilmelidir. Bol sıvı tüketiminin önemi vurgulanmalıdır. Bebek hastalık süresince her istediđinde, en geç iki saatlik periyotlarla emzirilmelidir (Özdemir, 2018). Beslenme esnasında aspirasyon riskini düşürmek, rahat emmeyi sađlamak için uygun pozisyon ve beslenme öncesinde burun temizliđi sađlanmalıdır. Burun temizliđinde uygun spre y veya damlalar kullanılmalı, gerekliyse ve mümkünse yüzeyel bir aspirasyon yapılmalıdır. Astım hastalığında atakların tetikleyicilerinin belirlenmesi atakların önlenmesinde oldukça önemlidir. Aile bebek/çocuđun gözlemlenmesi ve iritanların belirlenmesi konusunda eğitimle desteklenmeli ve aile merkezli bakım çerçevesinde aileyle iletişim halinde olunmalıdır (Törüner & Büyükgönenç, 2017). Tetikleyicilerden uzaklaşılması atak sayısını düşüreceđi için girişimler buna yönelik düzenlenmelidir. Astım kronik bir hastalıktır ve bakımda süreklilik önemlidir bu sebeple hem bakım noktasında hem de farmakolojik tedavinin sürdürölmesinde ailenin farkındalıđı arttırılmalıdır. Farmakolojik tedavide dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda aileye eğitim verilmelidir. Ebeveynler her sürece dahil edilerek, aile merkezli bir

bakım benimsenmeli, ebeveynlerin varsa eksikleri telafi edilmeli ve yanlışları düzeltilmelidir (Friedman, Rieder & Walton, 2014).

İnhaler yoldan alınan ilaçların absorbsiyon hızlarının yüksek olması bu ilaçların da kullanımında dikkati gerektirmektedir. Çocuk yaş grubunda görülebilecek yan etkiler artmaktadır ve bu sebeplerle hastane sürecinde yaşam bulgularının sık takibinin yapılması, yan etkilerin gözlemlenip not edilmesi önem arz etmektedir. Evde bakımda ise bu görev bakım veren kişiye ait olacaktır, eğitime bu konuların da dahil edilmesi önemlidir. Eğitim uygulamalı olarak planlanmalı, farmakolojik ajan kullanımı ilk olarak hemşire tarafından gerçekleştirilmeli daha sonra bakım veren kişiye uygulatılmalıdır. İşlem esnasında sürekli olarak her aşama kontrol edilmeli ve varsa eksiklikler telafi edilmelidir. Bu süreçte eğer ki çocuk okul döneminde ise okulla işbirliği içerisinde gerekli eğitim ve planlamaların da yürütülmesi gerekmektedir (Güler & Akcan, 2020).

8. Sinüzit

Sinüzit bebeklerde sık görülen enfeksiyonlardan değildir çünkü beş yaş altında paranasal sinüslerde (maksiller, etmoid, frontal ve sfenoid) aktif havalanma olmamaktadır. Aktif havalanma ve yapının tam gelişimi adölesan döneme denk gelmektedir. Maksiller, etmoid, frontal ve sfenoid sinüslerden bir veya daha fazlasının müköz membranlarının enflamasyonu sinüzit olarak adlandırılmaktadır. Sinüzit enfeksiyon süresine göre beş gruba ayrılmaktadır. Akut bakteriyel sinüzit (ABS); semptom ve bulguların 10 günden fazla 30 günden (veya 4 haftadan) az devam ettiği genellikle bakteri kaynaklı görülen enfeksiyondur (Brook, 2009). Rekürren akut sinüzit; bir yıl içerisinde dört ya da daha fazla sayıda akut sinüzit gelişmesi durumudur. Subakut sinüzit;

semptomların 30 günden 90 güne kadar sürdüğü durumdur. Kronik sinüzit; semptom ve bulguların 90 günden (veya 12 haftadan) fazla sürmesi durumudur. Kronik sinüzitin akut alevlenmesi durumu da ayrı bir başlık olarak değerlendirilmektedir. Kronik sinüzitte görülen semptomlara ek olarak yeni ve farklı semptomların da eşlik ettiği, tedaviden sonra genellikle son gelişen semptomların düzelerek klinik tablonun eski haline döndüğü durum olarak tanımlanmaktadır. Enfeksiyon süresine göre yapılan bu sınıflandırmaya ek olarak nozokomiyal sinüzit, immün yetmezlik bulunan hastalardaki sinüzit ve diş kaynaklı sinüzit olmak üzere patojenin kazanıldığı ortam ve altta yatan etyolojiye göre de sınıflamalar yapılmaktadır (Novembre & ark., 2007). Bu çalışmada çocuk ve bebeklerde sinüzit hastalığının görülme sıklığı düşük olduğu ve hastalığın tipleri arasında tanı, tedavi süreçlerinde benzerlikler bulunduğu için hastalığın tipleri ayrıştırılmadan değerlendirilmelerde bulunulacaktır.

8.1. İnsidans ve epidemiyoloji

Çocuklarda sinüzit insidansı verileri çok net olmamakla birlikte, çalışmalarda üç yaş altı çocuklarda %6-13'ünün rinosinüzit geçirdiği düşünülmektedir. Bir yaş altı bebeklerde bakteriyel sinüzit gelişimi oldukça nadir görülen bir durumdur. Akut bakteriyel sinüzit sıklıkla altı yaş civarı çocuklarda görülmektedir (Amerikan Pediatri Akademisi-APA, 2001).

8.2. Klinik belirtiler

Klinik belirtilerde sıklıkla burun akıntısı görülmektedir. Akıntı zaman zaman pürülan olarak görülebilmektedir. Burun tıkanıklığı, ateş, öksürük, yüzde ağrı (özellikle etkilenen tarafta yoğun olarak), ödem, ödeme bağlı burun tıkanıklığı, nefeste kötü koku

görülebilmektedir. Hastalığın ilerlemesiyle viral enfeksiyon bulgularına rastlanabilmekte ve bu durum da çoğunlukla 5-7 gün içerisinde gerilemektedir (Novembre & ark., 2007).

8.3. Tanı

Sinüzit hastalığının tanınmasında anamnez ve fizik muayene ile uyumlu semptomların varlığı genellikle yeterli olmaktadır. Hastalığın tanınmasında otoskopik görüntüleme cihazları sık kullanılmakta ve bu gözlemsel tetkik tanılandırmada destekleyici olmaktadır. Hastalığın tanımlanmasında gerekli görüldüğü durumlarda sık olmasa da radyolojik görüntüleme yöntemlerine başvurulabilmektedir. Ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans kullanılan radyolojik yöntemlerdendir (Brook, 2009).

8.4. Tedavi

Sinüzit hastalığının tedavisinde etyolojiye yönelik, semptomatik ve destekleyici tedavi yöntemlerine başvurulmaktadır. Sinüzit hastalığının tedavisinde genellikle mukoza ödeminin azaltılarak hava yolu açıklığının sürdürülmesi ve varsa ateşin düşürülmesine odaklanıldığı görülmektedir. Bu amaçla dekonjestan, antihistaminik ve mukolitik farmakolojik ajanların kullanımına rastlanılmaktadır. Bu ilaç kullanımlarıyla ilgili olarak semptomların, görülen olguların 2/3'ünde kendiliğinden gerilediği ve farmakolojik tedavinin daha çok plesebo etkisinde olduğu belirtilmektedir. Ayrıca antihistaminikler mukoza kuruluşuna sebep olabilirken sinüs drenajını da bozabilmektedirler (Ünüvar, 2006). Antibiyotik tedavisi sık olmamakla birlikte sinüzitte uygulanmakta fakat genellikle kültür sonucuna dayandırılmadan ampirik bir şekilde tedavi

uygulandığı görülmektedir. Hastalığın tedavisinde antibiyotik olarak amoksisilin tercih edilmektedir. Antibiyotik tedavisinin süresiyle ilgili kanıta dayalı bir tedavi seçeneği bulunmamasına rağmen, genellikle pratikte 10-14 günlük bir tedavi ya da ateş kontrol altına alındıktan sonra bir hafta 10 günlük bir tedavi uygulanmaktadır (Novembre & ark., 2007). Hastalığa ait semptomların giderilmesinde kullanılan farmakolojik tedavinin plesebo etkisi olabileceğine dair sunulan bilgilerle birlikte, hastalığın tedavisinde destekleyici tedavi yöntemlerinin kullanımının daha güvenli olacağı kanısına varılabilir. Drenajı kolaylaştırmak, nemlilik ve hava yolu açıklığını sağlamak adına kullanılabilecek serum fizyolojik damlaları başta olmak üzere, odanın nemlendirilmesi, beslenme ve vitamin destekleri vs. yöntemlerle destekleyici tedavi başarı sağlayabilmektedir. Destekleyici tedavi yöntemlerinin kullanımıyla birlikte hastalığa bağlı semptomların sıklıkla 5-7 günlük süreçte gerileme gösterebileceği de çalışmalarda belirtilmektedir (Hay & ark., 2020).

8.5. Hemşirelik girişimleri

Sinüzitte uygulanan hemşirelik girişimleri nazofarenjit ve farenjitte uygulanması gereken hemşirelik girişimleriyle benzerlik göstermektedir. Bu yüzden nazofarenjit, farenjit ve sinüzit hastalıklarında uygulanan hemşirelik girişimleri ortak verilmiştir (Bkz. sayfa, 6).

9. Kistik Fibroz

Genetik kökenli, kompleks, otozomal resesif geçiş gösteren hastalık, Kistik Fibrozis Transmembran Regülatör (KFTR) adlı klor kanalındaki 7. kromozomun mutasyonu sonucunda ortaya

çıkılmaktadır. Kistik fibrozis çoklu sistem tutulumu yapmaktadır. Hastalığa ait semptomlar sıklıkla solunum sisteminde başlarken, sindirim sistemi de sıklıkla etkilenmektedir. Ayrıca pankreas, ter bezleri ve genital sistem gibi alanlarda müköz bezlerde tutulum yaptığı için salgı görevindeki epitelyum hücrelerinde bozulmalar görülmektedir. Bu hücrelerdeki klor ve sodyum transportu bozulurken, sodyum ve beraberinde görülen su emiliminde görülen artışla birlikte salgılar daha koyu ve yapışkan hale gelmektedir. Yapısı değişen salgılar duktuslarda tıkanmalara sebep olurken, bu durum hayati seviyelerde akciğer enfeksiyonları ve pankreas yetmezliğiyle ilgili hastalıklar başta olmak üzere diğer sistemlerde de tutulum gerçekleştirmektedir. Hastalığın kompleks yapılanmasından dolayı kliniğe mineral kaybı (özellikle sodyum), pankreatit ve insüline bağlı diyabet, kolelitiazis, nazal polip ve rektal prolapsus rahatsızlıklarına ait semptomlarla başvuran hastalarda kistik fibroze ilişkin taramaların da yapılması önerilmektedir (Gadsby, Vergani & Csanády, 2006; Gündoğdu, 2020; Fakıoğlu & Altun, 2020; Kistik Fibrozis Derneği-KFD, 2020).

9.1. İnsidans ve epidemiyoloji

Genetik geçişe sahip olan kistik fibroziste, taşıyıcılık veya hastalığın bulunması durumuna ilişkin insidanslar, etnik gruplara ait popülasyonlar içerisinde farklılık gösterebilmektedir. Beyaz ve siyah ırk arasında bu farklılık belirginken oranlar sırasıyla 1/29; 1/60 şeklinde görülmektedir. Hastalığın taşıyıcılık oranı 1/25 iken, görülme sıklığı ise 2000-3500 canlı doğumda bir olacak şekildedir (Gadsby, Vergani & Csanády, 2006). Ülkemizde kistik fibrozisin insidansına ilişkin rakamlar 1/3000-3500 şeklinde verilmekte ve

akraba evliliklerinin bulunması dolayısıyla bu oranların daha yüksek olabileceği de düşünülmektedir (TTD, 2011; akır & Arslan, 2021).

9.2. Fizyopatoloji

Kistik fibrozis hastalığında sıklıkla salgı bezlerinin egzokrin alnlarında etkilenmeye baėlı, kalıcı yapısal ve fonksiyonel bozuklukların olduėu belirtilmektedir. Klor ve sodyum metabolizmasında düzenleyici fonksiyona sahip 7. kromozomun mutasyonu ile birlikte, hastalığın önemli karakteristik özelliėi olan salgı kanallarında bozulmalar meydana gelmektedir. Mukoid salgı, özellikle solunum yollarında sodyum, klorün kontrol dıřı salınımı ve beraberinde hidrostatik basınçtaki bozulmalar ile birlikte koyulařmaktadır. Bu koyulařma, kronik akciėer enfeksiyonları, salgısal alanlarda bozulmalar ve diėer hastalıkların oluřumunu da tetiklemektedir (Le Drévo & ark., 2008; TTD, 2011; akır & Arslan, 2021).

9.3. Klinik belirtiler

Hastalık oklu sistem tutulumu sergilediėi iin, belirtiler de olduka geniř apta deėerlendirilmektedir. Bu belirtiler aynı zamanda yař grubuna göre de farklılık gösterebilmektedir. Yenidoėan dönemi, hastalıėa baėlı konvülsiyonların (subtle, klonik, tonik ve myoklonik) görülebildiėi ve bu konvülsiyonlardan sıklıkla subtle türün tespit edildiėi özel bir dönemdir. Subtle konvülsiyona ait, göz kapaklarında titremeye birlikte bakıřlarda sabitlenme, iėneme benzeri hareketler ve kardiyovasküler alana ait ritim artıřı veya tansiyon düşüklüėü gibi belirtiler görülebilmektedir. Solunum sistemine ait tutulumlarda; öksürük, solunum ritminde artıř, interkostal ekilmeler, vizing, atelettazi gibi belirtiler

görülmektedir. Sindirim sistemine ilişkin tutulumlarda; kilo alamama, mekonyum ileusu veya tıkanması gibi belirtiler görülebilmektedir. Aynı zamanda uzayan sarılık öyküsü veya yenidoğanın hemorajik hastalığı da görülebilecek diğer belirtiler arasında yer almaktadır. Süt çocuğu ve çocukluk dönemlerinde, yenidoğan dönemi görülebilecek belirtilere ek olarak; tekrarlı sinüzit, bronşiolit gibi enfeksiyonların öyküsü, bronşektazi, nazal polip, büyüme geriliği, bağırsak boşaltım bozuklukları (genellikle ishal), bağırsak distansiyonu, rektal prolapsus, sıvı-elektrolit dengesizlikleri, anemi, pankreas ve safra kesesi enflamasyonları, gaitanın yağlı ve pis kokulu olması gibi durumlar görülebilmektedir. Adölesan dönemde ise; diğer dönemlere ek olarak, pankreas gibi organlarda yetmezlik, pubertenin gecikmesi, azosperm durumu ve diyabetes mellitus gibi rahatsızlıklar görülebilmektedir (TTD, 2011; Gündoğdu, 2020; KFD, 2020).

9.4. Tanı

Kistik fibrozis hastalığında erken tanılama hayati önem taşımaktadır. Ailede kistik fibrozis öyküsünün olduğu olgular, riskli gebelik olarak kabul edilmekte ve bu gebelere 10. haftada koryonik villus ve 15-18. haftalarda ise amniosentez sıvı kültürü örneklerine yönelik gerçekleştirilen DNA mutasyon incelemeleriyle tanı koyulabilmektedir. Ülkemizde kistik fibrozisin erken tanılanabilmesi amacıyla, 2015 yılından itibaren yenidoğan tarama testlerine dahil edilmiştir. Bu program kapsamında doğum sonu alınan topuk kanı örneklerinde hastalığın tarama işlemi sürdürülmektedir. Yenidoğanlarda topuk kanından alınan örneklerde hastalığa ilişkin immunreaktif tripsinojen (IRT) değerlerinin olası yüksekliği incelenmektedir. Değerleri yüksek

görülen hastalarda, IRT testinin tekrar edilmesi önerilmekte, mümkünse ter testi veya mutasyon analizi de tanılamada kullanılabilir. Ter testinde en iyi sonuca ulaşılabilmesi içinse bebeklerin doğum sonu ikinci haftalarını tamamlamış ve üç kilonun üzerinde olması kriterleri önemsenmektedir (De Boeck & ark., 2006; TTD, 2011).

9.5. Tedavi

Tedavi, semptomlar ve tutulum gösteren organa göre değişmekle birlikte, sıklıkla akciğer tutulumu olduğu için daha çok solunum sistemine yönelik olarak düzenlenmektedir. Tedavide genellikle öncelik solunum fonksiyonlarının sürdürülmesi, enfeksiyonların kontrolü, optimal beslenmenin sağlanması ve intestinal obstrüksiyonun önlenmesidir. Akciğerlerde mukusu azaltmak ve atılımını kolaylaştırmak için sıklıkla göğüs fizyoterapisi uygulanmaktadır. Enfeksiyon tespit edilmesi durumunda ise uzun süreli antibiyotik tedavisine başvurulmaktadır. Hastalığın antibiyotikle yapılan tedavisinde “Kopenhag protokolu” olarak da bilinen yaklaşım uygulanırken, kolitsin inhaler, siprofloksasin ise oral olarak kullanılmaktadır. Doz süresi ve aralığında düzenli olarak artışa gidilen bu farmakolojik tedavide protokolünde, iki ila üç hafta betalaktam ve aminoglikozid, iki ila üç aylık dönemde ise kolistin veya tobramisin ile siprofloksasin tedavisi uygulanabilmektedir (Hoiby, Frederiksen & Pressler, 2005). Mukus vizkozitesini azaltmak için mukolitikler, solunumu rahatlatmak için bronkodilatör ajanlar kullanılabilir. Zaman zaman kortikosteroid gibi antiinflamatuvar ajanlar kullanılabilir. Çocukta beslenmeyi düzenlemek adına pankreatik enzimler ve vitamin takviyeleri kullanılabilir (Fakıoğlu & Altun, 2020; KFD, 2020).

9.6. Hemşirelik girişimleri

Kistik fibrozis hastası çocuklar, erişkinlik çağına kadar yaşayabilirler fakat kronik bir dizi problem ve uygun tedavi yöntemleri yaşam kalitesini düşürebilecek durumlardandır. Hastalığın komplikasyonları, tedavi ve bakım yöntemlerinin pahalı ve zor olması durumu, çocuk ve ailenin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilecek diğer faktörlerdendir (Hockenberry & Wilson, 2009). Hastalığa bağlı görülebilecek multisistemik semptomların varlığı, tedavide de multidisipliner yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Pediatri hemşireleri çocuklarla geçirilen süre ve gerekli bakım uygulamaları düşünüldüğünde bu ekibin lideri konumundadır. Bu sebeple hastalığın yönetimi sürecinde koordinasyon becerilerini en üst seviyede kullanmalıdırlar. Kronik bir rahatsızlık olan kistik fibroziste öncelikli olan yaklaşım, gerekli bakım uygulamalarının sürdürülebilirliğidir. Bakımlardaki temel amaç ise, hastalıkla uyumu kolaylaştıracak yöntemlerin kullanılarak yaşam kalitesinin artırılması olmalıdır. Bakım girişimleri planlanırken çocukta etkilenen sistem göz önünde bulundurulmalı ve ihtiyaca yönelik planlanma yapılmalıdır (Gündoğdu, 2020).

Kistik fibrozisli hastalarda nazokomiyal enfeksiyonların yayılmasını önlemek gerekmektedir ve bunun için başta el yıkama olmak üzere hijyen önlemlerinin alınması önemlidir. Hastane ortamında bakım sağlanırken hijyen kurallarına maksimum düzeylerde uyulmalıdır. Sıklıkla akciğerlerde etkilenme olduğu için aerosol tedavisi ve göğüs fizyoterapisi, solunum egzersizleri uygulanmalıdır (Hockenberry & Wilson, 2009). Aspirasyon riski ve irritasyon açısından göğüs fizyoterapisinin yemekten hemen önce ya da sonra yapılmamasına dikkat edilmelidir. Hastalığın erken

döneminde iştahın iyi olmasına rağmen, enfeksiyon ve akciğer sorunlarının ilerlemesi halinde iştahta azalma oluşabilmektedir. Dehidratasyonu önlemek amaçlı sık aralıklarla beslenmeyi sağlama ve bol sıvı tüketiminin teşviki sağlanmalıdır. Salgılarda azalma ve koyulaşma durumlarından dolayı oral enfeksiyon gelişme riskine karşı ağız bakımı verilmesi önemlidir. Özellikle sıcak havalarda bol sıvı alımı daha da arttırılırken, tuz kısıtlaması yapılmaması ve yeterli sıvı vermeleri gerektiği, aileye mutlaka vurgulanmalıdır (Çavuşoğlu, 2013; Özçelik, 2019).

Bütün bu süreçlerde çocuk ve ailenin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir çünkü kistik fibrozis bütün ailenin yaşam sürecini etkilemektedir. Bütün girişim ve uygulamalarda aile merkezli bakım kullanılmalı, holistik bakım yaklaşımları çerçevesinde çocuk ve ailesinin fiziksel, duygusal, bilişsel, sosyal, kültürel ve dini yönden bir bütün olarak değerlendirecek şekilde uygun planlamalar yapılmalıdır (Alparslan & Demir, 2015). Kistik fibrozisli çocuklarla ilgili olarak yapılan çalışmalarda da ebeveynlerin sürece dahil edilmeleriyle (ebeveynlerin sorularının yanıtlanması, hastalık yönetimine ilişkin bilgi düzeylerinin arttırılarak uygun bakım yöntemlerinin gerçekleştirilmesi, çocukla ilgili alınacak kararlara ebeveynlerin katılımının sağlanması gibi), çocukların yaşamında süre ve kalite bakımından kazanım sağlanabileceği belirtilmektedir (Catastini & ark., 2016; Dinç & ark., 2018; Dönmez & Arslan, 2019).

Kistik fibrozisin yönetiminde ebeveynlerin de sürece dahil edilmesi bakımın sürdürülebilirliği için önem arz etmektedir. Bu sebeple ebeveynlere yönelik düzenlenecek olan eğitim; enfeksiyona yönelik koruyucu önlemleri, bağışıklama yöntemlerini, postüral

drenaj gibi uygulamaları içeren göğüs fizyoterapisi uygulamalarını, beslenmenin sürdürülebilirliği ve gelişim parametrelerini takibini, ilaçların uygun kullanımlarına ilişkin ve gerektiği durumlarda destek alabilecekleri ünitelerle ilgili bilgileri içermelidir (Kerem & ark., 2005; Çavuşoğlu, 2013).

Kaynaklar

Akan, H. (2012). Üst solunum yolu enfeksiyonlarında bitkisel ve nonfarmakolojik tedaviler. *The Journal of Turkish Family Physician*. 3(3), 9-15.

Akşit, S. (2002). Akut üst solunum yolu enfeksiyonları. *Türk Tabipler Birliği*. 11(4), 132-135.

Alparslan, Ö. & Demir, M. (2015). Kistik fibrozis ve hemşirelik bakımı. *Türkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics*. 1(3), 40-45.

APA. (2001). Subcommittee on management of sinusitis and committee on quality improvement. *Clinical practice guideline: Management of Sinusitis. Pediatrics*. 108, 798-808.

Bozkurt G, Yıldız S. & Çokuğraş H. (2012). Astımlı çocuklarda tetikleyici faktörler ve klinik özelliklerin incelenmesi. *ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi*. 13(3), 7-13.

Brink, A.J., Feldman, C., Grolman, D.C., Muckart, D., Pretorius, J., Richards, G.A., Senekal, M. & Sieling, W. (2004). Appropriate use of the carbapenems. *SAMJ*, 94(10), 857-861.

Brook, I. (2009). Sinusitis. *Periodontol*. 49, 126-39.

Carlo, WA., (2021). The newborn. *Nelson Pediatri*, Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul.

Catastini, P., Di Marco, S., Furriolo, M., Genovese, C., Grande, A., Iacinti, E. & et al. (2016). The prevalence of anxiety and depression in Italian patients with cystic fibrosis and their caregivers. *Pediatr Pulmonol*. 51, 1311

Chambi-Rocha, A., Cabrera-Domínguez, M.E., & Domínguez-Reyes, A., (2018). Breathing mode influence on craniofacial development and head posture. *Jornal de Pediatria*, 94(2), 123-130.

Cherry, J.D. (2008). Croup. *New England Journal of Medicine*. 4, 384-391.

Cırık, V. & Efe, E. (2017). Pediatri hemşireliğinde tamamlayıcı sağlık yaklaşımlarının önemi. *HEAD*. 14(2), 144-149.

Cohn, L., Elias, J.A. & Chupp, G.L. (2004). Asthma: Mechanisms of disease persistence and progression. *Annu Rev Immunol*. 22, 789–815.

Cockcroft, D.W. (2003). Bronchoprovocation methods. *Clin Rev Allergy Immunol*. 24(1), 19–26.

Conk, Z., Başbakkal, H., Bal Yılmaz, H. & Bolışık, B. (2018). *Pediatri Hemşireliği*, Akademisyen Yayınevi, Adana, 359-385.

Çakır, E.P. & Aslan, A.T. (2021). Kistik fibroziste tanı kriterleri ve tanımlamalar, *Kistik Fibrozis*, Türkiye Klinikleri, Ankara, 18-23.

Çavuşoğlu H. (2013). *Çocuk sağlığı hemşireliği*. Sistem Ofset Basımevi, Ankara, 377-94.

Kistik Fibrozis Derneği. (2020). Hekimler için kistik fibrozis tanı ve tedavi rehberi. (8/10/2024 tarihinde <https://www.kistikfibrozisturkiye.org/wp-content/uploads/2020/01/Hekim-KF-kitapcik-son-basilan.pdf> adresinden ulaşılmıştır)

Dinç, G., Özçelik, U., Çöp, E., Yalçın, E., Çak, T., Doğru, D., Göker, Z., Kiper, N. & Ünal, F., (2018). Kistik fibrozisli çocukların annelerinde psikiyatrik belirti, ebeveynlik tutumları ve baş etme becerileri. *Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi*, 15, 1-8.

Fakıoğlu, D.M. & Altun, B. (2020). Kistik fibroziste yeni terapötik yaklaşımlar. *Türkiye Farmasötik Bilimler Dergisi*, 17 (6), 686-697.

Flibotte, J. & Gokulakrishnan, G., (2018). *Examination of the Newborn Infant. Pediatrics*, Rudolph, McGraw-Hill Education.

De Boeck, K., Wilschanski, M., Castellani, C. & et al. (2006). Cystic fibrosis: terminology and diagnostic algorithms. *Thorax*. 61, 627-635.

Doğan, K., (2020). Çocuklarda ağızdan solunum sendromuna bağlı faktörlerin araştırılması, *İstanbul Üniversitesi*, Bitirme Tezi.

Dönmez, H. & Taş Arslan, F. (2019). Kistik fibrozisli çocuğun bakımında hemşiresinin rolü. *Pediyatrik Uygulama ve Araştırma*, 7(4), 57-61.

Drysdale, S.B., Green, C.A. & Sande, C.J. (2016). Best Practice in the prevention and management of pediatric respiratory syncytial virus infection. *Ther Adv Infect Dis*. 3(2), 63-71.

DSÖ. (2005). *Traditional Medicine Strategy 2002–2005*.
(21/11/2024 tarihinde
https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/67163/WHO_EDM_TRM_2002.1_eng.pdf;jsessionid=C95C1EBC970B901FC8370123C1D3689B?sequence=1 adresinden ulaşılmıştır)

DSÖ. (2022). *Child mortality*. (3/11/2024 tarihinde <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/levels-and-trends-in-child-under-5-mortality-in-2020> adresinden ulařılmıştır)

Duman, M. (2007). Çocuklarda üst hava yolunda tıkanıklık oluřturan akut enfeksiyonlar. *Türkiye Klinikleri*. 50, 20-23.

Drummond, P., Clark, J., Wheeler, J. & et al. (2000). Community acquired pneumonia-a prospective UK study. *Arch Dis Child*. 83, 408-12.

Erol, M., Kaya, H., Bostan, Gayret, Ö., Yiğit, Ö., Hamilçıkan, Ş. & Can, E. (2017). Süt çocuklarında vitamin D eksikliğinin bronşiolit ciddiyeti üzerine etkisi. *J Pediatr Res.*, 4(1), 12-6.

Ertuğrul, T. & Tanman, B. (2002). *Solunum sistemi enfeksiyonları*, Pediatri, Nobel Tıp, İstanbul, 870-916.

Friedman, J.N., Rieder, M.J. & Walton, J.M. (2014). Canadian paediatric society acute care committee, Drug therapy and hazardous substances committee. Bronchiolitis: recommendations for diagnosis, monitoring and management of children one to 24 months of age. *Paediatr Child Health*.19(9), 485-91.

Gadsby, D.C., Vergani, P. & Csanády, L. (2006). The ABC protein turned chloride channel whose failure causes. *Nature*, 440(7083), 477-83.

AKG. (2022). GI for A. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 12/12/2024 tarihinde <https://ginasthma.org/gina-reports/> adresinden ulařılmıştır.

Güler, S. & Akcan, A. (2020). Astım yönetiminde okul temelli yaklaşım ve hemşirenin rolleri. *Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 9(3), 307-317.

Gündoğdu, N. (2020). Merkezimizde izlediğimiz kistik fibrozis hastalarının gastrointestinal sistem tutulumlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi. *Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Uzmanlık tezi*.

Güngör, A., Çuhacı, Ç.B., Yalçın, H., Çakır, H.T. & Karauzun, A. (2019). Çocuklarda antibiyotik kullanımı ile ilgili ebeveynlerin tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. *Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi*. 3, 202-6.

Hall, C.B., Weinberg, G.A., Blumkin, A.K. & et al. (2013). Respiratory syncytial virus-associated hospitalizations among children less than 24 months of age. *Pediatrics*.132(2), e341-8.

Hay, W.W., Levin, M.J., Abzug, M.J. & Bunik M. (2020). The newborn infant. *Current Diagnosis and Treatment Pediatrics*, McGraw Hill / Medical.

Hazır, Y. & Bozkurt, G. (2020). Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi uygulamalarının incelenmesi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi*, 13(3), 117-123.

Hızlı, Ş. & Altay, F.M. (2019). Akut Tonsillofarenjitli çocuklarda beta hemolitik streptokok varlığını gösteren belirti ve bulguların değerlendirilmesi. *Ankara Tıp Dergisi*. 19(2), 226-231.

Hockenberry, M.J. & Wilson, D. (2009). The child with respiratory dysfunction. *Wong's Nursing Care of Infants and Children*. St.Louis, Mosby, 706-62.

Hoiby, N., Frederiksen, B. & Pressler, T. (2005). Eradication of early pseudomonas aeruginosa infection. *J Cystic Fibrosis*, 4, 49-54.

Kerem, E., Conway, S., Elborn, S. & Heijerman, H. (2005). Consensus committee. Standards of care for patients with cystic fibrosis: a European Consensus. *J Cyst Fibros*, 4(1), 7-26.

Kocabaş, E., Ersöz, D.D., Karakoç, F., Tanır, G., Cengiz, A.B., Gür, D. & et al. (2009). Türk toraks derneği rehber ve uzlaşi raporları. *Türk Toraks Dergisi*. 6(2), 24-32.

Koçyiğit, M., Giran, Örtekin, S. & Çakabay, T. (2016). Otitis media, sınıflandırma ve tedaviye yaklaşım prensipleri. *İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi*. 8(2), 65-70.

Le Drévo, M.A., Benz, N., Kerbiriou, M. & et al. (2008). Annexin A5 increases the cell surface expression and the chloride channel function the Delta F508 cystic fibrosis transmembrane regulator. *Biochim Biophys Acta*. 1782, 605-614.

Matthew, S. & Kelly, T.J.S. (2015). *Community acquired pneumonia*. Philadelphia: Elsevier

Morishita, R., Franco, M.C., Suano-Souza, F.I., Solé, D., Puccini, R.F., Strufaldi, M.W.L. (2016). Body mass index, adipokines and insulin resistance in asthmatic children and adolescents. *J Asthma*. 53(5), 478-84.

Mungan, D., Çelik, G., Bavbek, S. & Mısırlıgil, Z. (2003). Pet allergy: how important for Turkey where there is a low pet ownership rate: Allergy and asthma proceedings. *Allergy Asthma Proc.*, 24(2), 137, 42.

Najada, A.S., Habashneh, M.S., Khader, M. (2004). The frequency of nutritional rickets among hospitalized infants and its relation to respiratory diseases. *J Trop Pediatr.* 50, 364-8

Novembre, E., Mori, F., Pucci, N., Bernardini, R., Vierucci, A. & de Martino, M. (2007). Systemic treatment of rhinosinusitis in children. *Pediatr Allergy Immunol.* 18, 56-61.

Öncel, S. (2009). Çocuklarda akut otitis media. *Çocuk Enfeksiyon Dergisi. Özel Sayı (1)*, 39-42.

Özçelik, U. (2019). Kistik fibroziste solunum sistemi etkilenmesi ve tedavi. *Kistik Fibrozis Aile Eğitim Kitabı*, (8/12/2024 tarihinde <https://www.kistikfibrozisturkiye.org/wp-content/uploads/2019/12/KF-Aile-e%C4%9Fitim-kitab%C4%B1.pdf> adresinden ulaşılmıştır)

Özdemir, C. (2018). Çocuklarda astımın tanımı ve yönetimi. *Klinik Tıp Pediatri Dergisi.* 10(2), 27-32.

Ramakrishnan, K., Sparks, R.A. & Berryhill, W.E. (2007). Diagnosis and treatment of otitis media. *Am Fam Physician*, 76,1650-8.

Rudge, T., & Holmes, D. (2016). *Abjectly boundless. Antibiotic classifications.* Routledge, London.

Sağlık Bakanlığı. (2020). Akılcı ilaç uygulamaları. (20/10/2024 tarihinde http://www.akilciilac.gov.tr/?page_id=682 adresinden ulaşılmıştır)

Schomacker, H. Schaap, A. Collins, P. & et al. (2012). Pathogenesis of acute respiratory illness caused by human parainfluenza viruses. *Current Opinion in Virology*. 3, 294-299.

Sim, J. M., & Finn, S. B. (2008). Oral habits in children. *Clinical Pedodontics*. Saunders Company, Philadelphia, 370-385.

Sipahi, S. & Tamay, Z. (2018). Beş yaş ve altı çocuklarda astım tedavisine güncel yaklaşım. *Klinik Tıp Pediatri Dergisi*. 10(2), 33-37.

Smith, D.K., Seales, S. & Budzic, C. (2017). Respiratory syncytial virus bronchiolitis in children. *Am Fam Physician*, 95(2), 94-99.

Somer, A., Yalçın, I. & Ağaçfıdan, A. (2006). Role of mycoplasma pneumoniae and chlamydia pneumoniae in children with community-acquired pneumonia in Istanbul, Turkey. *J Trop Pediatr*, 52, 173-8.

Soydan, D., Çam Yanık, T. & Çelebioğlu, A. (2020). Akciğerde kitle ve pnömoni tanılı bireyin bakım, Öz Tedavi Modeli' ne göre hemşirelik bakımı: Olgusu Sunumu. *BAUN Sağ Bil Dergisi*, 9(2), 127-132.

Söngüt, S. (2023). Pnömonide hemşirelik bakımı. *İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 21, 1286-1303.

Taştan Y. (2003). Krup. *Türk Pediatri Arşivi*. 38, 195-200.

Tezer, H. & Demirdağ, T. (2018). Çocuklarda akut tonsillofarenjit. *Klinik Tıp Dergisi*. 10(1), 22-29.

Topal Hançer, A. & Yılmaz, P. (2019). Balın yara iyileşmesine etkisi. *Bozok Tıp Dergisi*, 9(1), 152-159.

Topaloğlu, N., Yıldırım, Ş., Tenkin, M., Uludağ, A. & Özgen, K. (2013). Türkiye'nin batısında solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda alternatif tedavi uygulamaları. *Güncel Pediatri*, 11(1), 23-26.

Törüner, E.K. & Büyükgönenç, L. (2017). *Çocuk sağlığı temel hemşirelik yaklaşımları*. Gökçe Ofset, Ankara, 571-635

TÜİK. (2019). *Türkiye Sağlık Araştırması*. (2/10/2024 tarihinde <https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=f912fmrT8GPHHQw9RplyyqLDhf5tJV s2PNRZBMMlhn4W1Y8phmX!913810341?id=33661> adresinden ulaşılmıştır)

Türk Toraks Derneği Astım Çalışma Grubu. (2009). Astım tanı tedavi rehberi. *Türk Toraks Dergisi*, 10, 6–75.

Türk Toraks Derneği. (2011). Kistik fibrozis tanı ve tedavi Rehberi. *Türk Toraks Dergisi*, 12(1), 140.

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği. (2020). Astım tedavisinde yeni ilaçlar; astımda biyolojik ajanlar. (6/10/2024 tarihinde <https://www.aid.org.tr/astim-tedavisinde-yeni-ilaclar-astimda-biyolojik-ajanlar/> adresinden ulaşılmıştır)

Uğurlu, E., Kalkım, A. & Sağkal, T. (2014). 0-1 yaş arası bebeklerde sık karşılaşılan ağrı durumları ve ailelerin yaklaşımları. *Fırat Tıp Dergisi*. 19(1), 25-30.

Ün var, E. (2006).  ocuklarda paranazal sin s enfeksiyonlarının deęerlendirilmesi. *T rk Tabipler Birlięi*, 15(7), 121-129.

 n var, E. & G l, C.A. (2018). Akut tonsillofarenjit tan  ve tedavisinde son durum. *T rkiye Klinikleri*. 14(4), 359-63.

Vagas, E. & Akg l, A.G., (2009). Solunum sistemi fizyolojisi ve  ocuklardaki farklar. *Toraks Dergisi*, 3, 77-83.

Yaşar, A., (2019). Alt  yaşı alt   st solunum yolu enfeksiyonu olan  ocukların ebeveynlerinin akılc  antibiyotik kullanımı konusunda bilgi, tutum ve davranışlarının deęerlendirilmesi. *İstanbul Medeniyet  niversitesi*. Uzmanlık tezi.

Yayla, M.E. (2017). Birinci basamakta akut bronşiolit y netimi. *Klinik Tıp Aile Hekimlięi Dergisi*, 9(3), 3-6.

Yıldız, S. & Canbulat, N. (2008).  ocuklarda akut otitis media oluřumunda bir risk fakt r : Beslenme. *Hemřirelikte Eęitim ve Arařtırma Dergisi*, 5(2), 22-28.

Woods, C.R. (2020). Clinical features, evaluation, and diagnosis of croup. (14/11/2024 tarihinde <http://www.uptodate.com/contents/croup-clinical-featuresevaluation-and-diagnosis>. adresinden ulařılmıřtır)

BÖLÜM V

Çocuk İstismarı Farkındalığı ve Koruma Yöntemleri

Meltem PEPE

Giriş

İstismar ve ihmal, korunmaya muhtaç, savunma mekanizmaları henüz gelişmemiş olan çocuklarda, yaşanan an ve gelecek için birçok sağlık problemini içerisinde barındıran küresel bir sorundur. Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization- WHO, 2006) tarafından çocuklara kötü muamelenin tanımı yapılırken, çocuğun sağlığı, gelişmesi, yaşamı ve onuru açısından, fiilen zarar vermiş olan ya da zarar verme potansiyeline sahip her türlü fiziksel ya da duygusal kötü eylem, cinsel istismar olabilecek davranış, ihmal gibi durumların varlığı ya da oluşma durumunda çocuğun sömürü amaçlı (ticari vs.) kullanılma durumu ifadeleri kullanılmaktadır. Kötü muamele içeriğinde ise çocuklara uygulanabilecek her tür fiziksel, cinsel, duygusal, psikolojik istismar ve ihmaller tanımlaması kullanılmaktadır. İhmalin tanımlanmasında

ise, çocuğun gelişim sürecinde temel ihtiyaç olan; beslenme, barınma, giyim, sağlık, eğitim ve duygusal alanlardaki her türlü gereksinimlerin, çocuğun bakımını üstlenen anne- baba başta olmak üzere, bakım vericiler tarafından karşılanmaması durumu ifadesine yer verilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (2022), bu küresel sorundan dolayı, özellikle de fiziksel, cinsel ve psikolojik olarak, her yıl yaklaşık bir milyar çocuğun istismar ve ihmalden etkilendiğini bildirmektedir.

Amerika Ulusal Çocuk İttifakı' nın açıklamalarında kız çocuklarının dörtte biri, erkek çocuklarının ise on üçte birinin (istismarın türüne göre bu oranlar değişiklik gösterebilmektedir) istismara maruz kaldığı bildirilmektedir. Çocuk istismarının faili ise genellikle ebeveynler olarak görülürken, istismarcı (istismarda bulunana kişi) ebeveynlerin oranı ise %76 olarak verilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde istismar ve ihmalden hayatını kaybeden çocukların beş yılda sürekli bir artışla 2022 yılında tahmini 1.990 çocuğu etkilediği tahmin edilmektedir. Erkek çocuklarında tehlikenin daha fazla olduğu ve 100.000' de 3,26 ile kızlardan daha fazla hayatlarını yitirdikleri bildirilmektedir (National Children's Alliance-NCA, 2022).

İstismar ve ihmal bütün çocuklar için küresel bir risk oluştururken bazı gruplarda bu mağduriyet riskinin daha da arttığı gözlenmektedir. İstismar ve ihmale karşı koruma sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda;

- Bebekler, ifade yetersizliği olanların,
- Cinsel istismarda kız, fiziksel istismarda ise erkek grupların,

- Etnik köken, ırksal farklılıkları bulunan grupların,
- Ailesinin sosyoekonomik seviyesi düşük olanların,
- Sosyal ve tıbbi olarak dışlanmış çocukların istismar ve ihmal açısından daha fazla risk altında oldukları açıklanmaktadır (WHO, 2022; United Nations Children's Fund-UNICEF, 2024)

Bebeklik dönemi, çocuklarda istismarın en sık görüldüğü dönemlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğum sonu ilk bir yıldaki istismar mağduru bebeklerin ortalamasının %15 olduğu, ilk iki yılda ise bebeklerin %27' sinin istismara uğradığı bildirilmektedir. Cinsiyet istismarda bir diğer değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. İstismara maruz kalan kız çocuklarının oranı 8,2/1.000 iken, erkek çocuklarında bu oran 7,1/1.000 şeklindedir. Fakat istismarın türüne göre (fiziksel istismarda erkek çocuklarının mağduriyet oranları daha yüksektir) değişkenlik gösterebilmektedir (NCA, 2022; UNICEF, 2024). Sosyal ve tıbbi açılarından dışlanmış çocuklarda, özellikle de zihinsel ve gelişimsel engelli çocuklarda savunmasızlığın yüksek olması durumu onların daha çok istismara maruz kalmasına, mağduriyetlerin artmasına sebep olabilmektedir. Sağlıklı bir çocuğa göre istismara uğrama durumu bu gruptaki çocuklarda üç buçuk kat daha fazla olarak belirtilmektedir (Birleşmiş Milletler-BM, 2017). Bu denli yüksek oranlarda görülen ve çocuk sağlığı için çok ciddi riskleri bulunan istismar ve ihmalin tespitinin yapılması oldukça güçtür. Bu güçlükler aşağıda yer alan durumlardan kaynaklanmaktadır;

- Yaşın küçük olması, sözel ifadede yetersizlik,

- Yoksulluk,
- İstismar ya da olduğunu algılayamama,
- Utanma,
- İstismar ve ihmali uygulayan kişinin çocuğun birinci derece yakını ya da çevresinde yer alan kişilerden oluşması,
- Yetersiz destek faktörleri,
- Korku, tehdit edilme,
- Gizli tutulup, açıklanmaması,
- Kültürel ve toplumsal normlar, kabuller,
- Şikâyet için nereye başvurulacağının bilinmemesi durumudur (WHO, 2006; BM, 2017).

İstismar ve ihmal gibi kötü muameleye maruz kalan çocuklarda sağlık, duygusal, psikolojik, eğitim ve sosyal anlamda bütün alanlarda olumsuz etkilenimler görülebilmektedir. Çocuğa yapılan herhangi bir kötü muamele mağduriyet esnasında ve dahi sonrasında çocuk sağlığı ve beraberinde toplum sağlığı için bir tehdittir. Bu tehditler kötü muameleye maruz bırakılan çocuklarda;

- Çocukluk ve yetişkinlikte şiddete başvurma ve bunu normal olarak görme,
- Depresyon gibi ruhsal problemler,
- Sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar,
- Yeme davranışlarında değişiklik ve obezite,

- Düşük benlik saygısı,
- Kognitif fonksiyon bozuklukları,
- Riskli cinsel davranışlar,
- İstemedenden gebe kalma,
- Hastalık,
- Engellilik,
- Ölümle sonuçlanabilmektedir (WHO, 2006).

Dünya genelindeki bütün çocuklar için korkudan, her türlü şiddet, istismar ve ihmalden uzak, daha iyi bir gelecek ve özgür bir dünya inşası için bütün kurumların iş birliği içerisinde çalışması elzemdir (BM, 2017). 2030 yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin içerisinde değerlendirilen çocuğa dair düzenlemeler bu sorunların çözümünü de hedeflemektedir. Çocuk sağlığını ciddi ölçülerde tehdit edebilecek bir durum olan istismar ve ihmal, ulusal ve uluslararası düzeyde oldukça sık karşılaşılan evrensel ve tespiti güç bir sorundur. Mağdurun çocuk olması istismarın tespitini zorlaştırırken aynı zamanda çocuğun korkması, ifadesinin yetersiz olması, savunma mekanizmalarının gelişmemiş olması gibi daha birçok sebepten dolayı istismarın tekrarlanabilirliğini de arttırmaktadır. Çocuk istismarı hem çocuk sağlığı hem de uzun vadede görülen olumsuz etkilerinden dolayı toplum sağlığını tehdit eden ciddi bir durumdur. İstismarın belirtilerinin farkında olunması, bu belirtilere rastlanıldığında en kısa sürede doğru bir şekilde tespitinin yapılarak, gerekli önlemlerin alınması elzemdir. Pek çok çeşidi olan istismar ve ihmalden çocukların korunabilmesi için, toplumun farkındalığı önemlidir. Özellikle çocukla birebir temas

halinde olan aile üyeleri, öğretmenler ve sağlık çalışanlarının istismar ve ihmalin belirtileri konusunda bilgi sahibi olmaları, böyle bir durumun tespiti halinde koruyucu önlemler ve yapılması gerekenlerden haberdar olmaları gerekmektedir (Aktay, 2020; Özçetin, 2024).

1. Geçmişten günümüze çocuk kavram ve istismarı

Tarihsel süreç içerisinde, çocuğa yönelik algı, verilen değer ve yüklenen misyonlar gibi alanlarda yaşanan değişimler, bu kavramın da farklılık göstermesine sebep olmuştur. Tarih öncesi dönem, insan yaşamı ve çocuğa dair kati bilgilerin bulunmadığı fakat engelli doğan, istenilen cinsiyete sahip olmayan ya da yılın istenmeyen zamanlarında dünyaya gelen bebeklerin ihtiyaçlarının karşılanmayarak, ölüme terk edilebildiği zamanlar olarak belirtilmektedir. Yine bu dönemde yetişkin kadar değer, saygınlık ve önem atfedilmeyen çocukların, sadece geleceğin yetişkinleri olacakları için kabul görmekte oldukları bildirilmektedir. Aynı zamanda erkek çocuklarının daha fazla fiziki güce sahip oldukları düşünüldüğü için kız çocuklarına kıyasla daha çok toplumsal kabul gördükleri de belirtilmektedir (Çavuşoğlu, 2013).

İlk çağda ise Hammurabi Kanunlarında çocuğa ilişkin değerlendirmelerin olduğu görülmektedir. Bu kanunlara göre, çocuk sıklıkla babanın bir eşyası gibi görülürken, bir birey olarak yok sayılmakta ve çocuktan sürekli itaat beklentisi bulunmaktadır. İtaate zorlayan kati hükümlerde; çocuğun kendisini büyüten babasına karşı saygısızlıkta bulunması durumunda yine babası tarafından ağır cezaların verilebileceği gibi maddelerin yer aldığı görülmektedir. Bu cezalar, suça göre değişkenlik gösterirken, çocuğun el, dil ve göz gibi uzuv ve organlarının kaybına varacak kadar da ağır

olabilmektedir. Aynı zamanda çocuk babası tarafından borca karşılık teminat olarak gösterilebilirken, köle olarak da satılabildiği belirtilmektedir (Erkut, Balcı & Yıldız, 2017).

Eski Mısır döneminde, yapılan kazı çalışmalarında bulunan oyuncakların varlığı çocuk gelişimine önem verilmiş olabileceğini düşündürmektedir. Fakat bu olumlu gelişimin bütün toplumları kapsamıyor olabileceği de bildirilmektedir. Bu dönemde cinsiyet farklılıklarına göre, kız ise anneye (yemek pişirme, dikiş vs.), erkek ise de babaya (tarım işleri vs.) ait işlerde yardımcı oldukları belirtilmektedir. Toplumda değişen ekonomik sınıfın da çocuk gelişimi üzerinde oldukça belirleyici olduğu görülmektedir. Varlıklı ailelerde yetişen özellikle erkek çocukların okula gönderildiği, okuma-yazma ve matematik gibi alanlarda eğitim aldığı belirtilmektedir (Lambert, 2008).

Antik Yunan ile Roma uygarlıklarında ise yine babanın çocukları üzerine sonsuz otorite ve sahipliği bulunmaktaydı. Bu sahiplik babaya istediği zaman çocuğunu terk etme, satma, sakat bırakma ve öldürme gibi çocuğu değersizleştiren haklar tanımaktaydı. Aynı zamanda çocuğun fiziki özellikleri, güzelliği aile için toplumsal bir statü olarak değerlendiriliyor, çocuklar belli şartları sağladığında kabul görüyordu (Uğur, 2018).

Orta çağda yine değersiz olarak görülen çocuklara kötü davranıldığı belirtilmektedir. Çocukların küçük birer yetişkin olarak görüldüğü, özel bir varlık olarak değerlendirilmediği ve bir mülk parçası gibi görülmekte olduğu belirtilmektedir. Çocuğun önem kazanması, kutsal dinlerin gelişiyi başlarken özellikle İslam’ da çocuk bir birey olarak değerlendirilmiş, ebeveynler ve toplumda

çocuğa karşı merhamet, koruma gibi davranışlar gelişmiştir. Kavramsal düzeyde çocuğa ise, Rönesans döneminde Jean Jack Rousseau’ nun eseri olan ‘Emile adlı kitapta yer verilmiştir. Bu kitapta bebek beslenmesi, hijyen ve çocuk hakları gibi konulardan bahsedilmektedir. Sanayi devrimine gelindiğinde ise ucuz iş gücü olarak değerlendirilen çocukların, uygunsuz koşullarda, uzun saatler boyunca çalıştırıldığı belirtilmektedir (Lambert, 2008).

On dokuzuncu yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başlarına gelindiğinde ise akademik araştırmalarda, çocuğun biyolojik, psikososyal, zihinsel, ahlaki gelişimine yer verildiği, çocuğun gelişim ve eğitime önem vererek çocuğun bir birey olarak değerlendirildiği dönemler başlamıştır. Teknolojik ve bilimsel ilerleme ve refah düzeyindeki artışla birlikte çocuk yaşamında da paralel iyileşmeler görülmüştür. Çocuğun bir yetişkinden farklı olarak büyüme ve gelişme periyoduna, fizyolojik, psikolojik özellik ve gereksinimlere, bütün bunlara uygun olarak geliştirilmesi gereken yaklaşımlara ihtiyaç duyduğuna ilişkin algılarda gelişmeler yaşanmıştır. Bu çerçevede çocuklar için gerekli olan bakım standartları geliştirilmeye başlanmış ve çocuk bakımının sadece aile değil toplumun da sorumluluğunda olduğuna kanaat getirilmiştir (Erku, Balcı & Yıldız, 2017; Uğur, 2018).

Bütün bu gelişmelerden sonra yapılan yasal düzenlemelerle de (Çocuk Hakları Cenevre Bildirisi, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu-UNICEF vs.) çocuk kavramı ve hakları yasal olarak koruma altına alınmıştır. Günümüzde çocuk kavramı için, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (1948)’ nde bahsi geçen, erken yaşta reşitlik kazanım durumu haricinde, on sekiz yaşına kadar herhangi bir ayırım (cinsiyet vs.) gözetmeksizin her insanı

kapsayacak şekilde yapılmış olan tanımlama kullanılmaktadır. Görüldüğü üzere modern tarihe gelinip çocuğun dünyası keşfedilinceye kadarki süreçte çocuk, sürekli olarak istismar ve ihmalin çeşitli türlerine maruz kalmıştır. Bu istismar ve ihmal bazen toplumsal gerekliliklere bazense kültürel, geleneksel yapıya dayandırılmış fakat bu süreçten önce çocuk, sonrasında da gelecek nesiller bundan zarar görmüştür. Günümüzde halen toplumun bazı kesimlerinde çocuğa karşı istismar ve ihmal davranışları görülse de çocuk hakları resmî kurumlarca ve yasal düzenlemelerle Birleşmiş Milletler (BM), UNICEF, WHO, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-ASPB gibi resmî kurumlarca korunmaktadır (WHO, 2006; UNICEF, 2010; BM, 2017; ASPB, 2017; UNICEF, 2018).

2. Çocuk istismarı

Kültür ve toplumsal normlar insanların algı ve yaşam şekilleri üzerinde belirleyiciliğe sahiptir. Bu değişimlerin belirleyici etkisiyle istismar kavramının da kültür ve toplumlar arasında farklı tanımlanabildiği görülmektedir. Toplumsal normlar göz önünde bulundurularak, uzman otoritelerce geniş çapta tanımlanmak istenilen istismar kavramı için; yetişkinlerin sorumlu olduğu, çocuğun gelişiminde duraksamalara sebebiyet veren ya da kısıtlayan, ona zarar verebilecek ya da zarar verici olarak nitelendirilebilecek, çocuk için uygun olmayan eylem ya da eylemsizlikler bütünü ifadesi kullanılmaktadır. Yetişkinlerin çocuklara kasti olarak uyguladığı, önemsemediği ya da görmezden geldiği bu istenmeyen eylemler, çocuğun sağlık ve güvenliğini tehlikeye atabilmekte, çocuğa fiziksel, ruhsal ve cinsel açılardan zarar verebilmektedir (Butchart & ark., 2006; NCA,2022; Özçetin, 2024).

Çocuk istismarı, geniş çapta çocukların sağlık, büyüme ve gelişme, hayatta kalma, güven ve beceriler gibi faaliyetlerini olumsuz etkileyen, fiziksel, cinsel ve duygusal alanlar başta olmak üzere çocuklarda her türlü istismar, ihmalin varlığı ve sebebiyet verebilecek durumların oluşması şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda çocukların ticari amaçlı kullanımı, reklam malzemesi haline getirilmesi ve her tür sömürü malzemesi olarak kullanılması gibi, çocukları olumsuz etkileyebilecek diğer bütün etkilenim şekilleri de dahil olmak üzere, çocukların bu tarz tutum ve davranışlara maruz bırakılması durumu ifadesi kullanılmaktadır (WHO, 2006, BM, 2017). Henüz algısı yetişkin düzeyinde gelişmemiş olan çocuğun farkındalığının olmaması (istismar veya şiddet olarak algılamaması) veya istismar içeren bir davranışın yetişkin tarafından bilinçli/bilinçsiz olarak yapılması durumu, bu davranışın istismar olması için bir koşul olarak kabul edilmemektedir. Dünya sağlık örgütünün yapmış olduğu bu tanımlamalarda kültürler arasında değişen bu normlara karşı da çocuğun uluslara arası düzeyde güvenceye alınmasını hedeflemektedir (Butchart & ark., 2006; WHO, 2002). Gerek uluslararası gerekse ulusal düzeyde çocuk istismarını önlemeye yönelik önlemler sürdürülse de günümüzde halen çocuk istismarı görülmektedir. Çocuk istismarı, fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik açılardan değerlendirilmekte ve dört ana başlıkta toplanmaktadır (Tıraşçı & ark., 2007). Uluslararası düzeyde halen çocukların oldukça sık fiziksel ceza ya da psikolojik saldırganlığa maruz kaldığı görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (2022) beş yaş altı her on çocuktan altısının düzenli olarak bakım vericisi (genellikle ebeveynler) olan kişi tarafından fiziksel ceza ve

psikolojik şiddete maruz bırakıldığını açıklamaktadır. Bölge bazında değerlendirme yapıldığında çocuklar açısından istismar veya ihmal sayılabilecek fiziksel ceza ya da psikolojik saldırıya maruz kalan çocukların; Orta Amerika %55,8, Orta Asya %62,6 ve Orta Afrika içinse %87,9 ortalamalarına sahip olduğu görülmektedir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri bu oranlar üzerinde etkili olsa da bütün bölgeler için bu olumsuzlukların erkek çocuklar için daha sık ve rakamların bütün bölgeler için halen oldukça yüksek görüldüğü belirtilmektedir (UNICEF, 2023). İstismar ve ihmal üzerinde titizlikle çalışılması gereken önemli bir halk sağlığı sorunudur ve küresel boyutta 2-17 yaş arasındaki çocukların %50'sinin bu olumsuz durumlardan etkilendiği düşünülmektedir (Dünya Sağlık Örgütü, 2022). Çocuklara Yönelik Zulmü Önleme Ulusal Derneği (2017) tarafından Birleşik Krallıkta 2016 yılı için 58.000' den fazla çocuğun istismar ve ihmal sebebiyle korunma altında olduğu belirtilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK, 2022)' nun açıklamalarına göre güvenlik birimlerine getirilen çocukların %43,1' ini mağdur çocukların oluşturduğu açıklanmaktadır. Bu çocukların %58,5'i yaralanma, %13,7' si cinsel suçlar, %8,7' sinin ise aile düzenine karşı işlenen suçlarda mağdur olarak yer aldıkları bildirilmektedir.

2.1. Fiziksel istismar

Fiziksel istismar basit ve kapsayıcı tanımlamasıyla, çocuğun başına gelebilecek kaza haricindeki bütün fiziksel yaralanmalar şeklinde tanımlanabilmektedir. Fiziksel istismar ve cezalar çocukların kötü muamele ve cezalardan korunma hakkını ihlal eden, onların sağlığı, gelişimi, eğitimi ve vücut bütünlüğüne zarar veren, insan onuruna aykırı, insanlık dışı, zalimce ve aşağılayıcı

muameleler bütünüdür (UNİCEF, 2021; NCA, 2022). Fiziksel istismar, çocuğun vücudunda genellikle fiziksel bir iz veya hasar bırakan, zaman zaman sakatlık ya da ölümle sonuçlanabilecek kadar ciddi travmalara sebebiyet veren erişkin davranışlarını kapsamaktadır. Fiziksel istismar, bulgularının gözle görülebilir ve uluslararası düzeyde en sık görülen istismar şekli olması nedeniyle istismar denildiğinde en sık akla gelen türdür. Fiziksel istismar, sıklıkla üç yaş altı ve 15-19 yaş arası çocuklarda, erişkin birisinin fiziksel olarak uyguladığı şiddet dolayısıyla görülmektedir (Tıraşçı & ark., 2007; UNİCEF, 2021; Özçetin, 2024).

Genellikle ebeveynler tarafından çocuğu cezalandırmak ya da terbiye etmek amacıyla gerçekleştirilen, çocuğun vücudunda herhangi bir alana hafif ölçüde vurmak, sarsmak, diline ya da ağzına biber sürmek, kulağını, saçını vs. çekmek, orta seviyede fiziksel olarak istismar kabul edilebilecek davranışlar olarak sıralanmaktadır. Çocuğa vurmada uygulanan şiddetin artırılması, herhangi bir yerini yakmak veya boğmak gibi davranışlar şiddetli fiziksel istismar olarak kabul görmektedir (Aktay, 2020; Özçetin, 2024). Uygulandığı süreçte yetişkinin herhangi bir alet kullanıp kullanmaması durumuna göre fiziksel istismarın uygulanma şekilleri iki alt başlıkta değerlendirilmektedir. Fiziksel istismar esnasında alet kullanılmayan; gibi istismar şekilleri aletsiz fiziksel istismar kategorisinde değerlendirilmektedir. Fiziksel istismar çocuğa uygulama şekillerine göre aletli ve aletsiz olarak iki bölümde incelenmektedir. Herhangi bir alete başvurulmadan gerçekleştirilen, çocuğun vücudunda yaralanmalara sebebiyet veren istismar şekli aletsiz fiziksel istismar olarak tanımlanmaktadır. Çocuğa tokat ya da yumrukla vurmak, fırlatmak, sarsmak, itip-kalkmak, çimdiklemek,

ısırmak ve boğmak gibi istenmeyen eylemler buna örnek olarak verilebilir. Çocuğa karşı uygulanan fiziksel istismarda alet kullanarak çocuğu yaralama eylemi, aletli fiziksel istismar olarak tanımlanmaktadır. Çocuğa uygulanan fiziksel şiddette, kemer, ütü, tava-tencere, kayış, hortum, sigara ve çay, kahve gibi sıcak içeceklerin kullanımı aletli fiziksel istismarın örneklerindendir (Müderrisoğlu & ark., 2014; WHO, 2006; UNICEF, 2021).

Fiziksel ve zihinsel anlamda engeli ya da öğrenme güçlüğü bulunan veya kronik bir rahatsızlığa sahip çocuklar, fiziksel istismar açısından daha riskli grup olarak değerlendirilmektedir. Fiziksel istismara uğrayan çocukların aile profili değerlendirmelerinde sıklıkla sorun olduğu tespit edilmiştir. Bu ailelere bireylerine ilişkin; eğitim, sosyal ve ekonomik statülerin zayıflığı, sık tekrarlayan aile içi sorunların varlığı, aile içi iletişim sorunları ya da şiddet varlığı, aile üyelerinden en az birisinin alkol ya da madde kullanımının olması, psikiyatrik problemler, çocukluklarında istismar görmüş ihmale uğramış anne/baba ve destek faktörlerinin yetersizliği gibi durumların varlığında fiziksel istismarın artış gösterdiği belirtilmektedir (ASPB, 2017; Malgaz Güçlü & Acemioğlu, 2020; Türkkan, Odacı & Bülbül, 2021).

Bazı aile ve toplumlarda halen fiziksel şiddet kültürel bir yapı olarak devam ettirilmekte ve bir norm halinde devamlılığını sürdürmektedir. Bu aile ve toplumlarda şiddet; çocuğun terbiyesi için bir eğitim aracı, başarısızlığı için bir ceza ya da ders niteliğinde, itaatkâr olmayışı ya da diğer bir ifadeyle asiliğinden dolayı halen normal karşılanabilmektedir (Aktay, 2020; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu-SHÇEK, 2010). Ülkemizde de toplumun bazı kesimlerinde halen ebeveynler tarafından çocuğa disiplin

eđitimi vermek adına fiziksel istismarın uygulandıđı ve bu tarz davranıřların da toplum tarafından halen “dayak cennetten çıkmadır” gibi atasözleriyle desteklendiđi görülebilmektedir. Bu tarzdaki durumların varlıđı, aile ve toplumun fiziksel istismar davranıřı olan eylemleri, normal ve hatta gereklilik olarak nitelendirmesi, istismarın önlenmesinin önündeki en büyük engellerden birisidir (ASPB, 2017; Wang & ark., 2024).

Çocuklarda fiziksel istismarın belirtileri;

- Tedavi amacıyla hastaneye getirilen çocukta, hastaneye başvuruda izah edilemeyen gecikme
- Çocuđun vücudunda fiziksel istismar belirtisi olabilecek bir belirti gözlemlendiđinde; o belirtinin sebebini açıklamayacak řekilde, sürekli deđişiklik gösteren tutarsız açıklamaların varlıđı ya da bu belirtiyile ilgili hiçbir açıklamanın yapılmaması
- Ebeveynler tarafından öykü ve çocuktaki fiziksel yaralanmalar arasında uyuşmazlık
- Ebeveynlerin yaralanmanın kardeşten kaynaklandıđını beyan etmeleri
- Çocuđun yaşı ve gelişim özellikleri ile tutarsız öykü,
- Ailede yer alan diđer kardeşlerde de benzer yaralanma öykülerinin bulunması,
- Çocuđa karşı ilgisiz ebeveyn ya da bakıcıda düşmanca tavırların varlıđı,

- Çocuğun ebeveynlerine karşı suçlayıcı olumsuz ifadelerin varlığı,
- Çocukta ifadesiz -ilgisiz (donuk) bakış varlığı,
- Çocuğun aşırı uçlarda hassasiyet veya duyarsızlığı,
- Çocuğun ağırlı uyaranlara karşı duyarsızlığı,
- Ebeveynlerin çocuğun öyküsünde belirttiğı sürelerden daha eski dönemlere ait lezyonların olması durumu,
- Çocukta farklı türde yanık veya kesi gibi lezyonların bir arada bulunması,
- Ebeveynlerin aktardığı tek bir sebebe bağı birden çok lezyonun bulunması durumu,
- Çocuğun vücudunda örtölmeye, gizlenmeye çalışılan yaraların olması durumu şeklindedir (Müderrişoğlu & ark., 2014; Özçetin, 2024).

Yukarıda bahsi geçen durumların biri veya birkaçının birlikte bulunması durumunda fiziksel istismardan şüphelenilmesi ve ilgili birimlerle iletişim kurulması gerekmektedir. Çocuklarda görölebilecek bahsi geçen fiziksel istismar belirtilerinin yanı sıra sıklıkla kas-iskelet sistemlerine ait yaralanmaların görölebileceğı de unutulmamalıdır. Bebeklik dönemi fiziksel istismar bulgusu gözlenmesi durumunda ise, sarsılmış bebek sendromu açısından dikkatli olunması gerekirken, bu durumun iç organlar, santral sinir sistemi gibi alanlarda hasarlanma veya kalıcı anomali oluşturma ihtimali de unutulmamalıdır (Aktay, 2020).

Çocuklarda fiziksel şiddet uluslararası çapta çözüm gerektiren ciddi bir sorundur. Özellikle çocuklar yaşadıkları evlerde fiziksel şiddete maruz kalmaktadırlar. Çocuk nüfusunun ortalama üçte ikisinin halen yaşadıkları evlerde ve düzenli olarak şiddet içeren cezalara maruz bırakıldığı belirtilmektedir. Bu çocukların üçte ikisinden fazlasının ise fiziksel cezaların yanı sıra psikolojik saldırıya uğradığı da bildirilmektedir. Her yıl ortalama 130.000 çocuk şiddet sebebiyle hayatını kaybetmekte ve bu çocukların çoğunluğunu ise 15-19 yaş grubu sıklıkla da erkek çocuklarının oluşturduğu bildirilmektedir (UNİCEF, 2024). Fiziksel istismarla ilgili prevalansın konu alındığı uluslararası çapta gerçekleştirilmiş bir meta analiz çalışmasında istismar mağduru çocukların oranı %22,6 olarak belirtilmiştir (Stoltenborg & ark., 2015).

Ülkemizde aile içi şiddet araştırması, 0-8 yaş arasındaki çocuklara yönelik fiziksel istismar sonuçlarına göre; düşük düzey istismar olarak nitelendirilen (hafif şekilde vurmak, terlik gibi nesneler fırlatmak, sarsmak veya itelemek, saç ya da kulak çekmek) eylemlere ebeveynlerin %22,5' inin başvurduğu, yüksek düzeyde istismar olarak kabul edilebilecek (çocuğun vücudunda herhangi bir yeri yakmak veya boğazını sıkmak, bıçak ve silah gibi, kesici ve delici herhangi bir aletle çocuğu tehdit etmek ya da bunları çocuğa karşı kullanmak) davranışlara başvuran ebeveynlerin ise %1,1 olduğu belirtilmektedir. Düşük ve yüksek düzey fiziksel şiddetin en sık 5-9 yaş arasında artış gösterdiği ve oranların sırasıyla %29,9 ve %1,7 olduğu bildirilmektedir. Kendi çocukluğunda şiddet deneyimleyen erkek ve kadınlarda ise çocuğuna yönelik uyguladığı şiddet oranlarının artış gösterdiği bildirilmektedir (Müderrişoğlu & ark., 2014). Şiddete maruz kalan çocukların her beş dakikada bir

çocuğun ölümüne sebebiyet verebilecek kadar trajedik sonuçları da görülebilmektedir (BM, 2017).

Bu davranış şekillerinin, bazı toplum ve kültürlerde halen istismar olarak algılanmaması veya tanımlanmaması, fiziksel istismarın en çok evde uygulanıyor oluşu, devletler tarafından kanun düzenlemelerinin yetersizliği, fiziksel istismarın önlenmesinin önündeki en önemli engellerdendir (Aktay, 2020; Wang, 2024). Aynı zamanda şiddetin bir sorun çözme yöntemi, çocuğu cezalandırma aracı veya ebeveynlerin saygınlık kazanma yöntemi olduğu ortamlarda büyüyen çocukların da yetişkinlik dönemlerinde şiddeti normal karşıladıkları özellikle de kendi eş ve çocuklarına şiddet uygulama oranlarının daha yüksek olduğu bildirilmektedir. Bu süreç gerekli önlemler alınmadığında çocuğun fiziksel sağlığından başlayarak sağlığın (psikolojik, gelişimsel vb.) diğer alanları ve sonrasında toplum sağlığına etkisi devam edebilecek ciddi bir sarmal süreçtir ve her türlü fiziksel istismarın fark edildiği anda ilgili birimlere bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması elzemdir (BSHÇEK, 2010; UNICEF, 2018, UNICEF, 2023).

2.2. Cinsel istismar

Çocuklarda cinsel istismar diğer istismar türlerine kıyasla tespit edilmesi oldukça zor, çeşitli sebeplerden dolayı saklanılmaya meyilli ve uzman otoriteler tarafından farklı tanımlamaları yapılan olumsuz bir durumdur. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB, 2017) çocuklarda cinsel istismarı WHO' ın tanımlamasından da faydalanarak, çocukların anlamlandıramadığı bir cinsel olayın içerisinde yer alması, bu olumsuz deneyime çocuğun gelişimsel olarak hazır olmadığı veyahut onayı olmadan olayın gerçekleştiği durumların aynı zamanda toplumsal tabu ve yasal süreçleri ihlallerle

gerçekleşen her türlü hak ihlali durumudur, şeklinde ifade edilmektedir. Çocuklarda cinsel istismarla ilgili Amerikan Ulusal Çocuk İstismar ve İhmal Merkezi (AUÇİİM, 1991), çocuk ve yetişkin arasında temas ya da ilişki durumu, temasta bulunan yetişkin ya da başka birisinin cinsel uyarımı için kullanılmış/kullanılıyorsa, çocuğun cinsel istismarı olarak nitelendirilir. Cinsel istismar çocuk sağlığının bütün boyutlarıyla zarar görmesine sebebiyet verirken aynı zamanda ciddiyle onur zedeleyici, hukuki boyutları olan ve toplum sağlığı için de gelecekte risk oluşturabilecek bir durum şeklinde tanımlanmaktadır (WHO, 2022). Cinsel istismarda bulunan kişi bir yetişkin olabilirken bazen istismarcının başka bir çocuk olduğu durumlar da görülmektedir. İstismarcının çocuk olduğu durumlarda, istismarcı çocuğun mağdur üzerinde belirgin bir güç farkı, kontrolü veya belirgin yaş farkı bulunduğu durumlarda da yine bu durum cinsel istismar olarak değerlendirilir. Tanımlamalarda sıklıkla fiziksel temas bulunması durumları cinsel istismar olarak nitelendirilirken, günümüzde çocuğa fiziksel temasın bulunmadığı ama cinsel içerik barındırarak ona zarar verebilecek bazı durumlar da istismar olarak tanımlanmaktadır. Bu eylemler ise aşağıdaki gibidir;

- Bir yetişkin tarafından çocuğa yöneltilen her türlü cinsel içerik ifadeleri,
- Çocuğun özel bölge alanlarına bakılması,
- Çocuğa her iki cinse de ait olabilecek, çıplak fotoğrafların gösterilmesi,
- Yetişkinin özel bölgelerinin çocuğa gösterilmesi,

- Çocukların cinsel içerik barındırabilecek her türlü fotoğrafın çekilmesi ve kullanımı,
- Çocuklara cinsel içeriğe sahip fiili hareketlerin izlettirilmesi ya da dinlettirilmesi durumları da cinsel istismar sayılabilecek davranış türlerindendir (ASPB, 2017).

Cinsel istismarın tespit edilen vakalardan çok daha fazla sayıda olduğu ve tespiti zor bir istismar türü olduğu belirtilmektedir. Çocuklarda cinsel istismar durumunun tespitini zorlaştıran faktörler olarak;

- Yaş grubunun küçük olması, olayın tanımlamasını yapamaması
- Yine küçük yaş gruplarında sözel ifade yetersizliği,
- İstismarın açıkladığında oluşabilecek sonuçlardan korkulması (Özellikle fiziksel şiddet gibi sonuçlar),
- Aile ve değer verilen kişilerin utandırılacağına düşünülmesi,
- Suçlanma kaygısı,
- Reddedilmeye ilişkin kaygılar,
- İfadelerine inanılmayacağına ilişkin kaygılar
- Mağdurun başının belaya gireceğine ilişkin korkuları,
- Mağdurun pahalı hediyeler ve vaatlerle kandırılarak susturulması durumu,

- İstismar dolayısıyla mağdurun kendisini suçlu hissetmesi/hissettirilmesi,
- İstismarcının özellikle birinci derece yakınlığının olduğu durumlarda çocuğun ailesini koruma çabası,
- Çocuğun yaşadığı istismarı ifade etmeye engel olacak düzeyde bir engelinin bulunması durumunun bulunması sıralanmaktadır (Selvi & ark., 2011; NCA, 2022).

Çocuklarda cinsel istismar görülmesi durumunda verilebilecek olan tepkiler çocuğun yaş gruplarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu yaş grupları genellikle dokuz yaş ve öncesi, on yaş ve sonrası dönem olarak iki kategoride değerlendirilmektedir.

Cinsel istismar mağduru 0-9 yaş arası çocukların verebileceği tepkiler;

- Normalden çok daha sık ve şiddetli ağlama krizleri,
- Çocuğun güvende hissettiği kişiden (anne, baba, bakım verici vs.) ayrılmak istememesi,
- Uyku rutininin bozulması, uykuya dalmada zorluk ya da sürekli uyumaya meyil,
- Gelişimsel gerileme olarak konuşma becerisini, idrar ya da gaita boşaltım kontrolünü kaybetme,
- Çocuğun yaşıyla uyumlu olmayacak şekilde çok cinsel eyleme ilişkin bilginin olması,
- Çocuğun yaşıyla uyumsuz olarak cinsel eyleme ilgisinin bulunması,

- Belirli mekân ve kişilere karşı aşırı korku tepkisi,
- Çocuğun sürekli olarak özel bölgesiyle ilgilenmesi ya da dokunması,
- Çocuğun çevresinden uzaklaşarak daha içine kapanık bir kişiliğe bürünmesi,
- Aşırı şekilde yemek yeme eylemi ya da tamamen yemeyi reddetme durumu,
- Çocuğun dışarıya çıkma ya da okul dönemindeyse okula gitmeyi ani olarak reddetmesi durumu şeklindedir (NCA, 2022; Türkkân, Odacı & Bülbül, 2021).
- Cinsel istismar mağduru 10-18 yaş arası çocukların verebileceği tepkiler;
- Kronik anksiyete veya depresyon gibi psikiyatrik duygulanım bozukluklarının görülmesi,
- Sık sık ve şiddetli ağlama ya da ani gelişen hissizlik,
- Uyku problemleri (uykuya dalmada güçlük, kabuslar vs.),
- Okula uyumda sebepsiz yere sorunların görülmesi ya da okula girmenin reddedilmesi,
- Ani gelişen öfke problemleri, kavgaya meyillilik, saygısız olarak atfedilen davranışların sıkça sergilenmesi,

- Aile ve arkadaşlara karşı ilgisizlik ya da uzaklaşma eylemi,
- Çocuğun kendisine zarar verebilecek ya da kötü alışkanlıklar edinmesi (sigara, alkol, madde bağımlılığı, kendini yaralama, intihar denemesi vs.)
- Yemek yeme alışkanlıklarında değişiklikler, özellikle de sürekli yeme eylemiyle obeziteye meyil durumları şeklindedir (Çengel, Çuhadaroğlu & Çetin, 2007; ASPB, 2017).

Cinsel istismara maruz kalan çocuklarda genellikle duygusal ve psikolojik olarak, çocukların gelişimlerini de olumsuz anlamda etkileyecek bir dizi durum gelişebilmektedir. Bu durumlar, mağdur olan çocuğun duygularında, özellikle de istismarın açıklandığı kişilerin vermiş olduğu tepkiler neticesinde şekillenen karışıklık yaşayabileceği, bu duyguların suçluluk, utanç, üzüntü, değersizlik hissi, öfke, çaresizlik, geleceğe dair sürekli kaygı, korku ve beklentisizlik, yaşama dair heves ve olaylara dair ilgi azalması ya da kaybı, kişilik değişiklikleri, posttravmatik stres bozuklukları ve depresyon olarak verilmektedir (ASPB, 2017; (Özdemir & ark., 2018; Türkan, Odacı & Bülbül, 2021).

Çocukların cinsel istismara maruz kalmasında risk faktör sınıflaması, çocuğa, aileye ve istismarcıya ait özelliklere göre üç başlıkta incelenmektedir. Mağdur çocuğa ilişkin, istismara maruz kalma ihtimalini arttıran sebepler; fiziksel ya da zihinsel engelin bulunması, sosyal anlamda daha izole ve yalnız yaşama, itaatkarlık, bir yetişkin tarafından sürekli ilgi bekleme ya da beğenilme kaygısının yüksek olması, fiziksel olarak daha dikkat çekici olma

gibi durumlar sıralanmaktadır. Yetiştği ailedeki farklılıklar açısından cinsel istismara uğrama durumunda riskli grupta yer alan çocukların ailelerinde; aile yapısında bozulmaların olduğu parçalanmış, tek ebeveynli, sosyoekonomik problemleri olan, şiddetin sıklıkla görüldüğü, annenin evde bulunduğu zamanı kısıtlı olan, evde üvey ebeveyn faktörü bulunan, bağımlı, psikiyatrik bir rahatsızlığı olan ya da çocukluğunda kendisi cinsel istismara uğramış anne/baba gibi farklılıklar yer almaktadır. Çocuk istismarında istismarcıya ait özelliklerde; genellikle erkek olma durumu, düşük sosyoekonomik seviye, kendi yaşam öyküsünde cinsel istismar bulunan, çocukluğunda aile içi şiddete maruz kalmış, sosyal anlamda izole yaşayan, özgüven, saygınlık veya benlik saygısı düşük olan kişilerin sıklıkla yer aldığı görülmektedir (Müderrişoğlu & ark., 2014; Özdemir & ark., 2018; Türkan, Odacı & Bülbül, 2021).

Çocuklarda görülen cinsel istismar vakalarında, istismarcının aile içi üyeler ya da yakın akrabalar olabileceği gibi aynı zamanda istismarcı tamamen yabancı birisi olarak da görülebilmektedir. İstismarcının akraba, çocuklar tarafından tanınan çevrede yer alan kişilerden oluşabileceğini bildiren çalışmalar oranların %40,7 ile %80 arasında değişiklik gösterdiğini bildirmektedir (Çengel, Çuhadaroglu & Çetin, 2007; Yektaş & ark., 2018). İstismarcıların özellikleri ile ilişkili bir diğer çalışmada ise istismarcıların sıklıkla erkek (%96) ve bu kişilerin %80' inin çocuğun tanıdığı akraba ya da çevrede yer alan bireylerden oluştuğu belirtilmektedir (Hancı & Özdemir, 2002). Uluslararası düzeyde bir milyar çocuğun cinsel şiddete-istismara maruz bırakıldığı açıklanmaktadır. Kız ve erkek çocuklarında farklı olan cinsel istismar mağduriyeti oranları sırasıyla

1/5 ve 1/7 şeklindedir (WHO, 2022). Avrupa'daki çocukların ise beşte birinin cinsel şiddete maruz bırakıldığı tahmin edilmektedir (NCA, 2022). Cinsel istismar ile ilgili verilerin kısıtlı olmasının yanı sıra açıklanan rakamlar dahi oldukça çarpıcıdır. Amerika ve Kanada gibi ülkelerin de yer aldığı 19 ülkeyi kapsayacak şekilde veri değerlendirmesi yapan bir çalışmada epidemiyolojik olarak kız çocuklarının %7-36, erkek çocukların ise %3-29 oranda cinsel istismara maruz kaldığı, kızların cinsel istismar olarak daha fazla risk altında oldukları belirtilmektedir (Finkelhor, 1994). İsveç' te penetrasyon (oral, anal, vajinal) içeren cinsel istismara yönelik kız çocuklarının %2,5, erkek çocuklarının ise %0,6 oranında maruziyetlerinin olduğu bildirilmektedir (Mohler-Kuo & ark.,2014).

Ülkemizde de uluslararası düzeyde görüldüğü gibi cinsel istismar verilerinin gerçek oranları yansıtmayabileceği ve gerçekte vakaların daha çok olabileceği bildirilmektedir (ASPB, 2017). Ülkemizde gerçekleştirilen cinsel istismar çalışmalarında, çocukların %10 ila %40' ının cinsel istismara maruz kaldığı, bu çocukların ise %53' ünün 14 yaşından küçük oldukları bildirilmektedir (Erdoğan & ark., 2011). Türkiye' de penetrasyon içerikli cinsel istismar oranları, kız çocukları için %27 olarak belirtilmektedir. Türkiye' de cinsel istismar dolayısıyla muayeneye gelen kız çocuklarının penetresyon sıklığı %48,5 gibi yüksek bir oranda verilirken, tanılanıp bildirilen oranlar ise %27 şeklindedir. Bu olguların %25' inde ise fiziksel temas olmaksızın (pornografi, teşhir vb.) cinsel istismarın yaşandığı da belirtilmektedir (Bağ & Alşen, 2017). Lise öğrencilerine uygulanan bir diğer çalışmada kız çocuklarının %13,4' ünün cinsel istismara uğradığı, bu vakalarda istismarcının %50' sinin çocukların tanıdığı kişilerden oluştuğu ve

%32,4' ünün ise istismarcı hakkında konuşmak istemediği tespit edilmiştir (Alikaşıfoğlu & ark., 2006). Bir diğer çalışmada ise cinsel istismara uğramış kız ve erkek çocukların oranları sırasıyla; %80,2 ve %19,8 olarak belirtilmektedir. Çocuk koruma merkezine başvuran çocuklarda da kız çocuklarının en az iki kat daha fazla oldukları görülmektedir (Soylu & ark, 2016). Çocuklarda cinsel istismar için verilen yaş ortalamalarının kız çocuklarında 15-17, erkek çocuklarında ise 7-11 aralığında sık görüldüğü belirtilmektedir. Yine aynı çalışmada, çocukların yaş grubuna göre istismarcının değişiklik gösterdiği kız çocukları için 0-6 yaş dönemi daha çok baba, 7-11 yaş dönemi tanıdık birileri, 12-18 yaş ise daha sık arkadaşları tarafından cinsel istismara maruz kaldıkları bildirilmektedir (Özdemir & ark., 2018).

2.3. Duygusal istismar

Çocukların büyüme ve gelişim süreçlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için, tutarlı bir şekilde gerek fiziksel gerekse duygusal anlamda bakım ve desteğe ihtiyaç duyarlar. Çocuklar sevmeyi, sevilmeyi özellikle ailenin onlara gösterdiği ilgi ve özverili sevgiden öğrenirler. Bu öğrenimleri kazanan çocuklar sosyal ilişkilerin düzenlenmesi ve toplumsal uyum süreçlerini başarılı bir şekilde yönetebilirler. Bu sebeple çocuğun yetişme sürecinde çevresinde yer alan kişilerin (aile, öğretmen, arkadaşlar vs.) çocuğa gösterdiği tavır, tutum ve davranışlar çocuğun kişilik gelişiminde, sosyal ilişkilerinde ve toplumsal varoluşunda önemlidir (Zhang & ark., 2022; Wang & ark., 2024).

Duygusal istismar, çocuğun başta anne-baba olmak üzere çevresinde yer alan kişiler tarafından istek, kapasite ve ihtiyaçlarının görmezden gelinerek, tutarsız muamelelerle, tehdit edilme,

kıyaslanma, aşağılanma, kapasitesine uygun olmayacak isteklerde ya da beklentilerde bulunma gibi eylemlere maruz kalması durumu şeklinde tanımlanmaktadır. Bir diğer tanımlamada, çocuğun sağlığına bütün açılardan (fiziksel, zihinsel, ruhsal) zarar verebilecek, onun manevi, ahlaki ve sosyal gelişimini sekteye uğratabilecek her türlü davranışa çocuğun maruz kalması durumu olarak tanımlanmaktadır (Newton ve Gavin, 2018; Wang & ark., 2024). Aynı zamanda duygusal istismarda fizikselde olduğu gibi şiddetine göre sınıflandırılabilir. Çocuğun ilgi duyduğu şeyleri yapmasının engellenmesi, aç bırakılması ihtiyaçlarının karşılanmadan azarlanması gibi davranış türleri düşük düzey sayılırken; küfür içeren sözel ifadeler, başka insanların yanındaiken küçük düşürücü ve hakaret içerikli söylemlerde bulunma, kovma gibi durumlar ise yüksek düzey duygusal istismar olarak değerlendirilmektedir (Müderrişoğlu & ark., 2014).

Çocuklarda duygusal istismara sebebiyet verebilecek durumlar, çocuğa psikolojik alanda zarar veren, çocuğun davranış, duygu ve sosyal gelişim alanlarında olumsuzluk oluşturabilecek ve son olaraksa çocuğun özgüven, yetenek, başarı ve bir yere ait olma duygusunu etkileyebilecek düzeyde her türlü tutum ve davranışın bulunması durumlarıdır. Çocukların duygusal istismarında sıklıkla yapılan istismar davranışları; tutarsız bakım, herhangi bir olayda çocuğun fikrinin alınmaması, baskı yapılması, küçük düşürücü eylemlerde bulunulması, suçlayıcı bir tavırla yaklaşım, başka çocuklarla kıyas, lakap takılması, hakaret, alay, tehdit içeren söylem ve eylemler olarak sıralanmaktadır (UNICEF, 2010; Müderrişoğlu & ark., 2014).

Duygusal istismar diğ er istismar t rleriyle bir arada g r lebilen, kapsayıcılıđı olan bir istismar t r d r. İstismarın bir ok t r nde  zellikle de fiziksel ve cinsel istismar durumlarında  ocuklar genellikle duygusal istismara da maruz kalmaktadırlar. Duygusal istismar durumunda, diğ er istismar t rlerine kıyasla somut belirtiler bulunmamaktadır fakat duygusal istismar da  ocuđun gelişim s recini sekteye uđratarak  zellikle sosyal ve toplumsal yařam alanlarında  ocukların kendilerine olan saygı ve  zg venini olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple duygusal istismar da  ocuk sađlıđını tehdit eden ve toplumsal sađlıđa olumsuz etkileri olan bir sorundur (Newton ve Gavin, 2018; Wang ve ark., 2024).

Duygusal istismara y nelik belirtilerin fark edilmesi dikkatli ve uzun s reli takip gerektirmektedir. Duygusal istismar  zellikle  ocuđun gelişim (fiziksel, sosyal) seviyesi olarak yařıtlarında geride olmasına iliřkin bulgular i ermektedir. Bunların yanı sıra  ocuđun i e kapanık olması,  zg vende yetersizlik, istismarcısından g rd đ  davranıřları kendisi ve  evresine uygulaması (taklit etmesi), parmak emmesi, konuřma bozuklukları, g z teması kuramıyor/kurmuyor oluřu gibi sosyal iletiřim becerilerinin yetersizlik, kendilerine k t  davranıřlar (intihar ama lı olmayan) sergilemeleri ve toplumsal kabul n n d ř k olması, antisosyallik durumu řeklinde belirtilere sahiptir (Zhang ve ark., 2022; Wang ve ak., 2024).

Duygusal istismar,  ocuđun yakınında bulunan (anne, baba, abla, abi,  đretmen vb.) ve  ocuđun  zerinde bir sıklıkla otorite veya g ce sahip kiřiler tarafından ger ekleřtirilmektedir. D nya sađlık  rg t  uluslararası d zeyde  ocukların %26,3'  n n duygusal olarak istismara maruz kaldıklarını bildirmektedir (WHO, 2014). Duygusal istismara uđrayan okul d nemindeki  ocuklarda istenmeyen

davranışlara maruz kalma oranları her iki çocuktan birisi olarak oldukça sık olarak belirtilmektedir (UNICEF, 2010). Çin’ de gerçekleştirilen çalışmalarda duygusal istismar oranları daha az olarak verilirken bu durumun geleneksel çocuk yetiştirme algıları dolayısıyla çocukların bu davranışları istismar olarak görmediği için vakaların var olandan daha düşük olduğu düşünülmektedir (Zhang ve ark., 2022). Türkiye’ de 0-8 yaş aile içi şiddete yönelik bir araştırmada çocukların hafif ve şiddetli duygusal istismara uğrama durumları sırasıyla %73,7 ve %4,1 olarak verilmektedir. Türkiye’ de 7-18 yaş grubunda yer alan çocukların %49’ unun ev içi veya dışında duygusal istismara maruz kaldığı görülmektedir. Bu 7-14 yaş grubuna dahil kız çocukların sıklıkla arkadaş, öğretmen, anne ve babaları tarafından, aynı yaş grubundaki erkek çocukların ise sıklıkla öğretmen, arkadaş ve babaları tarafından duygusal istismara maruz bırakıldıkları belirtilmektedir (Müderrişoğlu & ark., 2014).

2.4. Ekonomik istismar

Çocuklarda ekonomik istismar, çocuk haklarını tamamen ihlal edecek şekilde onların sağlığının sürdürülmesi, büyüme ve gelişme faaliyetlerini sekteye uğratacak, kapasitelerinin üzerinde işlerde düşük maliyetli iş gücü olarak görülerek çalıştırıldıkları durumları ifade etmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization-ILO, 2015) çocuk işçiliği ve dolayısıyla ekonomik istismar için, çocukları yaşamlarından alıkoyacak şekillerde, potansiyellerini ortaya çıkarmalarını engelleyen, saygınlıklarını zedeleyen, fiziksel, zihinsel ve duygusal açılardan çocuğu olumsuz etkileyecek işlerde kapasitesinin üzerinde beklentiyle çocuğun çalıştırılmasıdır, tanımlaması yapılmaktadır. Ailenin ekonomik olarak kötü durumda olması, savaş, göç, aile bireylerinin özellikle

baba ve annenin yokluđu, aile ekonomisine katkıda bulunma çabası, okul masraflarını karşılamak zorunda olması, okula gitmek istemiyor gerekçesi, geleneksel algıyla çocuğun geleceğe hazırlanılması ya da meslek kazanımı isteđi dolayısıyla çocuklar ekonomik olarak istismara uğramaktadırlar (ILO, 2015; Aykaç & Murat, 2018).

Çocuğun ekonomik istismarında, çocuklar gelişimlerine zarar verecek, kapasitelerinin üstünde ve tehlikeli işlerde işçi olarak, mevsimsel tarım işçiliğinde, sokakta bir şeyler satma veya dilenme için, kâğıt toplamada, fuhuş ya da pornografi gibi amaçlarla, uyuşturucu maddelerin ticaretinde ve para karşılığında satılmaları durumları örneklerdendir. Genellikle sağlıksız koşullarda çalıştırılan bu çocukların sağlık, eğitim, gelişim hakları başta olmak üzere yaşamsal hakları ihlal edilmektedir. Çocukların ekonomik istismarı, ülkelerin gelişmişlik seviyeleriyle ters orantılı olarak değişim göstermektedir. Az gelişmiş ülkelerde ve genellikle kırsallarda çocuğun iş gücüne erken katılımı beklenmekte ve çocuklar tarlada, küçük kardeşe veya hayvanlara bakması için vs. ortamlarda sıklıkla çalıştırılmaktadır. Zaman zaman bu çalışma koşullarının gerekliliđiyle çocukların eğitim hakları da ellerinden alınabilmektedir (Aykaç & Murat, 2018; Özdemir & ark., 2018).

Küresel çapta bir sorun olan çocuk işçiliđi ve dolayısıyla çocuğun ekonomik istismarı, 152 milyon çocuđu etkilemektedir. Bu çocukların 64 milyonu kız, 88 milyonunun ise erkek çocuk olduđu ve bu çocukların yaklaşık yarısının sağlık, ahlak, güvenlik olarak gelişimlerini tehdit edecek ve tehlikeli işlerde çalıştırılmakta olduđu belirtilmektedir. Uluslararası düzeyde çocukların ekonomik istihdam ve dolayısıyla istismar oranlarının 2012' den 2016 yılına

gelene dek %16,7' den %13,8' e azaltıldığı bildirilse de halen oranların oldukça yüksek olduğu görülmektedir (ILO, 2017). Bölge bazında bakıldığında ise çocuk işçiliği/istismarı açısından en yüksek oranların sırasıyla Afrika, Asya, Pasifik, Amerika, Avrupa ve orta Asya bölgelerinde olduğu belirtilmektedir (Alliance, 2017).

Ülkemizde çocukların iş gücüne katılım oranları ve ekonomik istismarı, TÜİK' nun açıkladığı raporlara göre; 6-14 yaşlarında %2,6 iken 15-17 yaş grubunda bu oran %15,6' lara kadar artış göstermektedir. Bu çocukların cinsiyete göre dağılımı ise erkek çocuklar için %68,8 iken kız çocukları içinse %31,2' dir (TÜİK, 2013). Yasal düzenleme ve önlemlerle birlikte yıllar içerisinde bu oranlarda olumlu yönde değişiklikler yaşanmış ve 2014 yılında bu rakamlar %29,4 olarak bildirilirken 2016 yılına gelindiğinde %27,8 şeklinde belirtilmiştir (TÜİK, 2017). Kız çocukları için ayrıca tehdit oluşturan fuhuş bağlamında ekonomik istismar ise %4,4 oranlarında görülmektedir (Özdemir & ark., 2018).

2.5. Çocuk ihmali

Çocuğa bakmakla yükümlü kişilerin bilerek ya da özensizlikten dolayı, çocuğun beslenme, temizlenme, barınma, korunma gibi temel fiziksel ihtiyaçlarının, sevgi, ilgi, duygusal bağlanma, şefkat gibi duygusal ihtiyaçlarının, gelişim takibi, sağlığın sürdürülmesi ve hastalık gibi durumlarda tıbbi ihtiyaçlarının çocuğun gelişimini engelleyecek biçimlerde eşit hak ve özgürlüklerden çocuğun yoksun bırakılması, bütün bunların yanı sıra çocukların fiziksel, duygusal ve entelektüel kapasitelerine ulaşmalarının önünde engel teşkil edebilecek davranışlarda bulunulması durumu çocuk ihmali olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (2006) ihmali, çocuğun gıda, sağlık, barınma, eğitim,

giyim gibi fiziksel ve tıbbi ve duygusal gelişim gibi alanlarda ihtiyaç duyabilecekleri her türlü gereksinimlerin, onların anne/baba/bakım vericisi tarafından karşılanmaması durumu olarak tanımlamaktadır. İhmal uluslararası çapta en yaygın olan istismar biçimlerinden birisidir ve mağdur çocukların %74' ünün ihmale uğradığı belirtilmektedir (NCA, 2022). Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ise mağdur çocukların %25' inin aynı zamanda ihmale maruz bırakıldıklarını açıklamaktadır (UNICEF, 2010). Çocukların mağduriyet yaşadıkları ihmal türleri, fiziksel, duygusal, cinsel, eğitimsel ve tıbbi alanlarda gerçekleştiği görülmektedir.

Fiziksel ihmal, çocukların gıda alımı, barınma, giyinme gibi alanlarda, yaşamsal düzeylerde ihtiyaç duyabilecekleri her türlü ihtiyaçlarının tedariğinde yetersizlik bulunması durumudur. Fiziksel ihmal mağduru çocuklarda genellikle fiziksel gelişme geriliği yaşamakta, temizliklerinin tam sağlanmadığı için kötü kokular (ter, idrar vs.) içerisinde, yırtık, eski, bedeni ve aynı zamanda mevsime de uygun olmayan elbiseler içerisinde, yaşadıkları evler oldukça kötü, çocukların yaşamasına uygun olmayan (camları kırık, güvenlik önlemleri yetersiz vs.) ortamlarda yaşamlarını sürdürmektedirler (Hergüner & ark., 2016). Duygusal ihmal, çocuğun duygusal anlamda gelişimi için ihtiyaç duyabileceği her türlü sevgi, ilgi, şefkat, destek ve gözetimden yoksun olması durumu şeklinde tanımlanmaktadır. Bu çocukların ebeveynlerinin çocuğun bu ihtiyaçlarına karşı ilgisiz, reddedici ve çocuğu görmezden gelme gibi davranışlar içerisinde oldukları belirtilmektedir (Müderrişoğlu & ark., 2014). Çocuğun yaşına uygun olacak şekilde gerekli olabilecek cinsel gelişim süreçleri ve cinsel eğitimin verilmemesi durumu cinsel ihmal olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda çocuğun

cinsiyetine göre giydirilmemesi, cinsellikle ilgili sorularına yaşına uygun cevapların verilmemesi de ihmale dahil edilebilmektedir. Bu ihmal bazen bilgi yetersizliği bazense toplumsal tabulardan dolayı da görülebilmektedir. Çocuğun yaşı dahilinde okula gönderilmemesi ya da herhangi bir sorun yokken geciktirilmesi eğitim alanında yapılan ihmallerdendir. Bunların yanı sıra; çocukların sebepsiz yere sık tekrarlayan devamsızlıklarının görmezden gelinmesi, öğrenmede güçlük çeken ya da mental/motor alanlarda dezavantajlı olan gruplarda özel gereksinim ihtiyacının karşılanmaması durumu da eğitim ihmeline dahil edilmektedir. Çocuğun ücretsiz sağlık takibinin yapılacağı ya da hastalandığı durumlarda gerekli tıbbi yardıma çocuğun ulaştırılmasının sağlanmaması ya da geciktirilmesi, tedavinin reddi ya da tamamlanmaması durumları tıbbi ihmal olarak kabul edilmektedir (Hergüner, 2011; Aktay, 2020; UNICEF, 2021; WHO, 2022; UNICEF, 2024).

3. Çocuk istismar ve ihmeline ilişkin koruma yöntemleri

Çocuk istismar ve ihmalinin önlenmesi toplumsal bir sorundur ve toplum içerisinde yaşayan her bireyin bu sorunun çözümü için üzerine düşen görevler vardır. Her türlü istismar belirtisinin bütün bireylerce bilinmesi, bu konudaki farkındalığın arttırılması önem arz eder. İstismarla ilgili süreçlerde çok sayıda mesleki disiplin üyesinin bir arada uyumlu bir şekilde çalışması sonucunda önlem ve koruma sağlanabilmektedir. Çocuk istismarı ile ilgili çalışmalar ilgili disiplinlerce birincil, ikincil ve üçüncül koruma yöntemleri olarak üç aşamada sürdürülmektedir. Birincil koruma yöntemleri daha çok istismar ve ihmalin henüz ortaya çıkmadan önce risk gruplarının tespitiyle birlikte gerekli önlemlerin alınması şeklinde gerçekleştirilmektedir. İkincil koruma yöntemleri, sıklıkla istismar

ve ihmalin oluřtuđu durumlarda mađdur ocuđun tanı, tedavi ve istismarcıdan korunması ile iliřkili mřdahaleleri iermektedir. řncřl koruma mřdahalelerinde ise istismar ve ihmalin tespiti sonrasında ocuđa ileriye dřnřk kalıcı olumsuz etkilenme durumlarının řnlenmesi iin uygulanması gereken rehabilitasyon sřreleri gerekleřtirilmektedir (Bađ & Alřen, 2017; Malgaz Gřlř & Acemiođlu, 2020).

Birincil koruma eylemlerinde řnemli olan istismar ve ihmalin oluřmaması, ocukların mađdur olmaması iin bireysel ve toplumsal farkındalıđın arttırılmasına yřnelik eylemleri kapsamaktadır. Křltřrel olarak deđiřiklik gřsteren normlarda istismar ve ihmalin ođu kez normal karřılındıđı gřrřlmektedir. Bu sebeple řzellikle ocukların farkındalıklarının arttırılması gerekmektedir. ocukların yař ve geliřim řzelliklerine uygun olarak istismar ve ihmal třrleri hakkında gerekli eđitimler planlanmalıdır. Břyle bir durumla karřılařmaları halinde irtibat kurabilecekleri kiřiler (gřvenli evre) ya da kurumlar eđitime dâhil edilmelidir. ocukların en ok gřvenebileceđi kiřiler anne/ babalarıdır. Bu sebeple ocuk sahibi olmaya aday anne ve babaların istismar ve ihmal konusunda bilinlendirilmesi olduka řnemlidir (Malgaz Gřlř & Acemiođlu, 2020). Anne ve baba adaylarına bu konuyla ilgili verilen eđitimler, aileden bařlayarak toplumun bilinlenmesine katkı sađlayabilir. Aynı zamanda ocukla birebir teması kreř ya da yurt gřrevlileri, řđretmen ve sađlık profesyonelleri (hemřire, hekim vb.) gibi grupların da her třrlř istismar ve ihmal konusunda bilinli olmaları řnemlidir. Bu gruplar iin planlanacak birebir eđitimler ve kitle iletiřim aralarının (tv, sosyal medya vs.) kullanımı bilincin arttırılmasında yarar sađlayabilecek diđer giriřimlerdendir. Aynı

zamanda riskli grupların tespitinde ve alınabilecek önlemlerde sosyal hizmet uzmanlarının durumdan haberdar edilmesi, çocuğun ifadesinin yetersiz olduğu durumlarda ve gerekirse psikolog vb. uzmanların desteği de alınmalıdır (Hergüner & ark., 2011; Aktay, 2020; Malgaz Güçlü & Acemioğlu, 2020).

İstismar ve ihmal durumlarında, bu durumların mümkün olan en kısa sürede tespit edilmesi, ilgili birimlere durumun rapor edilmesi, çocuğun istismarcıdan hızlıca uzaklaştırılması, çocuğun tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin erken dönemde başlatılması durumunda çocuğun bu durumdan göreceği olumsuz etkilenim düzeyi azaltılabilmektedir. İstismar ve ihmal durumlarında çocuğa hassas yaklaşılmalı, etik, ahlaki ve yasal sorumluluklar eksizsiz şekilde yerine getirilmeli ve bu süreçte çocuğa iyi geleceği düşünülen ya da gerekli olan bütün disiplinler (çocuk psikoloğu, sosyal hizmet uzmanı, hekim, hemşire vs.) ekibe dahil edilmelidir. Aile içi istismar ve ihmallerde ise çocuğun koruyucu kurumlara sevki gerçekleştirilmelidir (Bağ & Alşen, 2017; Özçetin, 2024).

Üçüncül koruma sürecinde yer alan rehabilitasyon, çocuğun varsa travmayı atlatması, kalıcı hasarlar oluşmasının önüne geçilmesi, çocuğun kendini suçlama ya da sosyal izolasyonu gibi durumlar söz konusuysa onların azaltılması gibi eylem planları yer almaktadır (Müderrişoğlu & ark., 2014).

4. Çocuk istismar ve ihmaliinde sağlık çalışanlarının rolü

Pediatric alanında çalışan hekim ve hemşireler istismar ve ihmalin belirtilerini çok iyi bilmesi gereken sağlık mensubu kişilerdir. Özellikle hemşireler çocukla geçirilen süre ve birebir temas halinde çalıştıkları için bu durumların tespitini yapma

konusunda daha fazla özveriili çalışmak durumundadırlar. İstismar konusunda özellikle de önlem faaliyetlerinde, toplumun bilinçlendirilmesi için gerçekleştirilecek her türlü eylem ve eğitim (gerek kurum içi gerekse kurum dışı) faaliyetlerinde pediatri hemşirelerinin yer almaları gerekmektedir (Aktay, 2020).

Bu süreçte öncelikle;

- İstismar ve ihmale ilişkin sorun tespitlerinin yapılması,
- Sorunla ilişkili olan kişilerin belirlenmesi, olayın neden ve risk faktörlerinin saptanması,
- Çocuk için ortaya çıkabilecek risklerin en aza indirgenerek gerçekleştirilecek girişimlerin planlanması, test edilmesi ve uygulamaya geçilmesi,
- İlgili kurumların süreçten haberdar edilmesi ve sektöriyel iş birliği ile tedavinin
- İlgili kurumların haberdar edilmesi ve gerekli sektörlerle iş birliği halinde çalışılması,
- Yapılan girişimlerin etkinlik boyutlarının raporlanması (Türkkan, Odacı & Bülbül, 2021; WHO, 2022).

Her yaş dönemi ve istismar türünde ortaya çıkabilecek belirtiler farklıdır. Bu sebeple istismarın bütün tür ve yaş dönemlerine ilişkin bilgi hakimiyeti vakaların gözden kaçırılma ihtimalini azaltır ve bu sağlık profesyonellerinin sorumluluğundadır. İfade yetersizliği bulunan küçük yaş grubundaki çocuklarda nöromotor değerlendirme ve fiziksel belirtilerin takibi önceliklidir. Sözel olarak ifadesi gelişmiş çocuklarda ise çocukların beyanlarının

önceliğe alınması gerekmektedir. Çocuklar her zaman böylesi bir durumu ifade edemeyebilir, bu durumlarda da iyi bir gözlemle davranışsal farklılıkların tespit edilmesi, gerekli görülen durumlarda mahremiyete dikkat edilerek hassas ve özverili bir muayene gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Adolesan grupta ise sözel ifadelere titizlikle dikkat edilmeli bir yetişkin gibi değerlendirilerek yargılamadan, tekrarlara girmeden mahrem bir ortamda görüşülmesi gerekmektedir. Riskli, kötü alışkanlıklar, kendisine ve çevresine zarar verme davranışları içerisinde olan adolesanların değerlendirmelerinde ise daha dikkatli olunması gerekmektedir (Özden & Yıldırım, 2009; Türkkan, Odacı & Bülbül, 2021; Özçetin, 2024).

İstismara uğramış çocukların titizlikle bir değerlendirme yapılmadan ya da bilgi yetersizliği dolayısıyla yapılamadan evlerine geri gönderildiği durumlarda, çocuğun mağduriyetinin devam ettiği ve bu çocukların %35-50' sinin çocukta ciddi hasarlar bırakacak şekilde davranışlara maruz kaldığı, %5-10' unun ise infaz edildiği bildirilmektedir (Acehan & ark., 2013). Bu sebeple değerlendirme süreci kısa sürede ve büyük bir titizlikle uzman ekip üyeleri kontrolünde yönetilmeli ve eğer gerek görülürse çocuklar ilgili kurumlarca koruma altına alınmalıdır. Bu sürecin yönetim sürecinde hemşirelere koordinasyon anlamında büyük görevler düşmektedir (Akbaba & ark., 22).

İstismar mağduriyeti bulunan çocukların hastaneye başvuru nedenlerinin genellikle başka bir sebeple gerçekleştiği görülmektedir. Mağdur çocuk genellikle kaza öyküsüyle hastaneye getirilirken, anlatılan öyküde tutarsız ifadelerin bulunması durumu, aile ve çocukta şüpheli davranışların olması durumlarında durum

ilgili birimlere rapor edilmelidir. Özellikle anne ya da babanın istismarcı olduđu vakalarda bu raporlamalar istismarın tekrarının önlenmesi için önem arz etmektedir. Raporlama işlemi sonrasında ekiple iş birliğı içerisinde çocuğun yararı ilkesi kapsamında gerekli görev ve sorumluluklar sürdürülmelidir. İstismar vakalarının bildirilmesine ilişkin zaman zaman sağlık profesyonellerinin de zorluk yaşadığı bildirilmektedir. Bu zorluğun sebeplerindeyse özellikle istismar belirtilerinin her zaman belirgin olmayışı, ihmal, kesin kanıt sunmayacak şüpheler durumunda tereddütler yer almaktadır. Özetle istismarın önlenmesinde sağlık profesyonellerinin eğitim ile farkındalığın artırılması hususunda, tespit, önlem, ilgili kurumları haberdar etme, ilgili kurumlara sevk ve diğerk ekip üyeleri (çocuk psikiyatr, çocuk gelişimci, toplum ruh sağlığı merkezi çalışanları, doktorlar, pediatri hemşireleri, emniyet teşkilatı, savcılık vs.) ile iş birliğı işlemlerinde titizlikle görevlerini icra etmeleri gerekmektedir (Türkkan, Odacı & Bülbül, 2021; Akbaba & ark., 2022; Özçetin, 2024).

5. Kaynaklar

Acehan, S., Bilen, A., Ay, M.O., Gülen, M., Avcı, A. & İçme, F. (2013). Çocuk istismarı ve ihmalinin değerlendirilmesi. *Arşiv Kaynak Tarama Dergisi*. 22(4), 591-614.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, (2017). *İstismar ile mücadele rehber kitapçığı*. (10/10/2024 tarihinde <https://www.aile.gov.tr/media/2499/cocuk-bakim-kuruluslarinda-calisan-personele-yonelik-istismarla-mucadele-rehber-kitapcigi.pdf> adresinden ulaşılmıştır)

Akbaba, M., Isır, A.B., Şaştım, M.U. & Tataroğlu, Z. (2022). Çocuğun tekrarlayan fiziksel istismarında hekim yaklaşımının önemi ve geciken mahkeme kararı neticesinde meydana gelen cinsel istismar: Olgu sunumu. *The Bulletin of Legal Medicine*. 27(2), 201-206.

Aktay, M. (2020). İstismar ve ihmalin çocuk üzerindeki etkileri ve tedavisi. *Gelişim ve Psikoloji Dergisi*. 182), 169-184.

Alliance. (2017). *Regional brief for Asia and the Pacific, 2017. Global estimates of modern slavery and child labour*. (6/11/2024 tarihinde https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_597873.pdf adresinden ulaşılmıştır)

Aykaç, M. & Güven, M. (2018). Sürdürülebilir kalkınma 2030 gündemi bağlamında çocuk işçiliğinin önlenmesinde sosyal koruma tabanları. *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*, Özel sayı, 93-118.

Bağ, Ö. & Alşen, S. (2017). Çocuk izlem merkezinde cinsel istismarın değerlendirilmesi: Bir merkezin bir yıllık deneyimi. *Anatolian Journal of Psychiatry*, 18(1), 62-68.

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, (2010). *Türkiye’ de çocuk istismarı ve aile içi şiddet araştırması*. (10/10/2024 tarihinde <https://www.unicef.org/turkiye/media/5221/file/%20T%C3%9CRK%C4%B0YE'DE%20%C3%87OCUK%20%C4%B0ST%C4%B0SMARI%20VE%20A%C4%B0LE%20%C4%B0%C3%87%C4%B0%20%C5%9E%C4%B0DDET%20ARA%C5%9ETIRMASI%20-%20%C3%96zet%20Raporu%202010.pdf> adresinden ulaşılmıştır)

Birleşmiş Milletler, (2017). *Celebrating childhood report*, (10/10/2024 tarihinde <https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2467&menu=35> adresinden ulaşılmıştır)

BM (1948). *İnsan hakları evrensel bildirgesi*. (12/11/2024 tarihinde <https://www.ihd.org.tr/insan-haklari-evrensel-beyannames/> adresinden ulaşılmıştır)

Butchart, A., A. Phinney Harvey, M. Mian, T. Furniss, T. Kahane, W.H. (2006). *Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence*. (2/10/2024 tarihinde <https://www.who.int/publications/i/item/preventing-child-maltreatment-a-guide-to-taking-action-and-generating-evidence> adresinden ulaşılmıştır)

Cengel-Kültür, E., Cuhadaroğlu-Cetin, F. & Gökler, B. (2007). Demographic and clinical features of child abuse and neglect cases. *Turk J Pediatr*, 49(3), 256-62.

Çavuşoğlu, H., (2013). *Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği*. Ankara. Sistem Ofset, 19-30.

Çocuklara Yönelik Zulmü Önleme Ulusal Derneği, (2017). *Child protection plan and register statistics UK: 2012-2016. The National Society for the Prevention of Cruelty to Children*. (24/10/2024 tarihinde <https://www.nspcc.org.uk/globalassets/documents/statistics-and-information/child-protection-register-statistics-united-kingdom.pdf> adresinden ulaşılmıştır)

Erdoğan, A., Tufan, E., Karaman, M.G. Atabek, M.S., Koparan, C. Özdemir, E., Çetiner, A.B. & et al. (2011). Türkiye'nin dört farklı bölgesinde çocuk ve ergenlere cinsel tacizde bulunan kişilerin karakteristik özellikleri. *Anadolu Psikiyatri Dergisi*, 12(1), 55-61.

Erkut, Z., Balcı, S. & Yıldız, S., (2017). Tarihsel süreç içinde çocuk. *Çocuk ve Medeniyet*, 1, 17-21.

Finkelhor, D. (1994). The international epidemiology of child sexual abuse. *Child Abuse Negl*, 18(5), 409- 17.

Hergüner, S. (2011). *Çocuk hakları açısından çocuk ihmali ve istismarı el kitabı*. İstanbul, Çocuk Vakfı Yayınları, 42-54.

ILO (2015). *Child labour. 2015*. (4/11/2024 tarihinde <https://www.ilo.org/publications/world-report-child-labour-2015-paving-way-decent-work-young-people-0> ulaşılmıştır)

ILO. (2017). *Global estimates of child labour: Results and trends, 2012-2016*. International Labour Office, Geneva.

Lambert, T., (2008). *A brief history of children*. (4/10/2024 tarihinde <http://www.localhistories.org/children.html> adresinden ulařılmıştır)

Malgaz Güçlü, D. &Acemioğlu, R.(2020). Erken çocukluk döneminde yaşanan fiziksel istismar: nitel bir araştırma. *Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(4), 97-111.

Mohler-Kuo, M., Landolt, M.A., Maier, T., Meidert, U., Schönbucher, V., Schnyder, U. & et al. (2014). Child sexual abuse revisited: a population-based cross-sectional study among Swiss adolescents. *J Adolesc Health*, 54,304-311.

Müderrişoğlu, S., Dedeoğlu, C., Akço, S. & Akbulut, B. (2014). *Türkiye’de 0-8 Yaş Arası Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması*. Bernard van Leer Vakfı, Hümanist Büro ve Frekans Araştırması, İstanbul.

National Children’s Alliance, (2022), *National statistics on child abuse*. (7/10/2024 tarihinde <https://www.nationalchildrensalliance.org/media-room/national-statistics-on-child-abuse/#effects> adresinden ulařılmıştır)

Özçetin, M. (2024). *Çocuğun fiziksel istismarı*. Her Yönüyle Çocuk İstismarı ve İhmali, Türkiye Klinikleri, Ankara, 9-12.

Özdemir, G., Cesur, G., Ünal Yarar, G., Sezerol, M.A. & Malkoç, G. (2018). İstanbul ili örnekleminde cinsel istismar mağduru çocuk ve erkeklerin sosyodemografik ve klinik özellikler açısından incelenmesi. *Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi*, 25(2), 141-158.

Özden, D. & Yıldırım, N. (2009). Adli vakaya hemşirelerin yaklaşımı, *Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi*, 16(3), 73-81.

Soylu, N., Ayaz, M., Gökten, E. S., Alpaslan, A. H., Dönmez, Y. E., Özcan, Ayaz & Tufan, (2016). Gender differences in sexually abused children and adolescents: a multicenter study in Turkey. *Journal of Child Sexual Abuse*, 25(4), 415-427.

Stoltenborgh, M., Bakermans-Kranenburg, M.J., Alink, L.R. & Van Ijzendoorn, M.H. (2015). The prevalence of child maltreatment across the globe: Review of a series of metaanalyses. *Child Abuse Review*, 24(1), 37-50.

Tıraşçı, Y. & Gören, S. (2007). Çocuk istismarı ve ihmali. *Dicle Tıp Dergisi*, 34(1), 70-74.

TÜİK. (2013). *Çocuk işgücü anketi sonuçları*, (4/12/2024 tarihinde <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Cocuk-Isgucu-Anketi-Sonuclari-2012-13659> adresinden ulaşılmıştır)

TÜİK. (2017). *İstatistiklerle çocuk*, (4/12/2024 tarihinde <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Statistics-on-Child-2017-27596> adresinden ulaşılmıştır)

TÜİK, (2022). *Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistikleri*, (4/10/2024 tarihinde <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Guvanlik-Birimine-Gelen-veya-Getirilen-Cocuk-Istatistikleri-2022-49662> adresinden ulaşılmıştır)

Türkkan, T., Odacı, H. & Bülbül, K. (2021). Çocuk istismarı ve ihmalini anlamak: Ekolojik bir yaklaşım. *Toplum ve Sosyal Hizmet*, 32(2), 709- 728.

Uğur, S. B., (2018). Childhood perception and child rearing practices shaped from past to present. *Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 45, 227-247.

UNICEF, 2010, *Türkiye’ de çocuk istismarı ve aile içi şiddet araştırması*. (10/11/2024 tarihinde <https://www.unicef.org/turkiye/media/5221/file/%20T%C3%9CRK%C4%B0YE'DE%20%C3%87OCUK%20%C4%B0ST%C4%B0SMARI%20VE%20A%C4%B0LE%20%C4%B0%C3%87%C4%B0%20%C5%9E%C4%B0DDET%20ARA%C5%9ETIRMASI%20-%20%C3%96zet%20Raporu%202010.pdf> adresinden ulaşılmıştır)

UNICEF (2018). *Data*, (10/11/2024 tarihinde https://data.unicef.org/resources/data_explorer/unicef_f/?ag=UNICEF&df=%20GLOBAL_DATAFLOW&ver=1.0&dq=.PT_ADLT_PS_NEC...&startPeriod=2015&endPeriod=2018 adresinden ulaşılmıştır)

UNICEF (2021). *Prohibiting all corporal punishment of children: laying the foundations for non-violent childhoods*. (10/11/2024 tarihinde <https://endcorporalpunishment.org/wp-content/uploads/2021/04/Prohibiting-all-corporal-punishment-of-children-laying-the-foundations-for-nonviolent-childhoods.pdf> adresinden ulaşılmıştır)

UNICEF (2023), *Data*. (10/11/2024 tarihinde https://data.unicef.org/resources/data_explorer/unicef_f/?ag=UNICEF&df=%20GLOBAL_DATAFLOW&ver=1.0&dq=.PT_CHLD

1-14 PS-PSY-

V_CGVR..&startPeriod=2015&endPeriod%20=2018%20United%20Nations%20Children%E2%80%99s%20Fund,%20A%20Familia r%20Face:%20Violence%20in%20the%20Lives%20of%20Chldre n%20and%20Adolescents adresinden ulařılmıştır)

UNİCEF, (2024). *Özet bilgiler*. (12/12/2024 tarihinde <https://www.unicef.org/turkiye/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/%C3%B6zet-bi%CC%87lgi%CC%87ler-%C3%A7ocuklara-y%C3%B6nelik-%C5%9Fiddet-artmaya-devam-ederken-bu-durum-d%C3%BCnya> adresinden ulařılmıştır)

Wang, X., Xie, R., Wang, S., Zhang, R., Li, W., Ding, W., 2024, The impact of childhood emotional abuse on the developmental trajectory of non-suicidal self-injury in adolescents: The mediating role of self-compassion and peer attachment, *Child Abuse & Neglect*, 158, 107098.

WHO. (2002). *The world health report 2002: Reducing risks, promoting healthy life*. (1/9/2024 tarihinde <https://www.who.int/publications/i/item/9241562072> adresinden ulařılmıştır)

WHO. (2006). *Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence*. (12/10/2024 tarihinde <https://iris.who.int/handle/10665/43499> adresinden ulařılmıştır)

WHO. (2014). *Uluslararası řiddet durum raporları*. (6/10/2024 tarihinde https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Global%20status%20report%20on%20violence%20prevention%202014&publicatio

n_year=2014&author=W.H.%20Organization
ulařılmıştır)

adresinden

WHO. 2022, *Çocuk istismarı*. (6/10/2024 tarihinde
[https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/child-](https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment)
[maltreatment](https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment) adresinden ulařılmıştır)

Yektař, Ç., Tufan, A.E., Büken, B., Çetin, N.N. & Yazıcı, M.
(2018). Cinsel istismar mağduru çocuk ve ergenlerde istismar ve
istismarcıya ilişkin özelliklerin ve psikopatoloji ile ilişkili risk
etkenlerinin değeriendirilmesi. *Anadolu Psikiyatri Dergisi*,19(1),
505-508.

Zhang, R., Xie, R., Ding, W., Wang, X., Song, S. & Li, W.
(2022). Why is my world so dark? Effects of child physical and
emotional abuse on child depression: The mediating role of self-
compassion and negative automatic thoughts, *Child Abuse &
Neglect*, 129, 105677.

BÖLÜM VI

Serebral Palsili Çocuklarda Refleksolojinin Uygulanması

Bircan KAHRAMAN BERBEROĞLU¹
Sultan GÜNER BAŞARA²

Giriş

Serebral palsy (SP), anne karnında ya da yenidoğan döneminde gelişmekte olan beyinde meydana gelen, kalıcı hasar nedeniyle ortaya çıkan ancak ilerleyici olmayan, hareket ve duruş gelişimini etkileyerek aktivite kısıtlılıklarına yol açan bir rahatsızlıktır (Chambers & Chambers, 2020; Ferriero & Arn, 2020; Himmelman & Panteliadis, 2018). SP'li çocuklar, hareket, duruş ve kas tonusunda bozuklukların yanı sıra, motor ve duyuşal problemler

¹ Arş. Gör. Dr., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Aydın/Türkiye, Orcid: 0000-0003-2920-4819, biircan5@gmail.com

² Dr.Öğr. Üyesi., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Tokat/Türkiye, Orcid: 0000-0002-0665-5396, sgune6377@hotmail.com

ile bunlara baęlı ikincil sorunlar da yařayabilir. Bu çocuklarda epilepsi, zihinsel gerilik, iřitme ve grme bozuklukları, duyu-sal-motor algı problemleri, aęrı, davranıřsal sorunlar ve dięer vct sistemlerine iliřkin rahatsızlıklar olduka yaygındır. Ayrıca, beyindeki hasara baęlı olarak disfaji, beslenme paternindeki bozukluklar, kusma, kronik kabızlık, uyku sorunları ve salya akıntısı gibi problemlere de sıka rastlanmaktadır (Himmelman & Panteliadis, 2018; Chambers & Chambers, 2020; Ferriero & Arn, 2020). Bu tr ikincil sorunlar, SP’li bir ocuęa sahip ailelerin yařamını byk lde etkileyerek ebeveynler zerinde ciddi bir stres kaynaęı oluřturur. Ebeveynler, ocuklarının yařam boyu srecek bu rahatsızlıęı nedeniyle, kendi bakım verememe durumlarında ocuęun z bakımının yeterince karřılanamayacaęı endiřesi gibi zor kabul edilebilecek ve stesinden gelinmesi g problemlerle karřılařırlar. Gn boyunca ocuęunun ihtiyalarını karřılayan bir annenin gece boyunca dinlenememesi de ruhsal olarak yıpranmalarına neden olur. Yapılan arařtırmalar, SP’li ocuęu olan ailelerin, normal geliřen ocuęu olan ailelere kıyasla daha yksek stres seviyelerine sahip olduęunu ve zihinsel saęlıklarının daha fazla etkilendięini ortaya koymuřtur (Wayte & ark, 2012; Guillamn & ark, 2013; Himmelman & Panteliadis, 2018; Ferriero & Arn, 2020). Aileler, ocuklarının yařadıęı sorunlara ynelik yařam boyu farklı tedavi yntemleri arayıřında olurlar. SP rehabilitasyonunda, geleneksel tedavi yaklařımlarına ek olarak tamamlayıcı ve alternatif

tedavi yöntemleri de aileler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Yapılan bir çalışmada, nörolojik sorunu olan çocukların alternatif yöntemleri sık kullandığı ve bu yöntemler arasında refleksoloji uygulamasının üçüncü sırada olduğu belirtilmiştir (Low & ark, 2008).

Refleksoloji, yetişkinler üzerinde farklı problemlere yönelik uygulanmış ve bu uygulamaların sonuçları raporlanmıştır. Multipl skleroz, perimenstrüel yakınmalar, astım, gibi durumların yanı sıra, ağrı, yaşam kalitesi, yorgunluk, anksiyete, uyku düzeni ve hipertansiyonu olan hastalarda refleksoloji çalışıldığı görülmektedir (Özdemir, 2011; Yılar, 2014; Alan, 2015; Avcı, 2015; Aydın, 2015; Doğan, 2015; Gözüyeşil, 2015; Metin, 2015; Ünal, 2015; Bakır, 2016; Kizir, 2016; Kurt, 2016; Polat, 2016; Güven, 2017; Esmel-esmel & ark, 2017; Zengin, 2017; McCullough & ark, 2018; Rameznibadr & ark, 2018; Shahsavari & ark, 2018; Kapila & ark, 2019; Silverdale, 2019; Büyükbayram & Ayık, 2021). Refleksolojinin SP’li çocuklar arasında oldukça yaygın bir kullanım alanı olmasına rağmen, bu yöntemin SP’li çocuklar üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar sınırlıdır. Hasta ve sağlıklı yetişkinler üzerinde yapılan çalışmaların olumlu etkileri göz önüne alındığında, refleksolojinin SP’li bir çocuğun adım atmasına, konuşma yeteneğinin gelişmesine, algısının artmasına, spastisitenin azalmasına, kabızlık probleminin çözülmesine ve yeme-içme süreçlerinin kolaylaştırılmasına katkı sağlayabileceği

düşünülmektedir. Bu doğrultuda, bu bölüm SP’li çocuklarda refleksoloji uygulamasının etkilerini incelemek amacıyla ele alınmıştır.

Serebral Palsi

SP, etiyolojisi, türleri ve şiddeti açısından farklılıklar gösteren, kalıcı ve yaşam boyu süren bir rahatsızlıktır. Beynin motor bölgelerinde oluşan lezyonlar nedeniyle gelişir ve çocukların normal gelişim süreçlerini etkileyerek motor fonksiyon ve postür bozukluklarına neden olur. SP, en yaygın nörogelişimsel yetersizliklerden biridir (Chambers & Chambers, 2020; Milićević, 2022).

SP’li çocuklarda motor gelişimin primer unsuru olan motor fonksiyonlar, lezyonun şiddetiyle orantılı olarak gecikir ve sorunlu bir şekilde gelişir (Chambers & Chambers, 2020; Ferriero & Arn, 2020; Himmelmann & Panteliadis, 2018). İlk bakışta ana sorun motor problemlerdir. Ancak motor problemlerin yanı sıra SP’ye epileptik nöbetler, bilişsel engellilik, diş, görme, işitme, solunum, gastrointestinal, üriner, kas-iskelet, oral motor, uyku ve davranış sorunları ile ağrı ve disfaji gibi sorunlar eşlik edebilir (Himmelmann & Panteliadis, 2018; Chambers & Chambers, 2020). SP, birçok sistemi etkileyen bir rahatsızlık olup, rehabilitasyon süreci; medikal ve cerrahi tedavi yöntemleri, fizyoterapi, ergoterapi, alçı, ortez ve diğer yardımcı cihazlar, konuşma ve dil terapisi, rekreasyonel

aktiviteler, okul desteđi, eđitim ve psikososyal yaklaşımlar gibi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir (Himmelmann & Panteliadis, 2018).

Refleksoloji

Refleksoloji, rahatlamayı artırmak için belirli refleks noktalarına basınç uygulayarak yapılan, bütünsel iyileştirme sağlayan ve enerji dengesini yeniden kurmayı hedefleyen tamamlayıcı bir terapi yöntemidir (Magill & Berenson, 2008; Yüksel 2021). Refleksoloji, salgı bezleri, vücut bölgeleri ve organlar ilişkili refleks noktalarına elle uygulanarak yapılan, kişinin ellerine, ayaklarına ve kulaklarına dokunarak vücut fonksiyonlarının normalleşmesine yardımcı olan bir tekniktir (Livaneliođlu ve Günel, 2009; Yalçiner, 2017). Bu yaklaşıma göre, kulaklar, eller ve ayak tabanlarında her vücut bölümüne karşılık gelen bir sinir noktası bulunur. Her organın, kulaklarda, ellerde ve ayak tabanlarında yer alan bu sinir noktalarına yapılan uyarılar ilgili bölgeyi harekete geçirir (Yalçiner, 2017).

Uygulayıcılar, genellikle daha kolay erişilebilir, daha duyarlı ve daha geniş alanlara sahip olduđu için ayaklar ile çalışmayı tercih ederler. Ancak ayak masajı ile refleksoloji birbirinden farklıdır. Refleksolojide kullanılan teknikler, klasik masajdan farklı olup, solucan hareketini andıran bir yönelimle yapılır (Gözüyeşil, 2015). Tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak kullanılan refleksoloji,

vücudun kendi iyileşme mekanizmasını aktive ederek fizyolojik bir rahatlama sağlar. Refleks noktalarına elle yapılan uyarılarla sinirler ve kan dolaşımı uyarılır, bu da refleksolojinin temel prensibini oluşturur. Refleksoloji, holistik bir dengeleme tedavisi olarak tanımlanır (Yalçiner, 2017).

Refleksoloji, yan etkisi olmayan ve invaziv olmayan, bütünsel bir tedavi yöntemidir. Tanı koymak ya da hastalığı tek başına tedavi etmek için kullanılmaz. Ana amacı, hastalığın yol açtığı ikincil sorunları hafifletmek, rahatlama sağlamak ve vücudun dengeyi yeniden kurmasına yardımcı olmaktır (Wang & ark., 2008). Ucuz, etkili ve kolay uygulanabilen bir yöntem olup, hemşirelik girişimi olarak da kullanılabilir (Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2011; Dikmen, 2023).

Ülkemizde tamamlayıcı tedavilerle ilgili yapılan çalışmaların sayısı sınırlıdır. Bu durum, tamamlayıcı tedavilere olan güven eksikliğinden, bu tedavilerin yeterince bilinmemesinden ve uygulayıcı profesyonel sayısının az olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, tamamlayıcı tedavi kullanımıyla ilgili net veriler yoktur (Cole & Shanley, 2002; Özçelik & Fadıloğlu, 2009). Hemşireler tarafından kullanılan tamamlayıcı tedaviler üç gruba ayrılmıştır (Cole & Shanley 2002; Khorshid & Yapucu, 2010). Refleksoloji, hemşirelerin doğrudan uygulama yapabildikleri terapiler arasında birinci grupta yer almaktadır.

Sağlık Bakanlığı'nın Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'ne göre (tarih: 27 Ekim 2014, sayı: 9158) bu tür uygulamalar yalnızca Bakanlıkça yetkilendirilmiş ünitelerde, sertifikalı tabipler ve diş tabipleri tarafından yapılabilir. Ayrıca, bu alanda temel eğitimi olan sağlık çalışanları, sertifikalı tabiplere yardımcı olabilirler. Aynı yönetmeliğin eklerinde ise, refleksoloji uygulamasının sertifikalı tabipler ve tabip gözetimindeki sertifikalı sağlık meslek mensupları tarafından yapılabileceği belirtilmektedir (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği, 2014). 19/04/2011 tarihinde yayımlanan 27910 sayılı Hemşirelik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hemşiresi'nin görev, yetki ve sorumlulukları arasında hemşirelerin, bireylerin kullandığı ilaçlar, bitkiler, vitaminler, alternatif tedaviler ve besinsel destekler gibi alternatif uygulamaları değerlendirebileceği belirtilmiştir. Ayrıca hemşirelerin masaj, manevi destek, anksiyeteyi azaltma, gevşeme teknikleri ve terapötik dokunma gibi hemşirelik girişimlerini uygulama yetkisine sahip oldukları da ifade edilmiştir (Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2011). Hemşirelerin bu alanda kendini geliştirmesi, tamamlayıcı tedavileri öğrenmesi ve hastalarına uygulayabilmesi önemlidir (Karayağız Muslu & Öztürk, 2008; Akkuş Topçu, 2009; Turan & ark., 2010; Çevik, 2013; Büyükbayram & Ayık, 2021; Dikmen, 2023).

Son yıllarda yapılan arařtırmalar, refleksolojinin yorgunluk, uykusuzluk, anksiyete, depresyon, dispne, migren ađrıları, romatizmal kas ađrıları, spazmlar, bulantı, kusma, kabızlık ve bazı üriner sistem sorunlarını gibi sorunları azalttığını, multiple skleroz gibi nörolojik kökenli hastalıklarda uygulanan rehabilitasyon sürecini desteklediğini, kanser ađrıları ile kemoterapinin yan etkilerini hafiflettiğini, doğumu kolaylařtırdığını, doğum sürecindeki yakınmaları azalttığını, premenstrüel sendrom ve dismenore yakınmalarını hafiflettiğini ve bebeklerde infantil koliđi hafiflettiğini göstermektedir (Aydın, 2015; Alan, 2015; Avcı, 2015; Bakır, 2016; Esmel-esmel & ark, 2017; Gözüyeřil, 2015; Güven, 2017; Kapila & ark, 2019; Koç, 2013; Kurt, 2016; Özdemir, 2011; Polat, 2016; Rameznibadr & ark, 2018; Shahsavari & ark, 2018; Silverdale, 2019; Ünal, 2015; Yılar, 2014; Yılmaz, 2014; Zengin, 2017; Büyükbayram & Ayık, 2021).

Refleksoloji Uygulaması

Refleksoloji seansı 30 ila 60 dakika arasında sürer. Bu yöntemde, parmaklar veya yardımcı araçlar kullanarak ayak tabanındaki refleks noktalara çeřitli řekillerde basınç uygulanır. Basınç derin olmalı, ancak acı vermemelidir. Uygulama öncesinde, ayađın pasif hareketlerle gevřemesi ve ısınması sađlanır, ardından başparmak ile ayak tabanı taranır. Çalışma yapılacak bölgelere temel uygulama tekniklerinden bir ya da birkaçı kullanılabilir. Nokta sayısı

fazla olduđuunda, tüm teknikleri uygulamak zaman alabilir, bu nedenle bir ya da birkaç teknikle çalışma yapılabilir. Refleksoloji herhangi bir parmağın kenarıyla basınç uygulanarak gerçekleştirilir (Wang & ark., 2008).

Refleksoloji uygulamalarında farklı basınç teknikleri kullanılır; başparmak, parmak hareketleri, ovma, sıvazlama ve sıkma bunlar arasındadır (Koç, 2013). En uygun pozisyon, kişinin rahatlığına göre seçilir ve genellikle sırt üstü ya da kucakta uygulanır (Doğan, 2015). Uygulama odasının sıcaklık ve ışığı uygun olmalıdır. Uygulayıcının tırnakları, parmak boyunu geçmemelidir (Gözüyeşil, 2015). Uygulama genellikle önce bir ayakta yapılır, ardından diğer ayağa geçilir (Koç, 2013). Basınç şiddeti kişiye göre değişir; yetişkinlerde daha kuvvetli, çocuklarda orta derecede, bebeklerde ise hafif derece basınç uygulanır (Wilhelm, 2009; Özdemir, 2011). Bebeklerde doku hasarını önlemek için basınç bebeğin duyarlılığına göre ayarlanır. Eller yıkanır, sıcaklık için sürtülür ve çıplak ellerle uygulanır (Orhan, 2016). Yenidoğanlar için basınç nazik olmalı ve seanslar kısa tutulmalıdır. Başparmak ve işaret parmağı gibi parmaklar kullanılır, başka bir yardımcı araç gerekmez (Orhan, 2016).

Sonuç

SP’li bir çocuğun adım atma, konuşma, algılama, spastisite, kabızlık ve yeme-içme sorunları gibi birçok problemi aynı anda

barındırdığı için bu çocukların sorunlarını tamamen çözmek zordur ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Literatürde SP'li çocuklar için tedavi yöntemleri bulunsa da, aileler, geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda alternatif tedavi arayışına girerler. Bu da, onları duygusal olarak rahatlatır (Bower, 2009; Majnemer & ark, 2013; Gözüyeşil, 2015; Yalçın, 2017).

Refleksoloji, motor bozuklukların yanı sıra birçok problemin görüldüğü SP'li çocuklarda kullanılmasına rağmen, bu çocuklar üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar oldukça sınırlıdır (Gözüyeşil, 2015). Hasta ve sağlıklı yetişkinler üzerinde yapılan çalışmaların olumlu etkileri göz önüne alındığında, refleksoloji ile SP'li bir çocuğun adım atması, konuşabilmesi, algısının artması, spastisitenin azalması, kabızlığın düzelmesi ve yeme-içmenin kolaylaşması sağlanabilir. SP'li çocuklarda nörogelişimsel tedavi yaklaşımlarına ek olarak uygulanan refleksoloji, uyku, konstipasyon, salya problemi, motor beceriler, yaşam kalitesi ve aile etkilenimi gibi SP'ye bağlı eşlik eden sorunlar üzerinde olumlu etki gösterebilir.

Kaynaklar

Akkuş Topçu S. (2009). Hemşirelik uygulamaları ve eğitiminde tamamlayıcı ve alternatif tedaviler. *Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi*, 6(2):5-9.

Alan, H. (2015). Jinekolojik Kanser Hastalarında Kemoterapi Tedavisi Sürecinde Uygulanan Progresif Kas Gevşeme Egzersizleri Ve Refleksolojinin Ağrı, Yorgunluk, Anksiyete, Depresyon Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi; Randomize Kontrol Çalışması. Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Avcı, N. (2015). Total Abdominal Histerektomi Ameliyatı Sonrası Ağrının Ve Anksiyetenin Azaltılmasında Refleksolojinin Etkisi. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Aydın Y. (2015). Aşırı Aktif Mesane Şikayeti Olan Kadınlarda Refleksolojinin Etkinliği. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Bakır E. (2016). Romatoid Artritli Hastalarda Ayak Refleksolojisinin Ağrı Ve Uyku Kalitesine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Bower E. (2009). Finnie's handling the young child with cerebral palsy at home.

Büyükbayram, Z., & Ayık, D. B. (2021). Türkiye’de refleksoloji uygulaması ile ilgili yapılan hemşirelik tezlerinin incelenmesi: bir sistematik derleme. *Sağlık Profesyonelleri Araştırma Dergisi*, 3(1), 25-37.

Chambers, H.G., & Chambers, R. (2020). Introduction to the cerebral palsies. Philip D. Nowicki (Ed). *Orthopedic Care of Patients with Cerebral Palsy* içinde. (1.bs., pp. 1-12). İsviçre: Springer.

Cole A, & Shanley E. (2002). Complementary therapies as a means of developing the scope of professional nursing practice. *Journal of Advanced Nursing*, 27: 1171-1176.

Çevik K. (2013). Hemşirelikte tamamlayıcı ve alternatif tedavi: Refleksoloji. *Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi*;29(2):71-82.

Dikmen, R. (2023). Hemşirelikte Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulamalarına İlişkin Eğitim ve Yönetmelik Durumu. *Doğal Yaşam Tıbbi Dergisi*, 5(1), 6-13.

Doğan HD. (2015). Multiple Sklerozlu Hastalara Uygulanan Refleksolojinin Ağrı, Yorgunluk Ve Yaşam Kalitesine Etkisi. Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Esmel-esmel N, Tomas-Esmel E, Tous-Andreu M, Bove-Ribe A, & Jimenez-Herrera M. (2017). Reflexology and polysomnography: Changes in cerebral wave activity induced by reflexology promote N1 and N2 sleep stages, *Complementary Therapies in Clinical Practice*, 28:54-64.

Ferriero, K., & Arn, P. (2020). Abnormalities and congenital malformations as a cause of cerebral palsy. Freeman Miller, Steven Bachrach, Nancy Lennon, & Margaret E. O'Neil (Ed). *Cerebral Palsy* (Second Edition) içinde. (1.bs.,pp. 37-44). İsviçre: Springer.

Gözüyeşil Y. (2015). Refleksoloji. Başer, M., Taşcı, S. (Ed.), Kanıta Dayalı Rehberleriyle *Tamamlayıcı ve Destekleyici Uygulamaları* içinde (s.89-95) Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi.

Guillamón N, Nieto R, Pousada M, Redolar D, Muñoz E, & Hernández E. (2013). Quality of life and mental health among parents of children with cerebral palsy: the influence of self-efficacy and coping strategies. *Journal of Clinical Nursing*, 22(11-12), 1579-1590.

Güven E. (2017). Elektif Sezaryen Olan Hastalarda Post-Operatif Ağrı Ve Anksiyetenin Azaltılmasında Refleksolojinin Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19/04/2011 Tarihli 27910 Sayılı Resmi Gazete, Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği Görev, Yetki ve 68 Sorumlulukları, Hemşirelik Girişimleri [İnternet]. Erişim adresi:<http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110419-5.htm>. <https://www.rcm.org.uk/news-views-and-analysis/news/reflexology-school-for-midwives>, Reflexology school for midwives (Erişim tarihi:04.11.2024)

Himmelmann, K., & Panteliadis C.P. (2018). Clinical characteristics. Panteliadis (Ed). *Cerebral Palsy: A Multidisciplinary Approach, (Third Edition)* içinde. (10.bs., pp. 75-89). İsviçre: Springer

Kapila AK, Her A, Knife N, Chaplin P, & Patel A. (2019). A prospective Cohort Study on the Impact of Reflexology in Patients

with Breast Cancer Using the MYCaW Scale, *Clinical Breast Cancer*, 1-8.

Karayağız Muslu G, & Öztürk C. (2008). Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler ve çocuklarda kullanımı. *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi*, 51:62-7.

Khorshid L, & Yapucu Ü. (2010). Tamamlayıcı Tedavilerde Hemşirenin Rolü. *Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi*, 8: 124-130.

Kızır Y. (2016). Koroner Anjiyografi Planlanan Hastalarda Refleksolojinin Anksiyete Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi. Şanlıurfa: Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Koç T. (2013). Süt Çocuğunda Refleksoloji Tekniğı İle Uygulanan Ayak Masajının Akut Ağrıya Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Kurt S. (2016). Onkoloji Hastalarında Periferel Nöropatinin Yönetiminde Refleksolojinin Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Livanelioğlu A, & Günel M. (2009). *Serebral Palside Fizyoterapi*. Ankara: Yeni Özbek Matbaası, 219-109.

Low, E., Murray, D., O'Mahony, O., & Hourihane, J.B. (2008). Complementary and alternative medicine use in Irish paediatric patients. *Irish Journal of Medical Science*, 177(2), 147-150

Magill L, & Berenson S. (2008). The conjoint use of music therapy and reflexology with hospitalized advanced stage cancer

patients and their families. *Palliative and Supportive Care*, 6(03), 289-296.

Majnemer A, Shikako-Thomas K, Shevell MI, Poulin C, Lach L, & Schmitz N. (2013). Complementary and Alternative Medicine Treatments in Adolescents With Cerebral Palsy. *Journal of Child Neurology*, 28(11), 1443-1447.

McCullough JEM, Liddle SD, Close C, & Sinclair M. (2018). Reflexology: A Randomised Controlled Trial Investigating The Effects on Beta-Endorphin, Cortisol and Pregnancy Related Stress, *Complementary Therapies in Clinical Practice*, 31:76-84.

Metin ZG. (2015). Romatoid Artritli Hastalarda Aromaterapi Masaji ve Refleksoloji Uygulamalarının Ağrı ve Yorgunluğa Etkileri. Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Milićević, M. (2022). Functional and environmental predictors of health-related quality of life of school-age children with cerebral palsy: A cross-sectional study of caregiver perspectives. *Child: Care, Health and Development*. 49(1),1–11. doi.org/10.1111/cch.13007

Orhan, İ. (2016). Temel Refleksoloji Notları, 1. Uluslararası ve 3. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi Bildiri Kitabı, 24-26 Kasım 2016, s. 9-14. Antalya.

Özçelik H, & Fadıloğlu Ç. (2009). Kanser hastalarının tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanım nedenleri. *Türk Onkoloji Dergisi*, 24: 48-52.

Özdemir G. (2011). Hemodiyaliz Hastalarına Uygulanan Refleksolojinin Yorgunluk, Ağrı Ve Krampa Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Öztürk R. (2015). Abdominal Histerektomi Sonrası Refleksolojinin İyilik Haline Etkisi. Doktora Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015.

Polat H. (2013). Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarına Uygulanan Refleksolojinin Dispne Ve Yorgunluğa Etkisi. Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Rameznibadr F, Amini K, Hossaingholipor K, & Faghihzadeh S. (2018). The impacts of foot reflexology on anxiety among male candidates for coronary angiography: A three-group single-blind randomized clinical trial, *Complementary Therapies in Clinical Practice*, 32:200-204.

Shahsavari H, Abad MEE, & Yekaninejad MS. (2018). The effects of foot reflexology on Anxiety and Physiological Parameters among Candidates for Bronchoscopy: A Randomized Controlled Trial, *European Journal of Integrative Medicine*, 12:177–181

Silverdale N. (2019). Massage and Reflexology for post-Operative Cancer Cystectomy Patients: Evaluation of a Pilot Service, *Complementary Therapies in Clinical Practice*, 34:109–112.

Turan N, Öztürk A, & Kaya N. (2010). Hemşirelikte yeni bir sorumluluk alanı: tamamlayıcı terapi. *Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi*; 3(1):93-8.

Ünal KS. (2015). Hemodiyaliz Hastalarında Ayak Refleksolojisi Uygulamasının Konstipasyona Etkisi. Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Wang MY, Tsai PS, Lee PH, Chang WY, & Yang CM. (2008). The efficacy of reflexology: systematic review. *Journal of Advanced Nursing*, 62 (5), 512-520.

Wayte S, McCaughey E, Holley S, Annaz D, & Hill CM. (2012). Sleep problems in children with cerebral palsy and their relationship with maternal sleep and depression. *Acta Paediatrica*, 101:618-23.

Wilhelm Z.A. (2009). Adım Adım Sağlık: *Refleksoloji*. (4.baskı). İstanbul: Dharma Yayınları.

Yalçın B. (2017). *Batı klinik refleksoloji*, Hastalık Bozukluk Ve Engellilerde Refleksoloji Uygulamaları.

Yılar Z. (2014). Ayak Refleksolojisinin Doğum Ağrısına Ve Doğum Eyleminin Süresine Etkisi. Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Yılmaz FA. (2014). Ayak Refleksolojinin Dismenore Ve Okul Performansına Etkisi. Doktora Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Yüksel, H. (2021). Tamamlayıcı tıp uygulamaları: Refleksoloji. *Bütünleyici ve Anadolu Tıbbi Dergisi*, 2(3), 56-66.

Zengin L. (2017). Kemoterapi Alan Hastalarda Uyku Hijyeni Eğitimi Ve Refleksolojinin Uyku Kalitesine ve Yorgunluğa Etkisi. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

